

Sperma-onderzoek natuurlijk dekkende stier waardevol

Minder gevoel en meer berekenen

Wie echt wil, kan het rendement op het vleesveebedrijf nog flink verbeteren, zo bleek op de eerste Boerderij Vleesvee Vakdag in Epe. Alert zijn op fiscale voordelen, strikt zijn op vruchtbaarheid en de durf om eens een hogere prijs voor een dier te vragen vergen wel een actieve inzet.

tekst **Jorieke van Cappellen**

De eerste Boerderij Vleesvee Vakdag, georganiseerd door het vakblad Boerderij, mocht met ruim 150 vleesveehouders op veel belangstelling rekenen. Een hoger rendement uit vleesvee behalen was het centrale thema. 'De Nederlandse roodvleessector is de sector met het laagste antibioticagebruik. Veel bedrijven zijn extensief en passen weidegang toe', vertelde vleesveehouder Anita Heijdra uit IJsselstein. Heijdra spant zich in om de vleesveesector bij overheid en onderzoeksinstanties een duidelijker gezicht te geven. Door versnippering en het hobbymatige karakter van de sector ontbreken vaak harde feiten en cijfers. 'Als sector loop je het gevaar over één kam geschoren te worden met de melkveehouderij of de vleeskalverhouderij. Zo is de dierdagdosering bij antibiotica gebaseerd op het gewicht van een gemiddelde melkkoef van 600 kilogram.' Pas sinds dit jaar kent de vleesveehouderij een eigen specifieke Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). 'Door bijvoorbeeld staldakisolatie en een reductie van de ammoniakuitstoot, maar ook voor welzijnsaspecten als weidegang en een aparte behandelstraat, kunnen vleesveehou-



Toon van Genugten:
'Durf ook eens twintig cent meer per kilo te vragen'

ders fiscaal voordeel behalen.' Ook hier ondervindt de vleesveesector nog obstakels. Heijdra: 'Er worden nu veel hellingstallen gebouwd, maar in hoeverre zij ammoniak reduceren moet nog wetenschappelijk onderzocht worden.' Heijdra adviseert veehouders om uit te gaan van de eigen situatie en wensen bij nieuwbouw en vervolgens te kijken hoe de MDV kan worden ingepast op het bedrijf.

Hoe duurder verkopen?

Toon van Genugten, eigenaar van meerdere varkensbedrij-



Joost Huijbregts:
'In de vleesveesector gebeurt er te veel op gevoel'

ven en horeca-ondernemingen, gaf de vleesveehouders tips mee om hun dieren duurder te verkopen. 'De markt is anders dan vroeger. We kunnen niet meer vleesveehouden en produceren zoals onze ouders dat deden.' Volgens Van Genugten moeten vleesveehouders produceren waar de markt naar vraagt. 'Wees op de hoogte van actuele marktprijzen en wees overtuigd van de kwaliteit van je eigen product. Durf ook eens twintig cent meer voor een kilo te vragen. En maak de handelaar

nieuwsgierig, door bijvoorbeeld terloops aan te geven dat je nog een paar fijne dieren hebt.'

Joost Huijbregts, vleesveespecialist bij ForFarmers/Hendrix ging in op de noodzaak om meer te berekenen. 'In de vleesveehouderij gebeurt er nog te veel op gevoel', vertelde Huijbregts, die het publiek vroeg of het de tussenkalf tijd van zijn dieren kende. Twaalf van de tachtig aanwezigen staken hier de hand op. 'Door te streven naar een tussenkalf tijd van 385 dagen in plaats van 440 dagen, heb je bij vijftig dieren bijna zes kalveren meer', gaf Huijbregts als voorbeeld. 'Verkoop je de kalveren voor 850 euro, dan heb je ruim 5000 euro verborgen rendement.' Huijbregts adviseert dieren bij verkoop altijd te wegen voor de juiste prijs. 'Meten is ook hier weten.'

Vruchtbare dieren

Vleesveedierenarts van dierenartsenpraktijk Someren Brecht Scheirlinck ging in op het rendement van een goede vruchtbaarheid en het belang van vruchtbaarheidsbegeleiding bij vleesvee. 'Door pinken en afgekalfde dieren op te voelen, weet je hoe het ervoor staat met de vruchtbaarheid en voorkom je teleurstellingen.'

Bij de aankoop van een natuurlijk dekkende stier kunnen veehouders al een inschatting maken van het bevruchtend vermogen van de stier. 'Let op uiterlijke kenmerken als een zware spieraanzet in de nek en de kleur en omvang van het scrotum.' Gezond beenwerk is belangrijk. 'Een kreupele stier springt niet.' Scheirlinck wijst op de waarde van sperma-onderzoek, dat dierenartspraktijken vaak zelf kunnen uitvoeren. 'Een stier kan te weinig of slechte zaadcellen produceren. Een stier die ziek is of koorts heeft gehad, produceert tot acht weken erna nog minderwaardig sperma.'