

Ingezonden Berichten.

OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1940—1941.

Het oogstbericht voor het seizoen 1940—1941 is wederom samengesteld uit de gegevens, die door de gewaardeerde medewerking van verschillende lichamen en vele particuliere boschbezitters zijn verkregen. Evenals in de voorgaande jaren wordt het land verdeeld in zeven waarnemingsgebieden, die hieronder met de aantallen ontvangen oogstberichten worden genoemd:

landstreek	aantal oogstberichten
1. Noord-Brabant en Limburg	23
2. Veluwezoom	5
3. Overige Veluwe	17
4. Utrecht	10
5. Achterhoek en Zuid-Overijssel	6
6. Overig deel van Overijssel, Friesland en Drenthe	6
7. Duinstreek	7

Geheele land.

Aan het landsgemiddelde van de oogstverwachtingen voor de meer algemeen voorkomende houtsoorten als groveden, eik, beuk en berk kan een vrij groote nauwkeurigheid worden toegekend. Voor houtsoorten als Oostenrijksche den, Corsicaansche den en bergden beschikken we slechts over een vrij klein aantal waarnemingen, die vanzelfsprekend bijna steeds op de duinstreek betrekking hebben.

De bewerking van de gegevens is op dezelfde wijze geschied als in de voorgaande jaren. De berichtgevers hebben den vermoedelijken oogst geschat in procenten van den maximalen oogst, waarbij de volgende waardeering geldt:

- 90 = buitengewoon goed
- 80 = zeer goed
- 70 = goed
- 60 = vrij goed
- 50 = middelmatig
- 40 = beneden middelmatig
- 30 = slecht
- 20 = zeer slecht
- 10 = misoogst.

Toelichting tot de tabel op de volgende bladzijde.

GROVEDEN (*Pinus silvestris* L.).

De oogstverwachting voor den groveden is aanzienlijk beter, dan in den herfst van het jaar 1939 op grond van de hoeveelheid éénjarige kegels kon worden voorspeld.

Voor al voor het zuiden des lands, de Veluwe en de provincie Utrecht kan op een zeer bevredigenden oogst worden gerekend, terwijl ook in de andere deelen van het land de oogst niet slecht zal zijn.

De hoedanigheid van het zaad wordt over het algemeen goed geacht; van eekhoornschade wordt in de oogstberichten dit jaar weinig melding gemaakt.

De vooruitzichten voor het seizoen 1941—1942 gaan, blijkens de schattingen van de hoeveelheid éénjarige kegels, niet boven die van dit jaar uit, doch de verwachting kan geenszins slecht worden genoemd.

OOSTENRIJKSHE DEN (*Pinus nigra* var. *austriaca* Endl.).

De gegevens voor de oogstverwachting van deze boomsoort hebben

OOGSTVERWACHTING 1940—1941.

Boomsort	N. Brabant en Limburg	Veluwezoom	Overige Veluwe	Utrecht	Achterhoek en Zuid Overijssel	Overig deel van Overijssel, Fries- land en Drenthe	Duinstreek	Aantal berichten	Gemiddelde verwachting voor het land		
									in cijfers	Omschrijving	
Groveden	1940—1941	62	46	64	63	58	58	50	76	60	vrij goed
	1941—1942	52	52	51	60	60	54	53	52	53	middelmatig
Oostenr. den	1940—1942	50	—	50	70	30	—	47	11	48	middelmatig
	1941—1942	50	—	40	—	—	—	39	9	40	beneden middelmatig
Corsic. den	1940—1941	50	—	50	70	—	—	47	10	50	middelmatig
	1941—1942	50	—	40	—	—	—	39	9	40	beneden middelmatig
Bergden	1940—1941	30	—	40	80	—	—	48	9	48	middelmatig
	1941—1942	40	—	40	—	—	—	52	8	48	middelmatig
Zeeden	1940—1942	55	—	53	80	70	—	45	24	54	middelmatig tot goed
	1941—1942	45	—	60	—	—	—	42	15	45	middelmatig
Fijnspar		48	43	45	72	48	52	50	40	51	middelmatig
Groene douglas		40	25	28	55	40	53	—	32	38	beneden middelmatig
Zomereik		47	62	43	61	46	59	43	78	52	middelmatig
Amerik. eik		48	38	38	60	50	48	—	57	47	middelmatig
Beuk		63	74	60	83	67	60	45	58	66	vrij goed tot goed
Ruwe berk		66	62	48	68	57	62	47	64	60	vrij goed
Zachte berk		68	58	50	65	53	59	55	41	58	vrij goed
Zwarte els		57	55	80	62	63	63	54	34	60	vrij goed
Witte els		56	45	50	68	55	56	55	34	56	middelmatig tot goed

hoofdzakelijk betrekking op de duinstreek; de cijfers voor het zuiden des lands, de Veluwe, Utrecht en den Achterhoek met zuidelijk Overijssel steunen elk slechts op één enkele waarneming.

In tegenstelling met de verwachting naar de éénjarige kegels in het voorgaande jaar, zal de oogst vermoedelijk in het komende seizoen meevallen. Hij kan over het algemeen als vrij middelmatig worden beschouwd.

Op grond van de schatting van de hoeveelheid éénjarige kegels zal de oogst voor het seizoen 1941—1942 ongunstiger uitvallen; volgens deze waarnemingen kan niet eens op een middelmatigen oogst tegemoet worden gezien.

CORSICAANSCH DEN (*Pinus nigra* var. *corsicana* Loud.).

De verwachtingen voor den Corsicaanschen den komen in het algemeen sterk overeen met die voor den Oostenrijkschen den. Ook hier hebben vrijwel alle waarnemingen betrekking op de duinstreek; uit het zuiden des lands, de Veluwe en de provincie Utrecht werd slechts één oogstbericht voor deze houtsoort ontvangen.

De verwachtingen voor het komende seizoen kunnen als middelmatig worden aangegeven, die voor het seizoen 1941—1942 blijven daar beneden.

BERGDEN (*Pinus montana* Mill.).

Ook voor deze boomsoort heeft het meerendeel der waarnemingen betrekking op de duinstreek. Overeenkomstig de schatting van de éénjarige kegels in het voorgaande jaar zal een middelmatigen oogst mogen worden verwacht. De vooruitzichten voor het seizoen 1941—1942 wijken niet sterk af van die voor dit seizoen.

ZEEDEN (*Pinus maritima* Poir.).

De berichten over den zeeden zijn voor het grootste deel afkomstig uit Noord-Brabant en de duinstreek. Geheel in overeenstemming met de waarnemingen in het voorafgaande jaar van de hoeveelheid éénjarige kegels zal in het komende seizoen op een bevredigende oogst mogen worden gerekend. De verwachtingen voor het seizoen 1941—1942 zijn daartegen iets minder goed.

FIJNSPAR (*Picea excelsa* Lk.).

De verwachting voor deze boomsoort kan, hoewel de waarnemingen vaak sterk uiteenloopen, bevredigend worden genoemd; voor Utrecht wijzen de ontvangen berichten zelfs op een goeden oogst.

GROENE DOUGLAS (*Pseudotsuga Douglassi* Carr.).

Ook voor deze houtsoort loopen de verwachtingen sterk uiteen. Hoewel de gegevens uit de provincie Utrecht en uit het noorden des lands bevredigend zijn, moet voor het geheele land op een oogst worden gerekend, die beneden het middelmatige ligt.

ZOMEREIK (*Quercus Robur* L.).

Evenals het voorafgaande jaar kunnen de verwachtingen zeker bevredigend worden genoemd. Vooral voor de Veluwezoom, Utrecht en het noorden des lands zijn de berichten zeer gunstig. Ook dit jaar dragen de eiken in de duinstreek minder goed dan in de andere waarnemingsgebieden.

AMERIKAANSCH EIK (*Quercus rubra* L.).

Ook de Amerikaansche eik zal in het komende seizoen vermoedelijk wel een bevredigende oogst geven. Evenals bij den zomereik vertoonen de gegevens nogal eenige verschillen. Volgens de berichten kan vooral in de provincie Utrecht op een goeden oogst worden gerekend.

BEUK (*Fagus sylvatica* spec.).

De ontvangen berichten omtrent de oogstverwachting voor den beuk

zijn, met uitzondering van de duinstreek, waar de verwachting hoogstens middelmatig kan worden genoemd, over het algemeen zeer goed te noemen. In alle andere waarnemingsgebieden komen de gemiddelde schattingen boven de 60% uit. De gegevens uit de provincie Utrecht wijzen zelfs op een uitstekenden oogst.

RUWE BERK (*Betula pendula* Roth).

Met uitzondering van de duinstreek, waar de verwachting de beoordeeling middelmatig maar nauwelijks kan halen, zijn de verwachtingen voor den ruwen berk zeker bevredigend. Voor het zuiden des lands, alsook voor de provincie Utrecht zijn de berichten zelfs zeer goed.

ZACHTE BERK (*Betula pubescens* Ehrh.).

De ontvangen gegevens voor den zachten berk komen zeer veel met die voor den ruwen berk overeen; de oogst kan over het algemeen eveneens bevredigend worden genoemd.

ZWARTE ELS (*Alnus vulgaris* Hill.).

Over het geheel genomen zal de zaadoogst van deze houtsoort zeker niet tegen vallen. De verwachting voor de Veluwe is zelfs zeer hoog, doch hierbij dient te worden opgemerkt, dat dit cijfer slechts op één enkele waarneming betrekking heeft.

WITTE ELS (*Alnus incana* Mönch.).

De verwachtingen van deze houtsoort wijken over het algemeen niet sterk van die van den zwarten els af; men kan vermoedelijk op een vrij goeden oogst met zaad van goede hoedanigheid rekening houden.

ALGEMEENE OPMERKINGEN.

Uit de gegevens der 87 medewerkers blijkt over het algemeen dat dit jaar geenszins ongunstig mag worden genoemd. De zaaddracht van alle loofhoutsoorten is bevredigend tot zelfs zeer goed. Hierbij is vooral de beuk te noemen, die met uitzondering van de duinstreek overal goed draagt.

De verwachtingen voor het naaldhout zijn over het geheel iets minder hoog, doch van de belangrijkste naaldhoutsoort n.l. van den groveden zal vermoedelijk de kegelooft niet tegenvallen.

Wat de verschillende landsdeelen betreft, is het merkwaardig, dat de berichten uit het centrum des lands de gunstigste zijn, terwijl de zaaddracht vooral van het loofhout in de duinstreek aanzienlijk slechter is dan elders in het land.

HANDEL IN HOUT.

Op het Rijksbureau voor Hout is gebleken, dat men in het algemeen niet voldoende bekend is met meer in het bijzonder art. 5 van de Houtbeschikking 1940 nr. I, hetwelk luidt:

„Het is aan natuurlijke- of rechtspersonen, die van den handel in „hout *niet* hun normaal bedrijf maken, verboden, hout te koopen zonder „daartoe van den directeur van het Rijksbureau voor Hout verkregen „schriftelijke vergunning, tenzij dit hout voor eigen gebruik is bestemd.
„Aan de vergunning kunnen voorwaarden en beperkingen worden „verbonden“.

De aandacht van belanghebbenden wordt derhalve nog eens speciaal op dit artikel gevestigd, waarbij nog kan worden opgemerkt, dat op overtreders daarvan strafsancities zullen worden toegepast.

RIJKSBUREAU VOOR HOUT.
