

Ingezonden

Geachte Redactie,

Dat het ook bij den boschbouw wenschelijk, zelfs noodzakelijk is wat eenheid in de nomenclatuur der planten te bekomen, kan wel het best blijken uit het verslag in het tijdschrift der N. B. V. No. 8, waarin het vervolg staat van den voordracht gehouden door Dr. Beversluis.

Ik vond daarin melding gemaakt van bastaarden van *Ulmus nitens* × *U. pedunculata* (bl. 214) en van een dergelijke van *Ulmus glabra* × *U. montana* (blz. 215).

Welke stamvaders zijn daar bedoeld? Auteursnamen staan er niet bij.

Volgens de lijst der namen aangenomen door de American Joint Committee 1924, The standardized plantnames, is

Ulmus foliacea Gilib. = *U. nitens* Mönch = *U. glabra* Mill.

Ulmus glabra Huds. = *U. montana* With = *U. scabra* Mill.

De zaak is dus niet duidelijk.

Wat heeft de spreker bedoeld met *U. nitens*, wat met *U. glabra* en wat met *U. montana*.

Zonder auteursnaam kan er schromelijke verwarring ontstaan. Want zijn bastaard tusschen *U. glabra* en *U. montana* zou geen bastaard zijn, omdat het een kruising kan zijn tusschen twee individuen van dezelfde soort.

Onze Hollandsche iep is een bastaard van *U. campestris* Linn. en *U. glabra* Huds. wat uit zaaisels gemakkelijk te constateeren is, omdat men daar- onder behalve allerlei tusschenvormen ook de beide stamouders terug vindt, zelfs de *U. camp. suberosa*.

Bij het noemen van namen is het dus wenschelijk de auteursnamen ook te noemen om elke verwarring te voorkomen.

Over de resultaten van marcoteeren van boomsoorten vermeld op blz. 217 mag wel een kleine opheldering gegeven worden. Ik zie o.a. daarin vermeld, dat *Sambucus*, (waarom niet Vlier) Iep, Linde, *Corylus Avellana* (hazelaar) met goede resultaten door marcoteeren vermenigvuldigd worden. Dit is reeds lang, zeer lang in gebruik. Van mijn jeugd af heb ik linden, iepen, hazelaar, *Viburnums* door afleggers zien voorttelen. De gewone pruim (*Prunus L.*) *domestica* gaat zeer gemakkelijk van worteluitloopers. *Vib.*, *Sambucus*, zeer gemakkelijk door stek.

Van andere *Prunus* soorten weet men reeds sinds lang dat zij door stek of afleggers gekweekt kunnen worden, maar het duurt den kweeker dikwijls te lang, z.b.v. *Prunus triloba* Lindl. Deze heeft 2 jaren noodig eer hij wortel heeft gemaakt.

Prunus Cerasus L., *Prunus Avium L.* zijn beide kersen.

Hoogachtend,

LEONARD A. SPRINGER.

Haarlem, 3 Augustus 1929.