

BIJLAGE

LIJST
VAN
GEBRUIKTE HOUTSOORTEN
IN DE
WIERINGERMEER

Met name in en bij de dorpen, op erven van
boerderijen, op begraafplaatsen enz.

Nomenclatuur volgens:

W. J. HENDRIKS, „Onze Loofhoutgewassen“

en

*Dr. G. HOUTZAGERS en M. DE KONING,
„De Boomsoorten“.*

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT. SOORT EN/OF VARIETEIT	
1	Aceraceae (Eschdoornachtigen)	<i>Acer campestre</i> L.	
2		" <i>Negundo</i> L.	
3		" <i>platanoides</i> L.	
4		" <i>pseudoplatanus</i> L.	
5		" " var. <i>atropurpureum</i> Spaeth. Syn: <i>A. ps. pl.</i> var. <i>Spaethii</i> Hort.	
6		" " " " <i>purpurascens</i> Pax. " <i>saccharinum</i> var. <i>Wieri</i> Pax. Syn: <i>A. dasycarpum</i> var. <i>Wieri laciniatum</i> Hort.	
7	Anacardiaceae	<i>Rhus typhina</i> L.	
8	Berberidaceae	<i>Berberis aggregata</i> C.S.	
9		" <i>polyantha</i> Hemsl.	
10		" <i>stenophylla</i> Lindl.	
11		" <i>Thunbergii</i> D.C.	
12		" " var. <i>atropurpurea</i> Hort.	
13		" <i>vulgaris</i> L.	
14		" " var. <i>atropurpurea</i> Reg.	
15		<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt. Syn: <i>Berberis Aquifolium</i> Pursh.	
16		Betulaceae	<i>Alnus incana</i> Mönch.
17		" <i>vulgaris</i> Hill. Syn. <i>A. glutinosa</i> Willd.	
18	" <i>cordata</i> Desf.		
19	<i>Betula papyracea</i> Ait.		
20	" <i>pendula</i> Roth. syn. <i>B. verrucosa</i> Ehrh.		
21	" <i>pendula</i> var. <i>purpurea</i> C.S.		
22	" " var. <i>fastigiata</i> K. Koch		
23	" " " <i>Youngii</i> C.S.		
24	" <i>nigra</i> L.		
25	" <i>pubescens</i> Ehrh.		
26		<i>Carpinus betulus</i> L.	
27		" " var. <i>fastigiata</i> Nich.	
28		<i>Corylus Avellana</i> L.	
29	Caprifoliaceae	<i>Diervilla florida</i> Sieb. et. Zucc. syn. <i>D. rosa</i> Walp. syn. <i>Weigelia rosea</i> Lindl.	
30		<i>Lonicera Ledebourii</i> Esch.	
31		<i>Periclymenum</i> L.	
32		" <i>tartarica</i> L.	

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
eschdoorn of Spaansche aak ereschdoorn	S S	goed vrij goed	vrij veel gebruikt bij boerderijen en in dorpen. weinig gebruikt, alleen bruikbaar op beschutte plaatsen.
orsche eschdoorn	B	matig	alleen als proef gebruikt bij wegbeplanting; niet geslaagd.
vone eschdoorn	BP	goed	als 2-jarig plantsoen beter dan als boom, veel ge- bruikt bij weg- en erfbeplanting, zoowel als in boschverband.
tbladige eschdoorn	B	goed	als laanboom gebruikt langs wegen en in dorpen; staan er goed voor.
ereschdoorn	BS	slecht	weinig gebruikt, niet bestand tegen wind; als boom reeds verdwenen, als struik op zeer beschutte plaatsen nog over.
inboom	S	matig	plaatselijk gebruikt als sierstruik in dorpen en op erven van boerderijen.
beris	S	goed	als voren.
"	S	"	" "
"	S	"	" "
"	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik in dorpen en op erven van boerderijen.
"	S	"	als voren.
vone zuurdoorn	S	"	" "
tbladige berberis	S	"	" "
vone mahonia	S	"	plaatselijk gebruikt als sierstruik op erven van boer- derijen.
ze els	P	vrij goed	weinig gebruikt als drijfhout, minder tegen zeeklimaat bestand.
vone els	P	zeer goed	algemeen gebruikt als drijf- en vulhout.
tbladige els	P	vrij goed	als proef geslaagd.
ierberk	B	slecht	weinig gebruikt, is bijna verdwenen.
de berk	BP		als boom slecht, als 2-jarig plantsoen goed groeiend; zoowel in boschverband als langs wegen, in dorpen en op erven gebruikt.
	B	matig	alleen gebruikt op begraafplaats.
	B	slecht	als voren.
ierberk	B	matig	idem.
arte berk	B	slecht	als proef niet geslaagd.
hite berk	BP		als boom slecht, als 2-jarig plantsoen goed groeiend; zoowel in boschverband als langs wegen, in dorpen en op erven van boerderijen gebruikt.
gbeuk	S	goed	vrij veel gebruikt op erven van boerderijen en in boschverband.
	B	matig	enkele exemplaren in dorpen en op begraafplaats gebruikt.
elaar	S	goed	algemeen gebruikt op erven van boerderijen, in dorpen en plaatselijk langs wegen.
e weigelia	S	"	als sierstruik op erven van boerderijen en in dorpen algemeen.
lebour's kamperfoelie	S	goed	als voren.
chkamperfoelie	S	slecht	in dorp als klimplant gebruikt; verdwenen.
laarsche kamperfoelie	S	goed	plaatselijk gebruikt als sierstruik op erven van boer- derijen en in dorpen.

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT, SOORT EN/OF VARIËTEIT
33		<i>Lonicera tartarica</i> var. <i>rosea</i> Reg.
34		" <i>Xylosteum</i> L. syn. <i>L. vulgaris</i> Roehl.
35		<i>Sambucus racemosa</i> L.
36		" <i>nigra</i>
37		" " var. <i>aurea</i> Sweet
38		" " " <i>argenteo marginata</i> Hort.
39		" " " <i>laciniata</i> L.
40		<i>Symphoricarpos albus</i> Blake syn. <i>S. racemosus</i> Micha.
41		" <i>orbiculatus</i> Moench
42		<i>Viburnum Lantana</i> L.
43		" <i>Opulus</i> L.
44		<i>Viburnum Opulus</i> var. <i>roseum</i> L. syn. V.O. van sterile D.C.
45	Caesalpinoideae	<i>Gleditschia triacanthos</i> L.
46	Celastraceae	<i>Evonymus europaea</i> L.
47	Cupressusachtigen	<i>Juniperus communis</i> L.
48	Abietineëen	<i>Abies concolor</i> Lindl. et Gord.
49		" <i>pinsapo</i> Boiss.
50		<i>Larix leptolepis</i> Murr.
51		<i>Picea excelsa</i> Link.
52		" <i>orientalis</i> Carr.
53		" <i>sitchensis</i> Carr.
54		<i>Pinus maritima</i> Poir.
55		" <i>nigra</i> Arn. var. <i>austriaca</i> Endl.
56		" " " <i>corsicana</i> Loud.
57	Taxusachtigen	<i>Taxus baccata</i> L.
58	Cornaceae	<i>Cornus alba</i> L.
59		" " var. <i>Gouchaultii</i> Rehd.
60		" " " <i>argenteo-marginata</i> Rehd.
61		" " " <i>sibirica</i> Loud.
62		" <i>mas</i> L.
63		" <i>sanquinea</i> L.
64		" <i>stolonifera</i> Micha.
65		" var. <i>flaviramea</i> Rehd.
66	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.
67		" <i>multiflora</i> Thunb. syn. <i>E. longipes</i> Gray. syn. <i>E. edulis</i> Hort.
68		" <i>umbellata</i> Thunb.
69		<i>Hippophae rhamnoides</i> L.
70	Ericaceae	<i>Azalea mollis</i> Bl.
71		<i>Rhododendrum ponticum</i> L.
72	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.
73		<i>Fagus silvatica</i> L.
74		<i>Quercus palustris</i> L.
75		" <i>robur</i> L.

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
staatsche kamperfoelie	S	goed	als voren.
de kamperfoelie	S	"	als voren.
g- of trosvlier	S	"	als voren, mooie decoratieve struik, kan niet in schaduw groeien.
wone vlier	S	"	algemeen gebruikt.
ndvlier	S	vrij goed	plaatselijk gebruikt in dorpen en op erven van boerderijen.
verbonte vlier	S	"	als voren.
erselievlier	S	"	idem.
euwbes	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik in dorpen en op erven van boerderijen.
llige sneeuwbal	S	"	als voren.
ldersche roos	S	"	plaatselijk als sierstruik op erven van boerderijen.
euwbal	S	goed	algemeen gebruikt, bij boerderijen en in dorpen als sierstruik.
edoornige Gleditschia	B	slecht	plaatselijk gebruikt bij boerderijen en in dorpen als sierstruik.
dinaalsmuts	S	goed	enkele exemplaren gebruikt in dorpen; niet tegen wind bestand.
everbes	S	slecht	sterke struik, waar mogelijk algemeen gebruik.
ze spar	P		verdwenen.
ansche spar	P		pas geplant als 3-jarige plant in boschverband.
ansche lariks	P	slecht	als voren.
spar	P	"	op enkele slecht groeiende exemplaren na verdwenen.
stersche spar	P		als proef geplant in boschverband; weinig over.
xa spar	P	goed	pas geplant als 3-jarige plant in boschverband.
den	P	slecht	algemeen boschvormend gebruikt.
stenr. den	P	goed	enkele exemplaren als proef geplant, geheel verdwenen.
rsic. den of laricio	P	"	kleine stukken bosch van aangelegd.
wone taxus	P	slecht	als voren.
te kornoelje	S	goed	als proef eenige exemplaren gebruikt; bijna verdwenen.
nte kornoelje	S	matig	algemeen als sierstruik op erven van boerderijen en in dorpen.
verbonte kornoelje	S	"	weinig gebruikt als sierstruik.
wone kornoelje	S	goed	als voren.
de kornoelje	S	vrij goed	matig gebruikt in wandelboschjes en bij boerderijen.
e kornoelje	S	goed	idem.
fwilg	S	goed	als voren.
bloeiende olijfwilg	S	"	weinig gebruikt, groeit eerst slecht, later wat beter, zeer sterke struik, kan goed tegen wind.
doorn	S	"	weinig gebruikt als sierstruik in dorp.
ndoorn	S	goed	als voren.
ntische rhododendrum	S	slecht	weinig gebruikt in wandelboschjes.
nme kastanje	P	goed	weinig gebruikt op erven van boerderijen.
ik	P	"	enkele exemplaren gebruikt op begraaftplaats; verdwenen.
eraseik	B	slecht	boschvormend gebruikt.
neraik	B P	goed	als voren.
			gebruikt als straatbeplanting in dorp.
			boschvormend gebruikt, verder alleen op beschutte plaatsen.

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT, SOORT EN/OF VARIETEIT
76		<i>Quercus rubra</i> Duroi
77	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.
78	Malvaceae	<i>Hibiscus syriacus</i> L.
79	Myricaceae	<i>Myrica cerifera</i> L.
80	Oleaceae	<i>Forsythia intermedia</i> Zab.
81		" <i>viridissima</i> Lindl.
82		<i>Fraxinus excelsior</i> L.
83		" <i>americana</i> L.
84		" <i>anomala</i> Wats.
85		<i>Ligustrum vulgare</i> L.
86		" " var. <i>iodense</i> Hort.
87		" <i>sinense</i> Lour.
88		" <i>obtusifolium</i> var. <i>Regelianum</i> Rehd. syn. <i>L. Regelianum</i> Koehne
89		" <i>ovalifolium</i> Hassk.
90		<i>Syringa persica</i> L.
91		" <i>vulgaris</i> L.
92		" " var. <i>Marie Legraye</i> van Houtte
93		" " " <i>Souvenir de Louis Späth</i> L. Späth
94	Papilionaceae	<i>Amorpha fruticosa</i> L.
95		<i>Caragana arborescens</i> Lam.
96		<i>Colutea arborescens</i> L.
97		<i>Laburnum alpinum</i> Bercht. et Presl.
98		" <i>anagyroides</i> Med.
99		<i>Robinia Kelseyi</i> Hutchins.
100		" <i>pseudoacacia</i> L.
101		<i>Cytisus scoparius</i> Lk.
102		<i>Ulex europaeus</i> L.
103		<i>Sophora japonica</i> var. <i>pendula</i> Loud.
104		<i>Lupinus arboreus</i> Sims.
105		" " <i>hybridus</i>
106	Polygonaceae	<i>Polygonum auberti</i> Henry
107	Platanaceae	<i>Platanus acerifolia</i> Willd.
108	Ranunculaceae	<i>Clematis vitalba</i> L.
109	Rhamnaceae	<i>Ceanothus hybr.</i> L. Gloire de Versailles
110		<i>Rhamnus cathartica</i> L.
111		" <i>Frangula</i> L.
112	Rosaceae	<i>Amelanchier canadensis</i> Med.
113		" <i>oblongifolia</i> Roem.
114		" <i>ovalis</i> Med.
115		<i>Aronia floribunda</i> Spach
116		" <i>melanocarpa</i> Ell. syn. <i>A. nigra</i>
117		<i>Chaenomeles japonica</i> Lindl., syn. <i>Ch. Maulei</i> C.S. of syn. <i>Cydonia Maulei</i> Moore of <i>Pirus japonica</i> Thunb.
118		<i>Crataegus Lavalleyi</i> Herincq, syn. <i>C. Carrierei</i> Vauvel

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
amerikaansche eik	B P	slecht	grootendeels verdwenen.
wone walnoot	B	matig	plaatselijk gebruikt bij boerderijen.
heaboompje	S	slecht	als voren, als sierstruik.
gagel	S	"	weinig gebruikt als sierstruik bij boerderijen.
pinneesch klokje	S	goed	algemeen gebruikt als sierstruik.
iem	S	"	als voren.
h	B P	"	algemeen gebruikt in boschverband, langs wegen in dorpen en op erven van boerderijen.
amerikaansche esch	P	"	boschvormend gebruikt.
tbladige esch	B	vrij goed	als proef bij wegbeplanting gebruikt. Geslaagd.
wone liguster	S	goed	veel gebruikt als heg, ook boschvormend.
	S	"	weinig gebruikt, als heg.
	S	matig	als voren. Sterft 's winters veel in.
	S	goed	weinig gebruikt als sierstruik.
oemblijvende liguster	S	"	algemeen gebruikt voor hegbeplanting.
ansche sering	S	matig	weinig gebruikt bij boerderijen.
wone sering	S	"	algemeen gebruikt bij boerderijen.
itte sering	S	"	weinig gebruikt bij boerderijen en op begraafplaats.
arse sering	S	"	als voren.
ligostruik	S	goed	als sierstruik gebruikt in dorp.
wtenstruik	S	goed	als sierstruik gebruikt in dorp.
azenstruik	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik, sterke groeier.
pengoudenregen	S	"	weinig gebruikt als sierstruik bij boerderijen.
udenregen	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik bij boerderijen.
	B	slecht	enkele exemplaren gebruikt op de begraafplaats; de meeste verdwenen.
acia	S	goed	vrij veel gebruikt in en bij de dorpen, op beschutte plaatsen goed, veel sterfte door fusarium.
wone brem	S	goed	algemeen gebruikt op zandige plaatsen, langs kanaal- of wegbermen. Vriest nogal sterk in. Kan het beste worden gezaaid of als 1-jarig verplant.
speldoorn	S	"	minder gebruikt, overigens als voren, sterft meer in.
p. honingboom	B	slecht	enkele exemplaren op begraafplaats gebruikt.
le lupinenstruik	S	goed	als proef geslaagd, vriest bij strenge vorst geheel af, doch zaait zichzelf wegr.
itte idem	S	"	idem.
uidsluier	S	"	veel gebruikt als klimplant, sterke struik.
ataan	B	"	pas aangeplant in dorpen en bij boerderijen.
wone boschrank	S	slecht	weinig gebruikte klimplant; verdwenen.
	S	"	geheel verdwenen.
gedoorn	S	vrij goed	weinig gebruikt in dorpen en bij boerderijen.
ilboom	S	goed	matig gebruikt, overal.
entenboompje	S	"	algemeen gebruikt in dorpen en bij boerderijen.
"	S	"	als voren.
"	S	"	zeer weinig gebruikt.
pelbes	S	"	plaatselijk gebruikt, meest bij boerderijen.
"	S	"	als voren.
p. kweepeer	S	"	algemeen bij boerderijen.
eidoorn	B	"	als sraatbeplanting in dorpen.

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT, SOORT EN/OF VARIËTEIT
119		<i>Crataegus macracantha</i> Lodd., syn. <i>C. coccinea</i> L.
120		var. <i>macracantha</i> Dudley
121		" <i>crus-galli</i> L.
122		" <i>monogyna</i> Jacq.
123		" <i>Oxyacantha</i> L.
124		" O. var. <i>Paulii</i> Rehd; syn. C.O. var. <i>Paul's scarlet</i> Hort.
125		<i>Cotoneaster Dielsiana</i> Pritz. syn. <i>C. appianata</i> Duthie
126		" <i>Francheti</i> Bois
127		" <i>Simonsii</i> Baker
128		<i>Kerria japonica</i> D.C.
129		<i>Malus atrosanguinea</i> C.S. syn. <i>M. floribunda</i> var. <i>purpurea</i> Hort.
130		" <i>floribunda</i> Sieb.
131		" <i>purpurea</i> var. <i>Eleyi</i> Rehd.
132		<i>Physocarpus opulifolius</i> Maxim. syn. <i>Spiraea opulifolia</i> L.
133		<i>Prunus avium</i> L.
134		" <i>cerasifera</i> Ehrh. syn. <i>Pr. myrobalana</i> Loisel
135		" " var. <i>Pissardië</i> Koehne, syn. <i>Pr. Pissardii</i> Carr.
136		" <i>Pádus</i> L.
137		" <i>mahaleb</i> L.
138		" <i>serotina</i> Ehrh.
139		" <i>serrulata</i> var. <i>Seki-yama</i> Wils. syn. <i>P.S. var. Hizakura</i> Hort.
140		" <i>spinosa</i> L.
141		" <i>virginiana</i> L.
142		" <i>Laurocerasus</i> L. var. <i>schipkaensis</i> Spaeth.
143		<i>Prunus Laurocerasus</i> L. var. <i>Reijnvaanii</i> Hort.
144		" " <i>rotundifolia</i>
145		<i>Rhodotypus kerrioides</i> Sieb. et Zucc.
146		<i>Rosa canina</i> L.
147		" <i>rubiginosa</i> L.
148		" <i>rugosa</i> Thunb.
149		" " var. <i>alba</i> Ware
150		" " hybr. <i>F. J. Grootendorst De Goey</i>
151		" <i>sinensis</i> var. <i>manetti</i> Dipp. syn. <i>R. manetti</i> Crivelli
152		<i>Sorbus americana</i> Marsh.
153		" <i>Aria</i> Crantz.
154		" <i>Aucuparia</i> L.
155		" <i>intermedia</i> Pers. syn. <i>S. scandica</i> E. Fries
156		<i>Spiraea arguta</i> Zab.
157	Salicaceae	" <i>Vanhouttei</i> Zab.
158		<i>Populus alba</i> L.
159		" " var. <i>pyramidalis</i> Bge
160		syn. <i>P.a. var. Boileana</i> Lauche
161		" <i>angulata</i> Ait.
162		" <i>robusta</i> Schn.
		" <i>candicans</i> Ait.
		" <i>trichocarpa</i> Torr. et Gray

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
	S	goed	als sierstruik in dorpen, weinig gebruikt.
	S	"	als voren.
stijlige meidoorn	S	"	veel gebruikt als heg, struik of windscherm.
wone meidoorn	S	"	als voren.
bbelle roode meidoorn	B	"	plaatselijk gebruikt als sierboom bij boerderijen.
	S	"	algemeen gebruikt bij boerderijen.
tsmispel	S	"	als voren.
vergmispel	S	"	idem.
denbloempje	S	vrij goed	plaatselijk gebruikt bij boerderijen.
	S	goed	matig gebruikt in dorpen en bij boerderijen.
	S	"	als voren (zeer rijk bloeiend).
	S	"	alleen gebruikt in dorpen.
eeuwbalspirea	S	"	matig gebruikt bij boerderijen.
ete kers	S	"	algemeen gebruikt bij boerderijen en in dorpen.
rspruim	S	"	Vrij veel gebruikt als groepen in boschjes.
	S	"	matig gebruikt bij boerderijen, sterft 's winters nogal in.
ogelkers	S	"	veel gebruikt, zoowel algemeen als in boschverband.
eichselkers	S	"	weinig gebruikt in dorpen en bij boerderijen.
merikaansche vogelkers	S	"	algemeen gebruikt in singels en groepen.
	S	"	matig gebruikt in dorpen en bij boeredrijen, zeer sterke struik.
p. sierkers	S	"	weinig gebruikt, v.n. in singels en wat bij boerderijen.
eedoorn	S	"	weinig gebruikt, v.n. in singels en groepen.
irginische kers	S	matig	plaatselijk gebruikt bij boerderijen.
urierkers	S	matig	plaatselijk gebruikt bij boerderijen.
urierkers	S	"	idem.
aimastruikje	S	goed	algemeen bij boerderijen.
ondsroos	S	"	algemeen bij boerderijen en in dorpen.
pttelroos	S	"	idem.
ap. bottelroos	S	"	idem.
"	S	"	idem.
"	S	"	plaatselijk gebruikt in dorpen, sterke soort.
	S	"	als haag op begraafplaats gebruikt, voldoet goed.
merikaansche lijsterbes	B	"	als straatbeplanting in een dorp, zeer geschikt.
eelbes	S	"	plaatselijk als groepjes in singels.
ijsterbes	S	"	algemeen op alle geschikte gronden als vulhout.
weedsche lijsterbes	B P	"	algemeen gebruikt als weg- en dorpsbeplanting en op erven van boerderijen. Zeer sterke houtsoort.
	S	slecht	weinig gebruikt, plaatselijk bij boerderijen.
	S	vrij goed	matig gebruikt bij boerderijen en in dorpen.
beel	B S	goed	matig gebruikt, in menging niet geschikt.
olleana	B	vrij goed	alleen gebruikt in dorp en op begraafplaats.
	B	goed	als wegbeplanting plaatselijk gebruikt.
	B P	"	algemeen en veel gebruikt.
alsempopel	B	"	plaatselijk enkele exemplaren.
	S	"	als voren.

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT, SOORT EN/OF VARIETEIT
163		<i>Populus marilandica</i> Bosc.
164		" <i>serotina</i> Hartig
165		" <i>canescens</i> Sm.
166		" <i>tremula</i>
167		<i>Populus nigra</i> L., var. <i>italica</i> du Roi syn. <i>P. nigra</i> var. <i>pyramidalis</i> Spaeth.
168		<i>Salix acutifolia</i> Willd.
169		" <i>alba</i> L.
170		" " var. <i>sericea</i> Goud
171		" " " <i>calva</i> G. F. W. Mey, syn. <i>S.</i> <i>coerulea</i> Sm.
172		" " " <i>vitellina</i> Stokes
173		" " " f. <i>britzensis</i> Späth.
174		" " " f. <i>pendula</i> C.S.
175		" <i>amygdalina</i> L.
176		" <i>caprea</i> L.
177		" <i>cinerea</i> L.
178		" <i>aurita</i> L.
179		" <i>daphnoides</i> Vill.
180		" <i>repens</i> var. <i>rosmarinifolia</i> Wimm. et Grab.
181		" <i>pentandra</i> L., syn. <i>S. Laurifolia</i> Wesm.
182		" <i>purpurea</i> L.
183		" <i>viminalis</i> L.
184	Sapindaceae	<i>Aesculus Hippocastanum</i> L.
185	Saxifragaceae	<i>Deutzia magnifica</i> Rehd.
186		syn. <i>D. crenata</i> var. <i>magnifica</i> Lem. " <i>scabra</i> f. <i>Pride of Rochester</i> Ellw. et Barry syn. <i>D. crenata</i> var. <i>Pride of Rochester</i> , Hort.
187		" <i>scabra</i> var. <i>plena</i> Rehd. syn. <i>D. crenata</i> var. <i>plena</i> Maxim.
188		<i>Philadelphus cononarius</i> L.
189		" <i>grandiflorus</i> Willd.
190		" <i>Lemoinei</i> Lem.
191		<i>Ribes alpinum</i> L.
192		" <i>aureum</i> Pursh
193		" <i>sanguineum</i> Pursh
194		" " var. <i>atrorubens</i> Loud. syn. <i>R.S.</i> var. <i>atrosanguineum</i> Kirschn.
195	Simarubaceae	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf.
196	Solanaceae	<i>Lycium halimifolium</i> Mill. syn. <i>L. vulgare</i> Dun. syn. <i>L. barbarum</i> Ait. non <i>L.</i> syn. <i>L. euro-</i> <i>paeum</i> Gouan. " <i>chinese</i> Mill., syn. <i>L. barbarum</i> Lour. non <i>L.</i>
197		<i>Tamarix pentandra</i> Pall.
198	Tamaricaceae	syn. <i>T. hispida aestivalis</i> Hort.
199		" <i>tetandra</i> Pall.

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
rabantsche stander	BP	goed	algemeen gebruikt.
auwe abeel	B	"	plaatselijk gebruikt voor wegbepanting.
l- of ratelpopulier	B	"	alleen in dorpen.
aliaansche populier	BS	"	als straatboom in dorp en verder enkele groepjes.
	BP	"	veel gebruikt als wind-scherm en boomgaard en in dorpen en begraaftplaats.
aspische wilg	S	slecht	weinig gebruikt, sterft 's winters veel in.
hietwilg	BP	goed	algemeen gebruikt, ook als knotwilg.
verwilg	S	"	plaatselijk in groepen, sierlijke struik.
"	B	"	plaatselijk in dorpen en bij boerderijen, moeie boom.
ndwilg	SS	"	hier en daar, langs tochten, kanalen en bij boerderijen.
	S	"	als sierstruik algemeen gebruikt.
eurwilg	B	matig	enkele gebruikt op begraaftplaats.
mandel- of tweebastwilg	SS	goed	algemeen langs kanalen, tochten, plaatselijk op erven.
aterwilg	S	"	plaatselijk als struik langs wegen, in boschjes en op erven van boerderijen.
rijze wilg	S	"	als voren.
oorde wilg	SS	"	als voren.
rijprie wilg	SS	matig	weinig gebruikt. Sterft 's winters veel in.
	SS	slecht	enkele groepjes geplant, voldoen niet.
urierwilg	SS	goed	als sierstruik in dorpen en bij boerderijen.
tterwilg	S	"	plaatselijk gebruikt bij boerderijen, in dorpen en langs kanalen.
twilg	S	"	algemeen gebruikt.
hardekastanje	B	slecht	weinig gebruikt, niet bestand tegen zeeklimaat.
	S	goed	Groeit zeer langzaam.
	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik bij boerderijen.
	S	"	als voren.
	S	"	als voren.
perenjasmijn	S	"	algemeen gebruikt als sierstruik bij boerderijen.
rootbl. jasmijn	SS	"	als voren.
	SS	"	als voren.
penbes	SS	"	als voren.
ele. ribes	SS	"	als voren.
ewone ribes	SS	"	als voren.
ode ribes	S	"	als voren.
emelboom	B	slecht	enkele exemplaren gebruikt in 1 dorp, niet geslaagd.
oksdooorn	S	"	als proef aangeplant. Groeit wel snel doch sterft in den winter weer veel in.
	S	"	
	S	"	als voren.
	SS	goed	algemeen gebruikt in dorpen en bij boerderijen.
	S	"	als voren.

Volg no.	FAMILIE	GESLACHT, SOORT EN/OF VARIETEIT
200	Tiliaceae	Tilia americana L. syn. T. glabra Vent.
201	" cordata Mill. syn. T. parvifolia Ehrh.
202	" euchlora Koch, syn. T. dasystyla Kirchn.
203	" petiolaris Hook F. syn. T. alba Koch.
204	" platyphyllos Scop.
205	" vulgaris Hayne syn. T. intermedia D.C.
206	Ulmaceae	Ulmus campestris L.
207	" Dr Christine Buisman syn. lep. no. 24
208	" hollandica Mill.
209	" scabra var. fastigiata Rehd.
210	" vegeta Lindl. syn. U. hollandica Mill. var.
211	Vitaceae	Parthenocissus tricuspidata Planch.
		syn. Ampelopsis Veitchii Hort.

HOLLANDSCHE BENAMING	Gebruikt bij beplanting als	GROEI	TOELICHTING EN OPMERKINGEN:
Amerikaansche linde . . .	B	slecht	weinig gebruikt. } De lindensoorten groeien slecht. idem } Ze zijn niet tegen het zeecli- } maat bestand. Op beschutte } plaatsen staat een enkel goed } exemplaar.
nbladige linde . . .	B	"	
nlinde . . .	B	"	
ngaarsche zilverlinde . . .	B	"	
erlinde . . .	B	"	
landsche linde . . .	B	"	alleen als proef geplant in de eerste beplanting. enkele exemplaren als proef geplant bij boerderijen. hier en daar als weg- of straatboom bij wijze van proef geplant. als voren.
diep . . .	S	goed	
24 . . .	B	"	
zone iep . . .	B	"	
imiep . . .	B	"	eenige exemplaren gebruikt bij boerderij. op enkele plaatsen als klimplant gebruikt.
ntingdon iep . . .	B	vrij goed	
estendige wilde wingerd . . .	S	" "	

VERKLARING:

Gebruikt bij beplanting als:

B = boom.

S = blijvende struik, welke niet tot boom wordt
opgeleid.P = 2- of meerjarig plantsoen, waaruit zowel
boomen als struiken kunnen worden opgeleid.