Deze brief spreekt voor zichzelf en bewijst nogmaals dat *Megastigmus spermotrophus* een gevaarlijke zaadvernieler van het douglaszaad is. Ik moge hier echter bijvoegen dat juist in jaren dat de douglas weinig kegels draagt de zaden van die kegels in verhouding veel sterker aangetast zijn door het bewuste sluipwespje dan in jaren dat er een grote dracht aan kegels bij de douglas plaatsvindt. In 1959, bekend als een zeer goed coniferen-zaadjaar, kwam genoemde zaadvernieler procentsgewijze heel weinig voor, maar in 1960, een jaar dat er weinig douglaskegels waren, verhoudingsgewijs veel meer.

Dit in ogenschouw nemende, acht ik het van belang dat door de een of ander het Megastigmus-vraagstuk weer eens wordt opgevat. Er zijn namelijk tal van vragen die m.i. nog niet zijn opgelost:

1. Wat zijn de resultaten van de ontsmetting met zwavelkoolstof, aan het begin van dit artikel vermeld?
2. Zijn er ontsmettingsstoffen bekend die minder brandgevaarlijk zijn dan zwavelkoolstof en dezelfde uitwerking hebben?
3. Is het juist dat de zaden waarin een larve van een Megastigmus-soort voorkomt lichter zijn dan die, welke niet aangetast zijn? Zo ja, dan zouden de aangetaste zaden met de moderne reinigingsmachines gemakkelijk gescheiden kunnen worden van de goede zaden.
4. Zijn er wellicht meer soorten parasieten bekend van Megastigmus spec.? Dit zou belangrijk zijn, daar een natuurlijke bestrijding van de Chalcidide-soorten veel effectiever is dan de bestrijding in het geoogste zaad (m.i. wordt slechts een klein percentage van de aanwezige kegels in een bepaald gebied geoogst: de rest blijft aan de bomen zitten).

Voor suggesties, op- of aanmerkingen houd ik mij gaarne aanbevolen.

„Schovenhorst" Putten (G.), juli 1962.

OOGSTVERWACHTINGSBERICHT VOOR BOOMZADEN SEIZOEN 1962/1963

De voorspelling van een geringe oogst van *groveden* in het oogstverwachtingsbericht van het vorige seizoen, zal helaas uitkomen voor het seizoen 1962/1963. Heeft het vorige seizoen nog een vrij goede oogst aan 2-jarige kegels opgeleverd, waarvan door verscheidene boseigenaren een dankbaar gebruik is gemaakt, voor dit seizoen zal alleen van een beneden middelmatige oogst sprake zijn (en dit geldt ook voor West-Duitsland), zodat grotendeels op oude voorraad geteerd zal moeten worden. De verwachtingen voor 1963/1964 zijn al niet beter, zodat weer op een beneden middelmatige oogst gerekend zal moeten worden.

Ten aanzien van de *Oostenrijkse den* en de *Corsicaanse den* is de situatie niet anders: ook hier een onbetekenende oogst voor het seizoen 1962/1963 en het daarop volgende.

De overige naaldhoutsoorten: *Japanse lariks, fijnspar* en *douglas* laten ook dit seizoen weer volledig verstek gaan. Invoer zal noodzakelijk zijn en het blijft daarbij zaak vooral te letten op de herkomst van het zaad.

Van het loofhout geeft de *beuk,* evenals verleden jaar een misoogst; ook van de *Amerikaanse eik* valt weinig te verwachten. Ten aanzien van de *inlandse eik* is de verwachting weliswaar iets gunstiger, maar als gevolg van het koude weer in het voorjaar en de zomer, zijn de eikels klein gebleven, en zal de oogst toch wel beneden middelmatig blijven.

Van de berk en de elzen valt ook dit jaar niet meer te melden dan een middelmatige oogst, die het slechtst is bij de *witte els,* iets minder slecht bij de *berk* en ten slotte middelmatig bij de *zwarte els;* overigens wisselen hier de vooruitzichten plaatselijk zeer sterk.

Mededeling van het Staatsbosbeheer.