

# Ingezonden Berichten.

## OOGSTBERICHT VAN BOOMZADEN 1942—1943.

Het oogstbericht voor het seizoen 1942—1943 is wederom samengesteld uit gegevens, die door de gewaardeerde medewerking van verschillende lichamen en vele particuliere boschbezitters zijn verkregen.

Evenals in de voorgaande jaren is het land verdeeld in zeven waarnemingsgebieden, die hieronder met de aantallen ontvangen oogstberichten zijn genoemd:

landstreek	aantal oogstberichten
1. Noord-Brabant en Limburg . . . . .	31
2. Veluwezoom . . . . .	7
3. Overige Veluwe . . . . .	21
4. Utrecht . . . . .	10
5. Achterhoek en Zuid-Overijssel . . . . .	16
6. Overig deel van Overijssel, Friesland en Drenthe . . . . .	19
7. Duinstreek . . . . .	9
Geheele land . . . . .	113

Aan het landsgemiddelde van de oogstverwachting voor de meer algemeen voorkomende houtsoorten als groveden, eik, beuk en berk kan een vrij groote nauwkeurigheid worden toegekend. Voor Houtsoorten als Oostenrijksche den, Corsicaansche den en bergden beschikken we slechts over een vrij klein aantal waarnemingen, die bijna steeds op de duinstreek betrekking hebben. De bewerking van de gegevens is op dezelfde wijze geschied als in de voorgaande jaren. De berichtgevers hebben den vermoedelijksten oogst geschat in procenten van den maximalen oogst, waarbij de volgende waardeering geldt:

- 90 = buitengewoon goed
- 80 = zeer goed
- 70 = goed
- 60 = vrij goed
- 50 = middelmatig
- 40 = beneden middelmatig
- 30 = slecht
- 20 = zeer slecht
- 10 = misoogst.

### Toelichting.

#### Groveden (*Pinus silvestris* L.).

De oogstverwachting voor den groveden komt vrijwel overeen met hetgeen in den herfst van het jaar 1941 op grond van de hoeveelheid éénjarigen kegels is voorspeld.

Thans wordt verwacht, dat de oogst iets beneden middelmatig zal zijn; slechts in het noorden van het land is de verwachting iets boven middelmatig.

De hoedanigheid van het zaad wordt over het algemeen goed geacht; van schade, door eekhoorns veroorzaakt, wordt in de oogstberichten ook dit jaar weinig melding gemaakt.

De vooruitzichten voor het seizoen 1943—1944 zijn, blijkens de schattingen van de hoeveelheid éénjarige kegels, gelijk aan die voor dit jaar; de verwachting kan ten hoogste middelmatig worden genoemd.

*Oostenrijksche den (Pinus nigra var. austriaca Endl.).*

De gegevens voor de oogstverwachting van deze boomsoort hebben hoofdzakelijk betrekking op de duinstreek; de aangegeven cijfers voor de Veluwezoom steunen op 2 gegevens, die van de Veluwe en het Noorden des lands slechts op één enkele waarneming, terwijl aan die voor Utrecht vier opgaven ten grondslag liggen.

In vergelijking met de verwachting, betreffende éénjarige kegels in het voorgaande jaar, zal de oogst in het komende seizoen vermoedelijk slechter zijn.

Op grond van de waarnemingen van de hoeveelheid éénjarige kegels zal de oogst voor het seizoen 1942—1943 vermoedelijk wederom gunstig uitvallen; volgens de verkregen gegevens moet deze beneden het middelmatige liggen.

*Corsicaansche den (Pinus nigra var. corsicana Loud.).*

De verwachtingen voor den Corsicaanschen den zijn ongeveer gelijk aan die voor den Oostenrijkschen den. Ook hier hebben vrijwel alle waarnemingen betrekking op de duinstreek; uit het Zuiden des lands en uit Utrecht zijn 3 waarnemingen ontvangen, terwijl van de Noordelijke provincies, van de Veluwe en van de Veluwezoom slechts één waarneming werd ontvangen.

De verwachtingen voor het komende seizoen zijn geheel in overeenstemming met hetgeen dienaangaande op grond van de hoeveelheid eenjarige kegels het voorgaande jaar kon worden aangenomen, de vermoedelijke oogst kan ten hoogste middelmatig worden genoemd.

De thans verzamelde gegevens over den vermoedelijken oogst voor het seizoen 1943—1944 kenmerken dezen wederom als beneden middelmatig.

*Bergden (Pinus montana Mill.).*

Ook voor deze boomsoort heeft het meerendeel der waarnemingen betrekking op de duinstreek. Overeenkomstig de schatting van éénjarige kegels in het voorgaande jaar kan een middelmatige oogst worden verwacht. De vooruitzichten voor het seizoen 1943—1944 wijken niet sterk af van die voor dit seizoen.

*Zeeden (Pinus maritima Poir.).*

De berichten over den zeeden zijn voor het grootste deel afkomstig uit Noord-Brabant en de duinstreek. De oogst zal vermoedelijk iets minder goed uitvallen dan de hoeveelheid éénjarige kegels het vorig jaar deed verwachten en moet beneden middelmatig worden genoemd. De verwachtingen voor het seizoen 1943—1944 komen hiermede vrijwel overeen.

*Fijnspar (Picea excelsa Lk.).*

De berichten over de oogstverwachting voor deze boomsoort zijn van dien aard, dat vermoedelijk op een vrij goeden oogst van dit zaad kan worden gerekend.

*Groene douglas (Pseudotsuga Douglasii Carr.).*

De verwachtingen voor deze boomsoort zijn iets lager dan die voor den fijnspar; toch kunnen zij nog middelmatig tot vrij goed worden genoemd.

*Zomereik (Quercus Robur L.).*

Land ongunstig; voor den zomereik zijn voor alle deelen van het land oogstberichten; de verwachting moet ook dit jaar slecht worden genoemd.

*Amerikaansche eik (Quercus rubra L.).*

De verwachting voor den Amerikaanschen eik is weliswaar iets beter

dan voor den inlandschen eik, doch kan over het geheele land genomen ook niet meer dan slecht tot beneden middelmatig worden genoemd.

*Beuk (Fagus silvatica L.).*

De ontvangen gegevens voor deze boomsoort doen een goeden tot zeer goeden oogst verwachten.

*Ruwe berk (Betula pendula Roth).*

Ook dit jaar is de verwachting voor den ruwen berk voor de provincie Utrecht het hoogst; evenwel kan thans over het geheele land de verwachting goed worden genoemd.

*Zachte berk (Betula pubescens Ehrh.).*

De ontvangen gegevens voor deze boomsoort doen een oogst verwachten, die vrij goed tot goed is te noemen.

*Zwarte els (Alnus vulgaris Hill.).*

De ontvangen berichten wijzen op een vrij goeden oogst, die uit het Noorden van het land zelfs op een goeden oogst.

*Witte els (Alnus incana Mönch).*

De vooruitzichten voor deze boomsoort zijn over het algemeen vrij goet te noemen.

#### Algemeene opmerkingen.

Uit de gegevens van de 113 medewerkers blijkt, dat de oogstverwachting voor het komende seizoen in het algemeen ongunstig moet worden genoemd, voor wat de naaldhoutsoorten betreft met uitzondering van den fijnspar. De oogstverwachting is zoowel voor den zomereik als voor den Amerikaanschen eik slecht, terwijl voor de andere loofhoutsoorten de vooruitzichten bevredigend zijn. Hierbij valt vooral de beuk op, waarentrent de verwachting goed tot zeer goed is.

Boomsoort	N.-Brabant en Limburg	Veluwezoom	Overige Veluwe	Utrecht	Achterhoek en Z. Overijssel	Overige deel van Overijssel Friesland en Drenthe	Duinstreek	Aantal berichten	Gemiddelde verwachting voor het land	
									in cijfers	omschrijving
Grove den										
1942—1943	48	43	48	47	43	53	47	94	47	middelmatig
1943—1944	48	40	47	59	49	50	43	72	48	middelmatig
Ooster. den										
1942—1943	—	35	50	38	—	10	33	15	33	slecht
1943—1944	—	50	40	47	—	—	33	11	43	beneden middelmatig
Corsic. den										
1942—1943	33	40	50	43	—	10	30	16	39	beneden middelmatig
1943—1944	25	50	40	47	—	—	32	13	39	beneden middelmatig
Bergden										
1942—1943	—	—	50	70	60	50	42	11	54	middelmatig
1943—1944	—	—	55	60	—	50	48	9	53	middelmatig
Zeeden										
1942—1943	46	—	—	70	10	50	32	20	42	beneden middelmatig
1943—1944	39	—	—	60	—	—	35	17	44	beneden middelmatig
Fijnspar	55	60	69	71	58	68	50	68	62	vrij goed
Groene douglas	50	73	64	64	50	50	40	64	56	middelm. tot vrij goed
Zomereik	30	26	39	38	18	18	32	92	29	slecht
Amerik. eik	49	45	36	43	26	27	20	80	35	slecht tot ben. midd.
Beuk	68	79	83	80	77	76	76	84	77	goed tot zeer goed
Ruwe berk	66	68	71	75	60	71	70	85	69	goed
Zachte berk	66	68	67	69	53	68	67	65	65	vrij goed tot goed
Zwarte els	63	67	62	63	58	70	60	47	63	vrij goed
Witte els	59	63	60	68	57	63	60	45	61	vrij goed