

Ziekten aan kwee

DEZE KLEINE
BLIJVENDE,
WINTERHARDE
BOOM, HEEFT
PRECIES DEZELFDE
'VIJANDEN', ALS DE
PEREBOOM.

DOOR EEN LANGE
RIJPINGSTIJD VAN DE
KWEPEER EN DE
LATE OOGSTTIJD,
ZIJN DE VRUCHTEN
KWETSBAAR VOOR
BEDERF.



Tips voor het kweken

Plant kwepeer in een leemachtige, grof korrelige bodem die kleiachtig is en niet te warm wordt (grasmat).
Vermijd kalkrijke bodem, die chlorose rijk is.

Belangrijkste plagen

Bladbruin

Na regenachtig weer, zien we roodachtig en later bruine vlekken op de jonge bladeren, die dan later op de vruchten overgaan.

Behandeling

Vooraf jonge planten goed in de gaten houden en snel maatregelen nemen.
De eerste behandeling (spuiten) hiervoor doen we in de bloeitijd, de tweede een maand later.



Monilia

De Moniliaschimmel laat de bloemclusters verdrogen en twijgen afsterven.

Later worden de vruchten ook door de monilia aange-tast, of de jonge kweeperen worden bruin, vallen af of blijven gemummificeerd aan de boom.

Infectie wordt in de hand gewerkt door vreterij van bladrollers (beschadiging aan vruchten).



Behandeling

Sputen hiervoor in maart.

Verwijder geïnfecteerde plantendelen.

Minder vaak voorkomende problemen

Echte meeldauw:

Wit, poederachtige laag op de bladeren en jonge scheuten.

Behandeling

Aantasting verwijderen en vernietigen, of sputen.

Echte meeldauw



Rupsen:

Vanaf juli kruipen de bladrollers zich een gang in de vrucht, bruine ontlasting is waar te nemen.

De perzikroller eet in augustus aan de oppervlakte van de beginnende gangen.

Behandeling

Vang de vlinders met een feromoonval.

Verzamel de aangetaste vruchten.



Niet parasitaire oorzaken

Ijzergebrek bij kalkrijke bodem, geel gebladerte, necrose. Vooral bij jonge planten opletten.

Behandeling

Verzuur de grond met vogelmest of gedroogde varkensmest.

Werk ijzer in de grond in februari.



Het kweeperenras 'Vranja' is vrij ongevoelig voor ziekten.