

Lammeren uitscharen: €4 tot €15 lagere voerkosten!

Jan Verkaik



Lammeren op het juiste moment afleveren vereist inzicht in voerstrategieën. Het PV constateert dat het weidend afmesten zonder krachtvoer economisch het meest aantrekkelijk is. Vermijd afleververtragingen door managementfouten. Eén week te laat ontwormen betekent vaak een maand later afleveren!

Slachtrijp afleveren

Het rendement is te verbeteren door slachtlammeren daadwerkelijk slachtrijp af te leveren en door de goedkopere kilo's er zelf aan te mesten in plaats van ze als weidelam te verkopen. Het laatste geeft ook minder dierbewegingen. Meer inzicht in de effecten van de verschillende voerstrategieën helpt de lammeren vaker slachtrijp af te leveren. Bovendien is daarmee vooraf beter in te spelen op verwachte marktontwikkelingen zoals de islamitische offerfeesten. Het PV heeft daarom de meest gebruikelijke voerstrategieën met elkaar vergeleken.

Resultaten

De lammeren die beperkt zijn bijgevoerd, 260 gram lammerkorrel per lam per dag, waren in vergelijking tot de lammeren die niet zijn bijgevoerd en uitgeschaard op najaarsgras gemiddeld een maand eerder op gewicht en slachtrijp (zie tabel 1). De minimale eindgewichten van 36 en 40 kilogram voor respectievelijk ooi- en ramlammeren lijken bij tweewekelijks afleveren goede indicatoren voor de slachtrijpheid van kruisinglammeren Texelaar X Swifter.

Krachtvoer bijvoeren of uitscharen

Het is goedkoper om de kilo's er aan te weiden door de lammeren uit te scharen dan er met krachtvoer aan te voeren tijdens het weideseizoen. Uitgaande van € 0,40 per week per lam aan weidegeld bedraagt het verschil in voerkosten voor het realiseren van een gewichtstoename van 5 kg na uitscharen of al tijdens het weideseizoen door lammerkorrel bij te voeren € 4 per afgelamd ooi.

Tabel 1 Resultaten lammeren krachtvoer bijvoeren en uitscharen per geslacht

	OOI		RAM	
	bijvoeren	najaarsgras	bijvoeren	najaarsgras
Eindgewicht (kg)	37,2	37,2	42,0	41,3
Groei (g/dag)	220	185	251	207
Groeiperiode (mnd)	5	6	5	6
Bevleedsheid (SEUROP)	U-	U-	U-	U - U ⁰
Vetbedekking (SEUROP)	2+	20 - 2+	20 - 2+	20
Voerkosten (euro/afgelamd ooi)	6,5 - 17,4	2,5	6,5 - 17,4	2,5

Het beperkt bijvoeren van lammerkorrel gedurende de gehele aanhoudperiode aan alle lammeren resulteert in een totale opname van gemiddeld 39 kg/lam wat neerkomt op € 17,40 per afgelamd ooi. Beperk als u toch wilt bijvoeren, de krachtvoerkosten door bijvoorbeeld alleen de drielinglammeren of na spenen de lichtste lammeren bij te voeren.

Goed management

Goed management geeft echter de eerste groeiwinst. Managementfouten leiden nogal eens tot groeiverstoringen. De daaruit voortvloeiende afleververtraging duurt vaak langer. Jonge lammeren groeien bovendien harder dan oudere. Vermijd groeiverstoringen daarom zoveel mogelijk en vooral in de eerste drie maanden na de geboorte.

Het inscharen in jong voedzaam gras van gemiddeld zo'n 9-10 cm is de truc om de groei erin te houden. Een afname van de voederwaarde met 80 VEM per kg drogestof kost in de regel 25 gram groei per dag.

Het diermanagement moet gericht zijn op het behoud van een goede gezondheid van zowel lam als ooi. Vooral de maagdarmwormbestrijding verlangt steeds de volle aandacht. Eén week te laat ontwormen resulteert al gauw in een maand later afleveren (zie kader 'vuistregels voor ontwormen').

Afmesten op stal

Een derde toegepaste voerstrategie is het afmesten van lammeren op stal na weidegang. De resultaten van deze rantsoenvergelijking volgen in het augustusnummer van Praktijkkompas.



Hoe hard groeien uw lammeren?



Benut u de groeipotentie van uw lammeren optimaal?

"Vuistregels voor ontwormen lammeren"

- 1e ontworming binnen 2 tot 4 weken na inscharen
- Herhalingsbehandeling op 5 weken na vorige ontworming
- Na behandeling meteen verwijderen
- Verlengen behandelingsinterval als de lammeren minimaal 2,5 maanden oud zijn en ze meteen na behandeling zijn ingeschaard op 'schone' percelen.

