



Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij. Dierenarts Toon Meesters uit Roosendaal, Jef Laureyns, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke) en Jan Dijkhuizen, werkzaam bij de Graafschap dierenartsen te Vorden, wisselen elkaar af bij een beschrijving van ziektebeeld tot behandeling.

Alleen bij koorts is antibioticumbehandeling van nut


Aan de nageboorte staan

Afgelopen week kreeg ik toevallig twee keer telefoon over een zelfde soort geval. Het ging in beide gevallen om een koe die nog aan de nageboorte stond. Het is uitzonderlijk dat veehouders hiervoor nog contact opnemen. Doorgaans vragen ze voor dit soort aandoeningen niet meer om hulp van de dierenarts.

Het ging bij een van de veehouders om een Oost-Vlaamse witrode koe. Het dier had 39,5°C lichaamstemperatuur. De algemene toestand van de witrode koe was verder goed, maar de nageboorte hing uit de vagina tot bijna op de grond.

In dergelijke gevallen probeer ik altijd of de nageboorte nog gemakkelijk af te halen is. De nageboorte zat op nog slechts drie plekken vast en op die manier kon ik de vruchtvliezen voorzichtig losmaken. De nageboorte kon in korte tijd vlot worden losgemaakt en kon ook volledig worden afgehaald. Omdat het dier koorts had, besloot ik om na het verwijderen van de nageboorte ook nog een antibioticum in de nek te spuiten. Ik gaf de veehouder daarbij het advies om de lichaamstemperatuur van de koe de komende week nog dagelijks te controleren. De afspraak was dat hij bij een verhoging opnieuw een antibioticum zou toedienen.

Bij navraag tijdens een volgend bezoek aan het bedrijf voor een ander ziektegeval bleek dat een verdere behandeling bij deze witrode koe niet nodig was geweest.



De encyclopedie **retentio secundinarum**

Van het aan de nageboorte blijven staan of *retentio secundinarum* is geen echte oorzaak bekend. Er is een verhoogd risico op deze aandoening in geval van infecties, bij vroeggeboorte of abortus, bij een moeilijke geboorte, bij een tweelingdracht of in geval van hypocalcemie (melkziekte).

Zolang het percentage dieren dat aan de nageboorte blijft staan, onder de vijf procent blijft, is sprake van een normaal percentage. Als het aantal gevallen wel hoger ligt, is het goed om dat met de dierenarts te bespreken.

De huidige werkwijze bij koeien die aan de nageboorte blijven staan, is afwachten. Wanneer een groot deel van de nage-

boorte uit de vulva hangt, dan is het dikwijls mogelijk om de nageboorte met de hand voorzichtig los te maken en te verwijderen. Als de vruchtvliezen niet loskomen, dan kunnen om hygiënische redenen de zichtbare delen worden afgeknipt.

Verder luidt het advies om de temperatuur van de koe op te meten gedurende enkele dagen. Bij een normale temperatuur is verder ingrijpen niet nodig. Als er toch koorts als gevolg van een infectie optreedt, is het raadzaam de koe gedurende drie dagen met antibioticum te behandelen.

Behandelen met hormonen, prostaglandinen of oxytoxine heeft geen nut bij koeien die aan de nageboorte blijven staan. Noch voor het afkomen van de nageboorte, noch voor de latere vruchtbaarheid heeft hormoonbehandeling op dat moment effect.

