

Drachtplanten

Lederboom en blauwe spirea

Tekst en foto's Louis van de Goor



Ptelea



Caryopteris

Ptelea trifoliata

De Nederlandse naam voor deze heester of kleine boom is lederboom. Van oorsprong komt deze plant voor in Mexico en Noord-Amerika. De lederboom behoort tot de familie van de ruitachtigen. *Ptelea trifoliata* bloeit in mei-juni, in schermen met roomwitte bloemen. De bloeiduur is ongeveer 14 dagen. Gedurende de bloei worden de bloemen rijklijk bezocht door de bijen en andere insecten.

Na de bloei ontstaan de vruchten. Als je die van bovenaf bekijkt, zie je dat er drie 'vleugeltjes' om het zaadje zijn gevormd. De 'vleugeltjes' lijken van papier gemaakt. Ze worden zelfs transparant. Het is niet makkelijk om nauwkeurig te beschrijven hoe de vruchtjes er dan uitzien. Bekijk daarom deze bijzondere vruchtvorming zelf eens. De bladeren zijn ovaal en hebben een gladde rand. Zoals de naam al aangeeft (trifoliata) staan de bladeren met zijn drieën aan één bladsteel. De bladeren verkleuren in de herfst goudgeel. U kunt de lederboom toepassen als heester of als boom.

Als heester zal hij een hoogte bereiken van ongeveer vier meter. Hij wordt dus een stevige struik. Als boom zal de lederboom een hoogte bereiken van zes à acht meter. Als boom is hij geschikt voor parken en plantsoenen. Als heester kan de lederboom toegepast worden op de achtergrond in de border.

De plant gedijt het beste op humusrijke vochthoudende grond. Wilt u van de lederboom een boom kweken, dan zal begeleidende snoei noodzakelijk zijn. De zijscheuten moeten dan verwijderd worden en men zal een stam moeten kweken. Als zich eenmaal een stam gevormd heeft, hoeft u niet meer te vrezan voor herhaaldelijke opslag. Ook heeft de lederboom als boom gedurende de eerste jaren na het planten een boompaal nodig.

De soort verdraagt stevige snoei. Toch is snoeien in de meeste gevallen niet nodig. Kiest u er toch voor om te snoeien dan kunt u dit het beste aan het einde van de winter of in het begin van het voorjaar doen.

Caryopteris clandonensis

Caryopteris een lage blauw bloeiende heester die bloeit in de nazomer. Van eind augustus tot in september treft u de kleurrijke bloemen aan. U kent deze struik misschien beter als de 'blauwe spirea'. Hij behoort tot de ijzerhardfamilie. Van oorsprong komt hij voor in Oost-Azië. Van *Caryopteris clandonensis* komt een vijftiental cultivars voor in ons land. De bloemkleur varieert van lichtblauw tot donkerblauw. De bloei is zeer rijk. Onze bijen verzamelen er zowel stuifmeel als nectar

op. Het stuifmeel is grijsblauw van kleur. Aangezien de heester in het najaar bloeit, is de levering van stuifmeel vlak voor de winter van groot belang voor de bijen. De bloemen ontstaan in de bladoksels van het nieuwe schot, dus de bloei is op eenjarige scheuten. Snoei in de zomerperiode is dus niet aan te raden want dan zal hij in de nazomer niet bloeien. Beter is het om deze heester direct na de winter te snoeien, zodat er veel nieuw schot kan aangroeien waarop de bloemen rijklijk kunnen bloeien. Snoei is aan te raden als men graag veel bloemen wenst. De struik blijft dan ook compacter. De heester heeft grijsgroene bladeren. Dit is een vrij unieke kleur voor een heester. De bladeren verspreiden een aromatische en kruidige geur. In de herfst zal deze struik zich in prachtige herfsttinten tooien. De plant leent zich uitstekend voor in de vasteplantenborder. Ook voor vakbeplanting leent de blauwe spirea zich goed. Hij zal zich hier kunnen ontwikkelen tot een mooie ronde stuik. De takken hangen namelijk in sierlijke bogen. De hoogte van deze sierlijke heester bedraagt ongeveer 60 cm. Tussen hoog struikgewas of bomen komt hij niet tot zijn recht, omdat de bloei dan te wensen over zal laten. Steeds vaker treffen we de blauwe spirea ook aan in potten of bakken. Daarmee kan hij dus een schitterende aanvulling zijn op uw balkon of uw terras. Bij een goede ontwikkeling zal hij de pot camoufleren, terwijl hij weinig water vraagt. De blauwe spirea groeit op alle grondsoorten. Ook op droge zandgronden komt de heester rijklijk in bloei. De struik vraagt weinig onderhoud. In strenge winters kunnen de takjes echter invriezen en verloren gaan voor het komende jaar. In het vroege voorjaar verwijdert men dan de dode takjes zodat de heester weer nieuw schot kan vormen. Kies bij het planten van de struik daarom een beschutte plek uit om vorstschade zoveel mogelijk te beperken. Ook kunt u in de winter de plant beschermen met wat stro, vliesdoek, bladeren of snoeitakken die men overheeft.

De beste manier om deze plant te vermeerderen is de struik in het vroege voorjaar te scheuren. Stek is mogelijk van zomerscheuten. U moet er echter rekening mee houden dat dit ten koste zal gaan van de bloei in de daaropvolgende nazomer.

Naast vele bijen zullen hommels en vele vlindersoorten de bloemen massaal bezoeken. Ze zullen er hun voedsel verzamelen om de winter door te kunnen komen. Aangezien de blauwe spirea een plant is die weinig ruimte vraagt en vele toepassingsmogelijkheden heeft, mag deze prachtig bloeiende plant in geen enkele imkertuin ontbreken. ●