



De heer H. J. de Fluiter doet een mededeling over :

***Galeruca pomonae* Scop. als prooidier van den patrijs (Col.)**

D.d. 12 Sept. 1947 ontving Spr. van den heer H. A. SCHWARZ den krop van een patrijs. De vogel was op dien dag om 18 u. geschoten in de „Veenkampen” te Wageningen.

De „Veenkampen” liggen in het z.g. „binnenveld”, een gebied dat bestaat uit droge grasvelden (blauwgras), enkele stukken bouwland, op dat moment in hoofdzaak beplant met voederbieten, en den Eemwal, bestaande uit grond opgeworpen bij het graven van de grift en begroeid met velerlei kruidachtige planten.

De krop bleek bij onderzoek vrijwel geheel opgevuld te zijn met ♂ en ♀ van de keversoort *Galeruca pomonae* Scop. Niet minder dan 36 ♀♀ en 17 ♂♂ van deze soort kwamen uit den krop te voorschijn. De ♀♀ hadden allen een sterk opgezwollen abdomen, dat talrijke eieren bevatte. Opvallend was de gaafheid der dieren; slechts één der 53 dieren had een beschadigd dekschild.

Onder de dieren bevonden zich enkele (2) exemplaren met een zeer donkere, vrijwel zwarte bovenzijde; zij behoren tot de var. *anthracina* Weise, die door EVERTS o.m. voor Nederland vermeld wordt van Arnhem, Maastricht en de zeekust.

Daarnaast bevatte de krop enkele donkerbruine tot zwartbruine exemplaren; de meeste dieren (48 ex.) vertoonden echter de voor de soort normale lichtbruine tot geelbruine bovenzijde. Spr. laat een doosje met demonstratiemateriaal circuleren.

In den krop van den patrijs bevonden zich behalve deze kevers nog enkele haverkorrels, een vrucht van een viooltje, enkele zeer kleine „klaver”-blaadjes en wat ander plantaardig materiaal, dat reeds ten dele verteerd was.

D.d. 26-IX-'47 werd op dezelfde plaats wederom een patrijs geschoten. De krop van dit dier bevatte naast vele haverkorrels, „klaver“-blaadjes, ? boekweitzaad en wat gras, slechts 1 normaal gekleurd ♀ exemplaar van *G. pomonae* Scop.

*Summary.*

In the gizzard of a partridge (*Perdix perdix* L.), shot in the neighbourhood of Wageningen on the 12th of September 1947 36 ♀ ♀ and 17 ♂ ♂ of *Galeruca pomonae* Scop. were found.

Most of them showed the normal colour, but some were darkbrown or even black (var. *anthracina* Weise).

De heer C. de Jong vraagt waar *Galeruca pomonae* pleegt voor te komen. De heer De Fluiter antwoordt, dat het dier in droge grasvelden e.d. leeft.