

Bibbl.

Niet voor publikatie

K O M K O M M E R

1972

Rassenproeven 1e beoordeling  
Herfstteelt

BIBLIOTHEEK  
Proefstation voor de Groenten- en  
Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk.

Vleuten  
Vierpolders

door

Ing. W. Koopmans

Instituut voor de Veredeling van Tuinbouwgewassen - Wageningen

en

Ing. J.A.M. v. Uffelen

Proefstation voor de Groente- en Fruitteelt onder Glas - Naaldwijk

A  
ob  
K  
76

0620 50  
Stamboek no. 3009

K O M K O M M E R 72-1

Herfstteelt

Tabel 1 - Opgenomen rassen

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Volgens inzenders	Bloeitype volgens proefnemers Vleuten	
		I	II
1	o.v.	o.v.	o.v.
2	o.v.	o.v.+3pl.14à19+2pl.25à26	o.v.+3pl.14à17+4pl.24à28
3	o.v.	v.v.	v.v.
4	o.v.	o.v.+2pl.15à18	o.v.
5	o.v.	o.v.+3pl.14à18+3pl.23à26	o.v.+2pl.18à24
6	o.v.	o.v.+2pl.17à18	o.v.+1pl.20
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen			
7	v.v.	v.v.+1pl.7	v.v.
8	v.v.	v.v.	v.v.1pl.22
9	v.v.	v.v.	v.v.
10	v.v.	v.v.	v.v.
11	v.v.	v.v.	v.v.
12	v.v.	v.v.	v.v.
13	v.v.	v.v.1pl.5	v.v.1pl.21
14	v.v.	v.v.	v.v.
15	v.v.	v.v.	v.v.

Tabel 1 (vervolg)

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Volgens inzenders		Bloecotype volgens proefnemers Vierpolders	
			I	II
1	o.v.	o.v.		o.v.
2	o.v.	o.v.+1pl.17		o.v.+3pl.14à17
3	o.v.	v.v.		v.v.
4	o.v.	o.v.		o.v.
5	o.v.	o.v.+2pl.16		o.v.+4pl.15à16
6	o.v.	o.v.		o.v.
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen				
7	v.v.	v.v.		v.v.
8	v.v.	v.v.		v.v.
9	v.v.	v.v.		v.v.
10	v.v.	v.v.		v.v.
11	v.v.	v.v.		v.v.
12	v.v.	v.v.		v.v.
13	v.v.	v.v.		v.v.
14	v.v.	v.v.		v.v.
15	v.v.	v.v.		v.v.

Toelichting: o.v. = overwegend vrouwelijk bloeiend

v.v. = volledig vrouwelijk bloeiend

o.v.+3pl.23à26 betekent dat het betreffende veldje overwegend vrouwelijk bloeiende, maar dat 3 planten voorkwamen die tot in de 23<sup>e</sup> à 26<sup>e</sup> oksel nog mannelijke bloemen gaven.

Proefplaatsen

Proefplaats	Aantal herh.	Aantal pl. per veldje	Zaai- datum	Plant- datum	Beoordelings data	Merste oogst	Laatste oogst
Vleuten (Proeftuin)	2	10	14-7	7-8	21-9 16-10	14-9	16-10
Vierpolders (Proeftuin)	2	9	18-7	8-8	13-9 24-10	5-9	30-10

Op 21 september en 16 oktober zijn gewas en vrucht (onder nummer) beoordeeld door een beoordelingscommissie bestaande uit selecteurs, bedrijfsvoorlichters en tuinders. De resultaten van deze beoordeling staat vermeld in de tabellen 2 t/m 10. De overige gegevens zijn afkomstig van de proefnemers en/of de proefveldverzorger.

Tabel 2 - Gebruikswaardecijfers

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten		Vleuten		Vierpolders		Vierpolders		Gemiddeld
	21-9-'72		16-10-'72		13-9-'72		24-10-'72		
	I	II	I	II	I	II	I	II	
1	6,0	6,3	5,9	5,9	4,8	5,8	5,6	5,5	5,7
2	6,6	6,0	6,5	6,6	5,5	6,4	6,4	6,7	6,3
3	4,6	3,9	5,7	5,6	5,5	5,6	5,3	5,4	5,2
4	6,5	5,7	5,8	6,6	5,3	4,6	6,6	6,3	5,9
5	5,7	5,0	5,6	5,3	5,5	4,9	6,0	6,0	5,5
6	5,3	7,0	5,6	5,9	4,9	4,7	6,2	5,8	5,7
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen									
7	6,5	6,4	6,2	6,4	5,7	7,0	6,8	6,7	6,5
8	5,5	5,0	6,0	6,2	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9
9	6,0	5,4	5,6	5,1	5,2	6,7	6,0	5,8	5,7
10	4,6	4,5	5,5	5,3	4,5	4,0	5,2	5,3	4,9
11	5,5	5,6	5,3	5,7	4,5	5,5	5,0	5,6	5,3
12	5,1	4,7			6,9	6,7	5,8	5,9	5,9
13	6,9	5,7	6,5	6,4	6,5	6,0	5,5	5,6	6,1
14	6,0	5,9	5,6	5,7	6,3	5,9	6,4	6,4	6,0
15	6,0	6,1	5,4	5,8	6,0	6,0	6,2	6,1	6,0
Gem.	5,8	5,5	5,8	5,9	5,6	5,7	5,9	5,9	5,8

Tabel 3 - Waarderingscijfers voor het gewas

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten		Vleuten		Vierpolders		Vierpolders		Gemiddeld
	21-9-'72		16-10-'72		13-9-'72		24-10-'72		
	I	II	I	II	I	II	I	II	
1	6,4	6,9	6,5	6,9	6,3	6,4	6,2	6,2	6,5
2	5,9	5,5	6,1	6,4	5,6	5,9	6,4	6,5	6,0
3	5,8	4,9	5,9	5,4	4,8	5,3	4,0	5,2	5,3
4	6,4	6,0	6,4	6,7	6,0	5,3	5,8	5,7	6,0
5	6,3	5,9	6,2	6,6	5,9	5,5	5,8	5,2	6,0
6	6,6	6,8	6,4	6,5	6,2	5,4	6,1	6,0	6,3
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen									
7	6,3	6,5	6,5	6,0	6,3	6,8	6,4	6,5	6,4
8	6,8	6,9	7,0	6,3	6,3	6,3	6,2	6,6	6,6
9	6,8	6,4	6,7	6,5	6,2	6,4	6,1	7,1	6,5
10	4,7	5,4	6,2	6,2	5,3	5,0	6,6	6,7	5,8
11	5,9	5,7	5,5	6,5	5,5	6,5	6,2	7,0	6,1
12	6,9	6,8	6,4	6,4	6,6	6,3	6,5	6,8	6,6
13	6,8	6,4	6,2	6,4	6,9	6,0	6,9	6,4	6,5
14	6,1	6,4	5,8	5,7	6,3	5,9	6,8	6,6	6,2
15	6,8	6,8	6,0	5,9	7,1	6,0	6,7	6,6	6,5
Gem.	6,3	6,2	6,3	6,3	6,1	5,9	6,2	6,3	6,2

Tabel 4 - Waarderingscijfers voor de kleur van de vrucht

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten 21-9-'72		Vleuten 16-10-'72		Vierpolders 13-9-'72		Vierpolders 24-10-'72		Gemiddelde
	I	II	I	II	I	II	I	II	
	1	5,7	6,3	4,9	5,6	4,7	5,7	5,7	
2	7,3	7,0	7,1	7,0	5,8	7,2	6,6	5,7	6,7
3	5,7	6,2	6,8	6,5	6,4	5,8	6,2	5,5	6,1
4	6,5	6,0	6,1	6,5	5,3	4,8	6,7	6,3	6,0
5	5,5	5,8	5,6	5,2	5,5	4,8	6,6	6,1	5,6
6	6,2	7,0	5,2	5,6	4,5	5,3	5,5	5,5	5,6
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen									
7	7,4	7,2	7,2	6,2	5,2	7,2	7,1	7,2	6,8
8	6,5	6,8	6,2	6,5	6,2	6,5	7,0	7,0	6,6
9	6,7	6,2	6,7	6,6	6,2	6,9	6,4	6,5	6,5
10	6,7	5,2	6,0	5,6	5,7	4,4	5,6	5,6	5,6
11	6,3	6,4	6,5	6,7	5,3	6,0	4,9	5,6	6,0
12	6,4	5,5			7,1	7,3	6,8	6,7	6,6
13	7,5	7,2	7,2	7,2	6,9	6,4	5,6	5,4	6,7
14	7,3	7,2	7,0	6,1	7,1	6,7	6,4	6,0	6,7
15	7,3	7,2	6,7	6,5	6,4	6,9	6,0	6,0	6,6
Gem.	6,6	6,5	6,4	6,3	5,9	6,1	6,2	6,1	6,3

Tabel 5 - Waarderingscijfers voor de vorm van de komkommer

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten		Vleuten		Vierpolders		Vierpolders		Gemiddeld
	21-9-'72		16-10-'72		13-9-'72		24-10-'72		
	I	II	I	II	I	II	I	II	
1	6,7	6,5	6,3	5,9	6,1	6,5	5,5	5,6	6,1
2	6,8	6,8	6,5	6,9	5,8	5,8	6,4	6,5	6,4
3	4,7	4,7	6,1	6,1	5,9	6,4	6,4	6,3	5,8
4	6,5	6,3	6,0	6,6	5,7	5,2	6,6	6,4	6,2
5	5,5	5,9	6,3	5,8	6,0	6,0	6,3	6,3	6,0
6	6,2	7,2	5,8	6,3	5,6	5,2	6,0	6,0	6,0
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen									
7	6,7	7,0	6,5	6,5	6,5	7,0	6,8	6,8	6,7
8	6,3	5,5	6,4	6,2	6,8	6,4	5,9	5,9	6,2
9	5,9	5,4	5,6	5,7	5,3	6,3	6,0	5,5	5,7
10	4,9	4,2	6,1	5,8	5,0	4,9	5,1	5,0	5,1
11	5,4	6,0	5,7	5,9	4,7	6,2	5,2	5,6	5,6
12	5,0	5,4			6,8	6,8	6,2	6,1	6,1
13	6,9	5,8	6,3	6,3	6,1	6,3	5,7	5,7	6,1
14	6,2	5,8	6,6	5,9	6,4	6,2	6,9	6,8	6,4
15	6,2	6,3	6,4	6,0	5,8	6,2	6,4	6,0	6,2
Gen.	6,0	5,9	6,2	6,1	5,9	6,1	6,1	6,0	6,0

Tabel 6 - Waarderingscijfers voor de lengte van de komkommer

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten 21-9-'72		Vleuten 16-10-'72		Vierpolders 13-9-'72		Vierpolders 24-10-'72		Gemiddeld
	I	II	I	II	I	II	I	II	
	1	7,3	6,7	6,9	6,5	6,8	6,9	6,9	
2	6,3	6,3	6,2	6,8	6,1	6,3	6,4	6,4	6,5
3	4,8	4,0	6,0	6,7	5,9	6,8	6,0	5,9	5,8
4	6,8	6,0	6,4	6,6	5,8	6,3	6,1	6,7	6,3
5	6,3	6,0	7,0	5,6	6,5	6,8	6,2	6,1	6,3
6	5,9	7,0	6,5	6,5	6,4	4,8	6,3	6,3	6,2
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen									
7	6,7	6,5	6,1	6,2	6,5	6,9	6,6	6,7	6,5
8	6,7	6,3	6,3	6,3	7,2	6,6	6,3	6,4	6,5
9	6,9	6,5	6,3	5,1	5,1	6,2	6,0	5,9	6,0
10	5,5	4,7	6,8	6,1	6,0	5,2	5,5	5,3	5,6
11	5,7	5,9	6,0	6,5	4,9	5,9	6,4	6,5	6,0
12	6,5	5,2			6,8	6,9	5,5	5,6	6,1
13	7,2	5,7	6,5	6,7	6,7	7,2	5,6	5,8	6,4
14	5,5	6,2	5,5	6,1	6,8	6,2	6,6	6,5	6,2
15	6,3	5,8	5,8	6,3	6,4	6,6	6,6	6,4	6,3
Gem.	6,3	5,9	6,3	6,3	6,3	6,4	6,2	6,2	6,2



Tabel 7 - Opmerkingen van de beoordelingscommissie op 21-9-'72 te Vleuten

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten I
1	wat bleek + gestekeld (1) te veel gewas (6)
2	iets gestekeld (1) gemengd en vrouwelijk door elkaar (2)
3	wat kort (1,3) hals rommelig (1) te glad (1,2) geen ribbels (2) veel stek (3)
4	iets bleek, knobbelige hals (1)
5	gestekeld (1,2,3) te sterk geribbeld (7)
6	mist ribbels (1) te kort (3) grijs (5).
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	puntig (4)
8	wat lang (1,8) bleek (1) onregelmatig (3) te veel gewas (6)
9	matige punt, tapse hals (1) streperig (3) schouder (4) te laat, te veel gewas (6)
10	wat lomp (1,5) geschouderd (1,3,4) matige punt (1) slechte zij- scheut (2) te kort (3)
11	dunne hals (1) stekels (1,5) te geribd (3) te ruw (4)
12	lang (1,7) matige punt (1) stekerig (3) te ruw (4) waslaag (5) te lang op de zijscheuten (6)
13	veel stek (2)
14	wat dik (1) veel stek (2,5) te kort (3,5) stekels, te veel groef (4)
15	te glad, kort (3) puntig (5) te sterk geribbeld (7).

Toelichting: Tussen haakjes de nummers van de leden van de beoordelingscommissie. Staan bv. tussen de haakjes 3 cijfers dan betekent dit dat 3 commissieleden dezelfde opmerking hebben genoteerd.

Tabel 7 (vervolg)

Overwegend  
vrouwelijk  
bloeiende  
rassen

Vleuten II

- 
- |   |   |
|---|---|
| 1 | wat lang, iets bleek, gestekeld (1) ruw (4)                           |
| 2 | moest iets meer geribd (1) zeer heterogeen (2) manlijke bloemen (5,6) |
| 3 | kort (1,3,5,7) te glad (1,2,3) plomp (5)                              |
| 4 | nogal hals (1) te kort (3,7)  |
| 5 | gestekeld (1,3,4,5) manlijke bloemen (5)                              |
| 6 | iets bleek (1) erg dunne scheut (5).                                  |

Volledig  
vrouwelijk  
bleiende  
rassen

- |    |   |
|----|---|
| 7  | iets dikke punt (1) te zwaar, slap gewas (6)                                      |
| 8  | gestekeld lang (1) te licht, vrij glad (2) lange nek (3)                          |
| 9  | wat bonkig (1) flessenhals (2) te dof (3) hals (4) waslaag (5) te zwaar gewas (6) |
| 10 | geschouderd (1,2) matige punt (1,2) te kort (3,4) stek (4)                        |
| 11 | hals gerekt (1) te ruw (3) te kort (4)  |
| 12 | te lang (1,2,5,6,7,8) ongelijk (2) streperig (3,5) slap gewas (6)                 |
| 13 | iets geschouderd (1) onregelmatig (3) stek (4) te donker (8)                      |
| 14 | lomp (1) wat te dik (2) onregelmatig (3) kort (4) plomp, zwaar (5)                |
| 15 | iets geschouderd (1) tegestreept (2,3) te plomp (5).                              |

Tabel 8 - Opmerkingen van de beoordelingscommissie op 16-10-'72 te Vleuten

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten I
1	veel stekels (4,5) licht van kleur (5,8,9,11) nogal scherp (8)
2	te glad (1) vrij kort (1,9) ongelijk van lengte (2) te donker (3,5)
3	te glad (1) te donker (3) iets gestekeld (5) te zware kop (8) kort (10)
4	ongelijk van lengte (1,10) zwakke kleur (5)
5	te gestekeld (3,4,8,9) zwakke kleur (5,8) geribd (5)
6	flessen halsen (1) lange hals (4,5,8) zwakke kleur (5,8)
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	niet uniform (4)
8	matige kleur (5) maar 2 vruchten (4,5,9)
9	te weinig hals (1) hals te stomp (3,8,9) maar 2 vruchten (4,5)
10	te glad (1,3) vrij licht van kleur (1) wat plomp (5) wat dof en zeer zwakke kleur (8)
11	te korte vruchten (2,9) donker groen, geribd (5) nogal ruw, matige hals (8) kou streep (10)
12	geen vruchten, niet te beoordelen (1 t/m 11) te veel gewas (4) te wild (5) zwaar gewas (9)
13	te geribd (5)
14	te korte vruchten (2,3,5,8,9, 10)
15	te korte vruchten (3,8,10) wat wild, plomp, wat geribd (5) neiging tot stek (11).

Tabel 3 (vervolg)

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten II
1	te licht (1) te ruw (3,8) slap gewas (4) zwakke kleur (5,8,10) geribd (5)
2	te veel gewas, ♀ bloem (4) te wild (5) zwaar gewas (9)
3	weinig lans (1) te donker (3) te glad (3,4,9,10) te zwak (5) bleek gewas (10)
4	maar 5 vruchten (5,9) vrij sterke groei (10)
5	te lang (1,4,5,8,9, 10, 11) te glad, stekel (3) te veel gewas (4) zwakke kleur (5,8) te licht (9) zwaar (10)
6	te lang (1,11) niet uniform (4,8)
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	ongelijk van lengte (1,2) vaak te kort (3) slap gewas (4)
8	vrucht lang (4,9,10) krap gewas (4)
9	weinig hals (1) te korte vruchten (2,3,8,9,10) dof (3) te lange ranken (9) lage produktie (11)
10	te glad (1,9) te veel gewas (4) te doffe kleur (8)
11	te ongelijk, te geribd (2,5) te ruw (3,9,11) te veel gewas (4) iets te scherp (8) iets te veel ranken (9)
12	geen vruchten, niet te beoordelen (1 t/m 11) te veel gewas (4) te wild (5) te zwaar gewas (9) te sterke groei (10)
13	te geribd (2) lang, te dun (5)
14	niet te beoordelen (3,4,6) puntige vrucht (2) te zwak (5) naar 2 vruchten (5,9)
15	gedetailleerde (2) zwak gewas (4) geribd, gestreept (5).

Tabel 9 - Opmerkingen van de beoordelingscommissie op 15-9-'72 te Vierpolders

Overwegend  
vrouwelijk  
bloeiende  
rassen

Vierpolders I

1	stoot veel vruchten af, zwakke kleur, gestreepte punten (1) sterk (2)
2	afwijking in punt (12)
3	groei te zwak (1,2,9,10) sterk (2)
4	groei wat krachtiger (1) vrij zwak (2)
5	matig sterk (2) te puntig (5) te zwak (9,10)
6	zwakke kleur (4) sterk, vroeg (2)
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	zwakke kleur (1) middel sterk, kleur te licht (2) te lang (4)
8	blad snel verouderd (3) zwak (10)
9	zwak, kort (1) lelijke hals (4)
10	zwakke groei (1,10,11) glad (1,11) traag met scheuten (2) dof (3) onbruikbaar (8) te weinig vr. (12)
11	slechte vorm, sterke groe (1) enkele te korte vruchten (4)
12	vrij sterk, lang, waslaag vrucht, rib (2) te lang (3)
13	minder afstoting, groei goed, sterke groef (1) matig sterk, plomp (2) te geribd (7) zwak (10)
14	sterke groef, zwakke kleur (1) sterk, kantige vrucht (2) sterk geribd (11)
15	groei te wild, sterke groef, zwakke kleur (1) lange ranken (2) sterk geribd (11,12).

Tabel 9 (vervolg)

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vierpolders II
1	-
2	zwak (10)
3	zwakke kleur (1) glad (1,2) lichte bladkleur (3) te zwak (9,10)
4	zwakke kleur (1) te zwak (9,10)
5	zeer zwakke kleur (1) te zwak (9,10)
6	te kort, zwakke kleur (1) onzuiver op geslacht (3)
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	-
8	-
9	veel afstoting (1) geen schouders (12)
10	te zwak (1,9,10) onbruikbaar (8)
11	te sterk geribd, kort (1)
12	matig sterk (2) wat lang (3,4)
13	veel afstoting, vrucht hoekig, punt (1) ruwe vruchtpunt (4) te zwak (9,10) te sterk geribd (12)
14	zwakke kleur (1) sterk geribd (1,11) allenaal stek (2) vrucht iets te kort (4)
15	hoekige punt, ruw (1) sterk plomp (2) te zwak (9,10).

Tabel 10 - Opmerkingen van de beoordelingscommissie op 24-10-'72 te Vierpolders

Overwegend  
vrouwelijk  
bloeiende  
rassen

Vierpolders I

1	te lang (1,2,4,5) wat getailleerd, lengte wat variabel (3)
2	te lang (5) 1 pl. weggevallen (6)
3	te zwak (3,7) te lang (4,5)
4	2 pl. weggevallen (6)
5	zwak (3) gevoelig voor beschadigingen (5)
6	variabel (5)
Volledig	
vrouwelijk	
bloeiende	
rassen	
7	iets te lang (4)
8	te lange hals (1,4,5) lichte kleur, strepen (5) 1 pl. weggevallen
9	te lang (1,4,5) wat vol (8)
10	te lang (1,5) vruchtvorm variabel (2) glad (5,8) kort, lelijk (3) plomp, lichte kleur (5)
11	slechte kleur (2) onregelmatig, wat getailleerde, lengte wat variabel (8) zeer variabel in kleur (4)
12	te lang (1,2,3,4,7,8) vol gewas (8) getailleerd (5)
13	te lang (1,2,5,8) gele nek (8)
14	-
15	mooie ribbels (1,2) te lang (5).

(6) te weinig voor beoordeling, wat vol gewas (8)

Tabel 10 (vervolg)

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vierpolders II
1	te lang (1,2,5) variabel, getailloerd (6,8)
2	te lang (5)
3	te zwak (3,7) te lang (5) 1 pl. weggevallen (6)
4	1 pl. weggevallen (6)
5	te open (2) te zwak (3)
6	variabel (5)
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	iets te lang en puntig (4) 1 pl. weggevallen (6)
8	te lange hals (1,2,6) te zwaar gewas (4,7) 1 pl. weggevallen (6) te weinig voor goede beoordeling, te vol gewas (3)
9	onregelmatige vorm (5) wat vol (3)
10	te glad (1,8) kort (6,8) dik (6) lelijk (8)
11	1 pl. weggevallen (6) wat vol, vele gele nekken (8)
12	te lang (1,2,3,4,6,7,8) getailloerd (5,6) zwaar gewas (7,8)
13	te lang (1,2,6,8) slechte kleur (2) lichte kleur (5) gele nek (8)
14	variabel in lengte en puntig (4) 1 pl. weggevallen (6)
15	mooie ribbels (1) variabel (5) lelijk geribd (6).



Tabel 11 - Produktiviteit

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen					Gemiddeld	
	Vleuten		Vierpolders			
	I	II	I	II		
1	102 (3-4)	98 (4)	101 (4)	109 (1)	103	
2	102 (3-4)	91 (9)	95 (7)	94 (6)	96	
3	107 (2)	87 (11-12)	83 (12)	88 (8-9)	91	
4	110 (1)	107 (2)	99 (5-6)	103 (3-5)	105	
5	85 (12)	93 (7)	88 (9)	87 (10-11)	88	
6	97 (6)	97 (5)	117 (1)	103 (3-5)	104	
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen						
7	101 (5)	115 (1)	108 (2)	89 (7)	103	
8	93 (7)	87 (11-12)	79 (14-15)	86 (12-13)	86	
9	82 (13)	68 (15)	94 (8)	87 (10-11)	83	
10	87 (11)	69 (14)	84 (11)	80 (14)	80	
11	76 (14-15)	90 (10)	105 (3)	103 (3-5)	94	
12	76 (14-15)	81 (13)	79 (14-15)	86 (12-13)	81	
13	91 (8)	92 (8)	99 (5-6)	106 (2)	97	
14	90 (9)	99 (3)	86 (10)	88 (8-9)	91	
15	88 (10)	96 (6)	81 (13)	77 (15)	86	
Gem.	92	91	93	92	92	

Toelichting: De produktiviteit is uitgedrukt in aantal konkommers per veldje.  
De cijfers tussen haakjes geven de rangorde aan.

Tabel 12 - Gemiddeld vruchtgewicht

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen					Gemiddeld
	Vleuten		Vierpolders		
	I	II	I	II	
1	475 (6)	465 (12)	585 (3)	553 (7)	517
2	469 (8)	483 (10)	563 (10)	562 (4)	517
3	432 (15)	496 (6)	570 (8)	556 (5)	514
4	451 (12)	493 (7)	560 (5)	569 (3)	523
5	523 (2)	527 (1)	602 (2)	634 (1)	572
6	510 (3)	484 (9)	554 (13)	544 (9)	523
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen					
7	484 (5)	432 (15)	579 (6)	507 (11)	501
8	450 (13)	448 (13-14)	566 (9)	498 (14)	491
9	456 (9)	479 (11)	543 (14)	500 (12)	495
10	544 (1)	510 (4)	573 (7)	555 (6)	546
11	443 (14)	448 (13-14)	514 (15)	448 (15)	463
12	453 (11)	492 (8)	604 (1)	536 (10)	521
13	454 (10)	518 (2)	557 (12)	499 (13)	507
14	473 (7)	509 (5)	559 (11)	551 (8)	523
15	497 (4)	512 (3)	581 (4)	603 (2)	550
Gem.	474	486	569	541	518

Toelichting: Het gemiddelde vruchtgewicht is uitgedrukt in grammen per vrucht.  
Tussen haakjes ook hier de rangordecijfers.

Tabel 13 - Waarderingscijfers voor herstel

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten	
	I	II
1	7	7
2	5	7
3	5	5
4	6	7
5	6	7
6	6	8
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen		
7	6	5
8	6	6
9	6	7
10	7	6
11	5	6
12	6	7
13	6	6
14	5	5
15	6	5
Gemid.	5,9	6,3

Toelichting: Deze cijfers zijn verzameld door de proefnemers.

Tabel 14 - Aantal splijtkoppen

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten		Vierpolders	
	I	II	I	II
1	0	0	0	0
2	1	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	1	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen				
7	0	1	0	0
8	0	1	0	0
9	0	1	0	0
10	0	0	0	0
11	0	2	3	2
12	0	0	0	0
13	1	1	0	0
14	2	4	0	?
15	5	4	0	0

Tabel 15 - Opmerking van de proefnemers te Vleuten op 21-9

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vleuten I
1	wat geribd, wat licht, bleekgroen, wat gestekeld, niet mooi regelmatig geribd, tamelijk lang
2	groot bleek blad, rankjes wat dun, goede kleur, wat puntig, stam komkommer lang genoeg, zwak geribd
3	dun, bleek gewas, kort, glad, licht, mooi . komkommertje 2 v.d. <sup>12</sup> <sub>zijn</sub> net te kort, kleur goed, gevoelige huid, slank en zwak geribd
4	donker gewas, wat licht, kleur zwak, 1 met bewaarvergeling, tamelijk gestekeld
5	groot blad, bleek, vrij veel gewas, licht van kleur, nogal gestekeld vrij lang, tamelijk fors geribd
6	lange ranken, kort, kleur zwak, verder rodelijk, hals wat variabel
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen	
7	vrij lange dunne ranken, goed, kleur goed, niet lang genoeg
8	tamelijk lang, kleur matig, wat puntig, niet uniform (mooi en zeer zwak) dus variabel
9	ranken vrij dik, iets licht, hals te stomp en schouders te dik, te kort, kleur voldoende
10	ranken vrij kort, bleek gewas, kort, wat glad, tamelijk dik, kleur net voldoende, vrijwel geen stekels, stekel basis bleek en opvallend
11	weinig tam. dunne ranken, te geribd, te kort, kleur goed, lengte net voldoende
12	vrij veel gewas, lange ranken, weinig goede bloeiers, wat geribd, te lang voor stam-komkommers
13	sterke kleur, wat puntig, nogal lang, slank, goed en duidelijk geribd, zeer goed
14	groot blad, weinig ranken, weinig bloeiers, mooie kleur, te kort, mooi duidelijk geribd, tamelijk dik, geen stekels
15	groot bleek blad, weinig bloeiers, mooie kleur.

Tabel 15 (vervolg)

Overwegend  
vrouwelijk  
bloeiende  
rassen

Vleuten II

- |   |   |
|---|---|
| 1 | donker groen gewas, vol gewas, ietsje licht, iets geribd, 2 duidelijk te bleek, goede kleur |
| 2 | gewas wat bleek, bovenin veel ♂ op zijscheuten, een puntje, iets licht, mooi                |
| 3 | weinig en korte ranken, bleek gewas, iets verbranding, wat kort, te glad                    |
| 4 | dunne ranken, ietsje kort, wat licht  |
| 5 | wat kort, iets licht  |
| 6 | te vol gewas, dunne ranken, goed, kleur niet sterk, flinke komkommer                        |
- Volledig  
vrouwelijk  
bloeiende  
rassen
- |    |  |
|----|--|
| 7  | groot donker blad, dunne rankjes, iets licht, mooie komkommer, maar lengte wat variabel, kleur deels goed, deels zwak                    |
| 8  | groot bleek blad, lengte goed, ietsje licht, kleur wat variabel, goed  |
| 9  | wat puntig, hals te dik en wat geschouderd, kleur goed   |
| 10 | groot bleek blad, stoot veel vruchten af, te kort, te glad, lelijke stekpunt   |
| 11 | wat geribd, lengte goed, goede kleur   |
| 12 | vrij dikke ranken, te lang voor stamkomkommer, wat puntig  |
| 13 | pl. 10 ♂ bloemen aan eind rank bovenin, lange dunne ranken, lang geleed, zwakke bloeiers, mooie volle komkommer, vrij lang, sterke kleur |
| 14 | ranken komen laat door, kort, puntig, iets geribd  |
| 15 | open gewas, korte rank, veel afgestoten vruchtjes, mooie kleur, iets geribd.   |

Tabel 16 - Opmerkingen van de proefnemers te Vierpolders op 13-9

Overwegend vrouwelijk bloeiende rassen	Vierpolders	
	I	II
1	wat geribd	iets geribd
2	goed	goed
3	donkere kleur	goed
4	goed	licht van kleur
5	iets licht van kleur	te licht van kleur
6	wat licht van kleur	te licht en te kort
Volledig vrouwelijk bloeiende rassen		
7	goed	mooi donker
8	zeer mooi	goed
9	iets kort, mooi	mooi
10	licht van kleur, te glad	te licht van kleur, te glad
11	kort en geribd	te geribd
12	mooi	mooi
13	iets geribd	te geribd
14	goede kleur	mooie kleur
15	iets geribd	iets geribd.

In deze serie zijn reeds verschenen:

Intern  
verslag  
nr.

- Koopmans, W., en H. van Esch - Verslag van een Slarassenproef-  
1e beoordeling in een herfstteelt 1971. 15 juni 1972.
- Koopmans, W., en H. van Esch - Verslag van een Slarassenproef-  
1e beoordeling in een winterteelt 1971/1972.
- Koopmans, W., en H. van Esch - Verslag van een Slarassenproef-  
1e beoordeling in een koude teelt 1972.
- Koopmans, W., en H. van Esch - Verslag van een Slarassenproef-  
1e beoordeling in een late koude teelt 1972. juli 1972.
- Koopmans, W., en K. Buitelaar - Verslag van een Tomaterassenproef -  
1e beoordeling in een stookteelt 1971/1972.
- Koopmans, W., en K. Buitelaar - Verslag van een Tomaterassenproef-  
1e beoordeling in een koude teelt 1972. november 1972.
- Koopmans, W., en K. Buitelaar - Verslag van een Tomaterassenproef -  
1e beoordeling in een herfstteelt 1972. december 1972.
- 2 Koopmans, W., en D. de Ruitter - Verslag van een Andijvierassen-  
proef in een voorjaarsteelt 1972. december 1972.
- 3 Koopmans, W., en H. van Esch - Verslag van een Slarassenproef-  
1e beoordeling in een herfstteelt 1972. april 1973.