

ONLINE MONITOR


Kreupelheid bij varkens in de praktijk

De Veekijker Varken krijgt veel vragen over kreupelheid, vooral bij vleesvarkens (zie pagina 12 en 13). De resultaten van de Online Monitor laten zien hoe het in de praktijk gesteld is met kreupelheidsproblemen.

De dierenartsen melden inmiddels ruim anderhalf jaar gezondheidsproblemen via de Online Monitor. De overzichten die daarvan gemaakt worden gaan tot heden vooral over de verdeling van problemen per orgaansysteem, bijvoorbeeld het maagdarmkanaal of de luchtwegen. Het is anderzijds ook duidelijk dat tijdens de meeste bedrijfsbezoeken (bijna 60%) door de dierenartsen geen aandoeningen worden vastgesteld. Indien wel een aandoening is gemeld op een bedrijf, wordt deze in twee derde van de gevallen toegeschreven aan een infectieziekte. De meest genoemde ziekteverwekkers zijn streptokokken (27%), App (14%), Influenza (9%), *E.coli* (9%), PRRS (8%) en PIA/Ileitis (8%). Veruit de meeste gezondheidsproblemen betreffen de luchtwegen (39%). De maagdarmaandoeningen staan op de tweede plaats (19%). Zie de figuur 1 voor het overzicht.

Kreupelheid


Van de meldingen betreft 8,4% kreupelheden. Ook daarbij gaat het vaak over een infectie, meestal met *Streptococcus suis*. Dit



Figuur 1: Orgaansysteem vermeld bij gezondheidsprobleem

is wel sterk verschillend per leeftijdscategorie: kreupelheid door gewrichtsontstekingen door streptokokken komt vooral veel voor bij biggen (zie figuur 2). Bij de vleesvarkens/opfokvarkens en bij de zeugen zijn relatief vaak niet-infectieuze oorzaken aan de orde, zoals (tekorten in de) voeding en huisvesting. Bij zeugen gaat het bijna nooit over een infectie en meldt de dierenarts vaak dat de oorzaak van de kreupelheid onbekend is.

Veel vragen aan de Veekijkertelefoon gaan over kreupelheid bij opfok- en vleesvarkens. Het gaat dan vaak over stofwisselingsproblemen, over gewrichtsontstekingen door *Mycoplasma hyosynoviae*. In de Online Monitor worden deze problemen niet op grote schaal gemeld. Dat kan ook komen doordat het vaak lastig is om de oorzaak van kreupelheid bij oudere varkens vast te stellen. Op pagina 12 en 13 is te lezen welke mogelijkheden beschikbaar zijn voor het stellen van een diagnose bij kreupelheidsproblemen.



Figuur 2: Oorzaken van kreupelheid per leeftijdscategorie



Al sinds 2002 houdt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zich intensief bezig met de uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Hiervoor werken wij nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel, het ministerie van EZ, dierenartsen en veehouders. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving.