



# Lekker

**D**aar vliegt je hond, achter een haas aan. Vol de struiken in. Wanneer hij weer bij zinnen is en parmantig naast je loopt zie je opeens wat bloeddruppels. Het vel onder zijn buik hangt los en je kijkt zó in een open wond. Meestal bloedt zo'n wond niet, maar als dat toch gebeurt is het belangrijk het bloeden zo snel mogelijk te stelpen door te duwen op het weefsel waaruit het bloed lijkt te komen. Meestal stopt een kleine bloeding dan na een paar minuten. Is er een groter bloedvat geraakt dan kan het bloeden veel heviger zijn. Onder de poten, net achter het grote zoolkussen, loopt een grote slagader wat oppervlakkiger. Bij diepe verwondingen kan die slagader behoorlijk bloeden. Alleen met flinke druk op het vat is dat te dicht. Om druk uit te oefenen kun je ook een stuk stof of een plastic zakje strak om de poot binden. Een ritje naar de dierenarts is dan tenminste mogelijk.

## Schone wonden

Een wond die niet bloedt moet worden schoongemaakt. Daar kun je zelf al mee beginnen bij thuiskomst. Met schoon water kan viezigheid uit de wond worden gespoeld.

Haren, takjes, modder en zand belemmeren de genezing van een wond. Daarbij mag je gebruikmaken van desinfecterende middelen. Een oppervlakkige schaafwond kun je desinfecteren met jodium of chloorhexidine. Bij diepere wonden mogen dergelijke middelen ook worden gebruikt, maar let dan op dat er geen alcohol in zit, omdat dit behoorlijk kan irriteren. Bij twijfel kun je ook overleggen met de dierenarts. Is de wond eenmaal schoon, dan is het belangrijk om de wond te beschermen. Niet alleen moet vuil van buitenaf worden geweerd maar ook is het zaak te voorkomen dat de hond aan zijn wond likt of krabt. Een shirt, rompertje of kap kan daarbij helpen. In de dierenspeciaalzaak zijn ook speciale medische shirts verkrijgbaar. Met een maandverband in zo'n shirt kan wondvocht worden opgevangen.

## Hechten of niet hechten

Huidwonden genezen het snelst wanneer ze worden gehecht. Niet elke wond wordt gehecht. Of en hoe een wond gehecht moet worden, wordt bepaald door hoe een wond is ontstaan, hoe groot deze is en of de wond schoon of vervuild is. Een rijtwond door plant of struik is meestal niet zo vies, maar bij een

bijtwond worden er behoorlijk wat bacteriën achtergelaten. Door een wond te hechten sluit je echter vuil op. Dat kan na enkele dagen leiden tot een flinke ontsteking, abces of zelfs sepsis (bloedvergiftiging). Kleine wonden worden daarom gereinigd, gedesinfecteerd en opengelaten. Een uitzondering zijn wonden aan de oogleden. Hoe klein ook, deze zullen altijd moeten worden gehecht. Overige wonden die groter zijn dan 3 centimeter en die open blijven staan, kunnen beter worden



WONDEN BIJ HONDEN

# Losgaan in het bos

Niets is lekkerder dan los rennen over het veld – of door het bos – of rond het water. Nu de lente is begonnen, is het heerlijk om de frisse lucht door je vacht te jagen. En over jagen gesproken: achter konijnen aan – of een mooie dame – is ook prachtig. Of die brutale heer het veld af jagen. Het leven van een hond is fantastisch. Maar soms gaat het mis. Een ongeluk zit in een klein stokje... hoekje.

TEKST: STIJN PETERS, DIBEVO-DIERENARTS | FOTO'S: JANINE VERSCHURE

gesloten. Om een ontsteking te voorkomen zal zo'n wond gedeeltelijk open worden gelaten. Zo kan wondvocht afvloeien. Dat kan bijvoorbeeld door een drain te plaatsen, een rubberen slangetje waarmee je voorkomt dat de wond te snel dichtgaat. Als er na een paar dagen geen vocht meer uit de wond komt, kan de dierenarts de drain verwijderen.

Het inzetten van antibioticum bij open wonden is redelijk vrij van discussie. Een korte

kuur helpt – in combinatie met het draineren van de wond – om ontstekingen te voorkomen. Ook een lokale behandeling van de wond helpt. Door deze vochtig te houden verloopt de genezing sneller. Bijvoorbeeld honingzalf biedt zulke voordelen, ook omdat honingzalf een antibacteriële werking heeft. Mensen met een vervuilde wond of bijtewond krijgen naast een antibioticumkuur een behandeling tegen tetanus. Deze aandoening, veroorzaakt door gifstoffen van de bacterie *Clostridium tetani*,

komt bij honden en katten nauwelijks voor. Er wordt niet specifiek voor behandeld of tegen gevaccineerd.

## Vang die stok!

Naast rijt- en bijtwonden krijgen loslopende honden ook weleens te maken met vliegende stokken. Het spelen met stokken is een geweldig tijdverdrijf voor baasjes die hun speeltje hebben thuisgelaten. Inmiddels zijn er heel wat actiegroepen actief om te wijzen op de gevaren van stokken. Een stok die verkeerd terecht komt kan bij een Duitse Dog minder kwaad dan bij een Chihuahua. Een hersenschudding of oogbeschadiging kan het gevolg zijn. Met een stok in de bek lopen of rennen leidt echter ook regelmatig tot ongelukken. Komt die stok verkeerd terecht in de bek dan kunnen in de bek of achter in de keel flinke wonden ontstaan. Al bloedend en kokhalzend belanden dergelijke slachtoffers bij de dierenarts. Onder narcose kan die in de keel uiteindelijk de ernst van het trauma beoordelen. Vaak duurt het een paar dagen voordat deze honden weer normaal kunnen eten en drinken. Het blijft daarmee verstandiger om veilig speelgoed mee te nemen tijdens het buitenspielen met je hond. ←

## Verantwoordelijkheid

Wie schade maakt is daarvoor verantwoordelijk. Een hond die een (hond van een) ander schade toebrengt valt onder verantwoordelijkheid van zijn eigenaar. De eigenaar zal daarom de schade moeten dekken. Bij het aanwijzen van de aansprakelijkheid maakt het geen verschil of één of beide honden aangelijnd waren of losliepen. De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen hebben daarom ook huisdieren in hun dekking meegenomen. De toegebrachte schade is daarmee gedekt en zal veelal ook de gevolgschade, zoals infecties en arbeidsongeschiktheid, dekken. Wie geen aansprakelijkheidsverzekering heeft zal deze kosten zelf moeten dragen. In alle gevallen is de afhandeling afhankelijk van medewerking en coulance van beide partijen, anders moet een en ander via een gang naar de rechter moeten worden beslecht.