



Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreiniging in zoetwatermosselen 2017

Auteurs A.C.A Sneekes & E. van Barneveld

Wageningen University &
Research rapport C050/18

Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2017

Biologische gegevens van MWTL Zoetwatermossel
RWS-rapport BM 18.04

Auteur(s): A.C. Sneekes & E. van Barneveld

Publicatiedatum: 13 augustus 2018

Wageningen Marine Research IJmuiden, augustus 2018

Wageningen Marine Research rapport C050/18

Sneekes A.C., E. van Barneveld, 2018. "Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2017. Biologische gegevens van MWTL Zoetwatermossel. RWS-rapport BM 18.04" Wageningen Marine Research Wageningen UR (University & Research centre), Wageningen Marine Research rapport C050/18.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst
T.a.v.: M. Roos
Postbus 17
8200 AA Lelystad

Dit rapport is gratis te downloaden van <https://doi.org/10.18174/455752>
Wageningen Marine Research verstrekt *geen* gedrukte exemplaren van rapporten.

Wageningen Marine Research Wageningen UR is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

© 2018 Wageningen Marine Research Wageningen UR

Wageningen Marine Research, onderdeel
van Stichting Wageningen Research
KvK nr. 09098104,
IMARES BTW nr. NL 8113.83.696.B16.
Code BIC/SWIFT address: RABONL2U
IBAN code: NL 73 RABO 0373599285

De Directie van Wageningen Marine Research is niet aansprakelijk voor
gevolgschade, noch voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Wageningen
Marine Research opdrachtgever vrijwaart Wageningen Marine Research van
aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever hierboven aangegeven
en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag weergegeven en/of gepubliceerd
worden, gefotokopieerd of op enige andere manier gebruikt worden zonder
schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

A_4_3_1 V27

Inhoud

Samenvatting	4
1 Inleiding	5
2 Kennisvraag	6
3 Methoden	7
3.1 Bemonstering zoetwatermosselen	7
3.2 Uitvoering ABM onderzoek	8
3.3 Monsteropwerking	10
3.4 Analysemethoden	10
3.4.1 Droge stof, as en asvrijdrooggewicht	11
3.4.2 Vet	11
3.4.3 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)	11
3.5 Dataopslag en -registratie	11
4 Resultaten	12
5 Kwaliteitsborging	15
Verantwoording	16
Bijlagen rapport C050/18 ABM Schelpdieren zoet: 1 t/m 4.3	17

Samenvatting

In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2017 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. Dit project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd door Wageningen Marine Research te IJmuiden.

Op de referentielocatie Zeughoek zijn Quaggamosselen verzameld. Deze mosselen zijn, na verwerking tot uithangmonsters, bewaard in het laboratorium van Wageningen Marine Research tot de datum van uithangen op de onderzoeklocaties. Na afloop van de blootstellingsperiode van 42 tot 44 dagen is het gehalte aan microverontreinigingen in het mosselweefsel bepaald.

In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitoringprogramma 2017 gerapporteerd. De volgende watersystemen zijn in 2017 bemonsterd:

1. IJsselmeer, Zeughoek (referentie locatie)
2. Grensmaas, Eijsden ponton (Maas Eijsden)
3. Bergsche Maas, Keizersveer (Maas Keizersveer)
4. Hollandse IJssel, Gouda voorhaven
5. Ketelmeer
6. Hollands Diep

De uitvoering van het project is succesvol verlopen; op alle locaties hebben de mosselen het uithangen overleefd en is voldoende mosselvlees verzameld voor analyse. De resultaten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en zijn tevens als DIF-file voor opslag in DONAR opgeleverd.

1 Inleiding

Het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma "Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren". Doelstellingen van de metingen zijn:

- het signaleren van langjarige ontwikkelingen in de biologische toestand van watersystemen (trend)
- periodieke toetsing van de toestand aan criteria die voortvloeien uit de toegekende functies van wateren (controle).

Een deelproject van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is "Microverontreinigingen in driehoeksmosselen (*Dreissena polymorpha*) ". In dit monitoringprogramma zijn de driehoeksmosselen in het veld inmiddels verdrongen door de Quaggamossel (*Dreissena rostriformis bugensis*). Om deze reden is vanaf 2011 overgegaan naar de Quaggamossel. Deze soort wordt ook verzameld op de locatie Zeughoek in het IJsselmeer.

De opdracht is gebaseerd op het document "Uitvraag tbv budgetbrief 2016-2017 en 2017-2018" ("de uitvraag"), van datum 23 maart 2017, en is uitgevoerd door Wageningen Marine Research. Op verschillende bemonsteringslocaties van het chemisch meetnet worden Quaggamosselen uit Zeughoek in het IJsselmeer uitgehangen in kooitjes en na 6 weken weer opgehaald en chemisch geanalyseerd op gehalte aan PAKs waarvoor KRW-biotanormen zijn afgeleid. De methode is beschreven in het projectplan Actieve monitoring chemische stoffen in zoetwatermosselen (MWTL zoetwatermossel). De bestaande monitoring is vanaf 2017 aangepast en volgt vanaf 2017 per locatie een driejaarlijkse cyclus, behalve in het waterlichaam Hollands diep (locatie Bovensluis) dat jaarlijks wordt gemeten. Dit rapport bevat de analyseresultaten van Quaggamosselen uit het onderzoek in 2017.

Vanuit RWS werd het programma geleid door mevr. A. Houben en vanuit Wageningen Marine Research fungeerde M. Kotterman als projectleider.

Bij Wageningen Marine Research te IJmuiden werden de organisch chemische analyses (PAK) en de analyses van vet, vocht en as uitgevoerd.

2 Kennisvraag

In het kader van de hierboven genoemde opdracht werden door Wageningen Marine Research de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

- Plannen van het onderzoek
- Ophalen van uitgangsmateriaal mosselen op de referentielocatie
- Uithangen en ophalen van de mosselen op diverse onderzoeklocaties
- Karakteriseren mosselen en verzamelen schelpdiervlees
- Het uitvoeren van chemische analyses
- Het rapporteren van de verkregen resultaten
- Het genereren van DONAR-files

3 Methoden

3.1 Bemonstering zoetwatermosselen

Quaggamosselen, verzameld bij IJsselmeer–Zeughoek, zijn gebruikt als uitgangsmateriaal. Op 3 oktober 2017 zijn door RWS met behulp van een kornet de mosselen opgevist. De verzamelde mosselen zijn dezelfde dag vervoerd naar Wageningen Marine Research in IJmuiden. De Quaggamosselen zijn vervolgens gezeefd en gespoeld met water om stenen, zwanenmosselen, zand en ander ongewenst materiaal te verwijderen. Vanaf de dag van verzamelen tot het tijdstip van uithangen op de diverse locaties zijn de mosselen bewaard in een aquarium van Wageningen Marine Research in stromend, kopervrij leidingwater (watertemperatuur circa 12 °C; zuurstofgehalte >9 g/m³).


De omschrijvingen van alle monsterlocaties in de Rijkswateren zijn vermeld in Tabel 1 en Figuur 1 geeft de ligging van de monsterlocaties aan van het monitoringonderzoek. De onderzoeklocaties worden niet elk jaar, maar in een cyclus van drie jaar bemonsterd met uitzondering van Hollands Diep. Deze locatie wordt jaarlijks bemonsterd en fungeert daarmee als referentie uithanglocatie.

In Tabel 1 wordt het bemonsteringsschema 2017 t/m 2023 weergegeven. De locaties waar de mosselen zijn uitgehangen in het najaar van 2017 zijn **blauw** gedrukt, de plaats van herkomst (referentiegebied IJsselmeer Zeughoek) en de jaarlijkse uithanglocatie zijn in **zwart** weergegeven.

Tabel 1 Locaties en omschrijving ten behoeve van een actief biologische monitoring met zoetwatermosselen in Nederlandse oppervlaktewateren periode 2017-2023

Watersysteem	DONAR code	DONAR omschrijving	Jaar
IJsselmeer (referentie, opvissen), - voorkeur: Zeughoek	ZEUGHK	Zeughoek	alle
Hollands Diep, (referentie) - voorkeur: Bovensluis, meerpaal nabij Strijensas, 2m uit kant	BOVSS	Bovensluis	alle
Grensmaas, Eijsden ponton, - voorkeur: aan meetponton RWS	EIJSDPTN	Eijsden ponton	2017, 2020, 2023
Bergsche Maas, Keizersveer, - voorkeur: aan meetponton RWS	KEIZVR	Keizersveer	2017, 2020, 2023
Hollandsche IJssel, Goudavoorhaven, - voorkeur: meerpaal nabij sluis	GOUDVHVN	Gouda voorhaven	2017, 2020, 2023
Ketelmeer, Ketelmeer-west, - voorkeur: meerpaal of meetpaal	KETMWT	Ketelmeer west	2017, 2020, 2023
Rijn / Bovenrijn, Lobith ponton, - voorkeur: aan meetponton RWS	LOBPTN	Lobith ponton	2018, 2021
Nieuwe Waterweg, Maassluis, - voorkeur: meerpalen, 2 m uit kant, 3m onder wateroppervlak	MAASSS	Maassluis	2018, 2021
Noordzeekanaal, Amsterdam, - voorkeur: meerpalen op 4 plaatsen in Het IJ nabij CS, eiland en A'dam-Noord, 2-3 m onder wateroppervlak	AMSDM	Amsterdam	2018, 2021
Twentekanaal, Eefde boven	EEFDBVN	Eefde boven	2018, 2021
Volkerak / Zoommeer, Steenbergen, (Roosendaalsevliet) - voorkeur: meerpalen en beschoeiing aan de westkant Volkerak	STEENBGN	Steenbergen	2019, 2022

Watersysteem	DONAR code	DONAR omschrijving	Jaar
IJsselmeer, Vrouwezand, - voorkeur: meetpaal FL9 in beheer van CIV VM	VROUWZD	Vrouwezand	2019, 2022
Randmeren-oost, Wolderwijd, De Zegge, - voorkeur: meerpalen bij eiland De Zegge	DEZGE	Randmeren-oost, Wolderwijd, De Zegge	2019, 2022



Figuur 1 Ligging locaties biologische monitoring zoete Rijkswateren.

3.2 Uitvoering ABM onderzoek

De Quaggamosselen zijn op dezelfde manier op de onderzoeklocaties uitgehangen als in de voorgaande jaren. De mosselen zijn in twee in elkaar geschoven netjes (rekbaar kunststof garen) van 60 cm lengte, een diameter van omstreeks 10 à 15 cm en een maaswijdte van 9 mm uitgehangen. Elk netje bevatte circa 300 g mosselen. Onder- en bovenkant van de netjes zijn afgesloten door een knoop. In het midden van elk netje mosselen is vervolgens met behulp van stevig draad een insnoering gemaakt, zodat een saucijsvormig pakketje mosselen is verkregen. De netjes zijn vastgemaakt aan een koord met een onderlinge afstand van 20–30 cm (4 tot 5 -netjes per koord). Onderaan het koord werd een gewicht gehangen opdat de mosselen verticaal blijven hangen. Drie koorden zijn vervolgens opgehangen aan een meetpaal, meerpaal of ponton, afhankelijk van de situatie bij de te onderzoeken locatie (Figuur 2). De afstand van de waterbodem bedroeg afhankelijk van de locatie 0,5 tot 2 m.



Figuur 2 Voorbeelden van het uithangen van de mosselen. Bevestiging van de mosselen aan het koord (links) met schakels als gewichten, uithangen van een koord aan een meetpaal met een cementanker om het koord strak te houden (rechts).

Per locatie zijn 12-15 netjes met Quaggamosselen uitgehangen, wat neerkomt op 3,6-4,5 kg bruto mosselen. De netjes met Quaggamosselen zijn in de periode van 10-12 oktober 2017 op de diverse locaties uitgehangen. Deze najaarsperiode is bewust gekozen, omdat de paaiperiode (productie en afzetten van ei- en zaadcellen: gametogenese) dan is afgelopen en de overlast (storm, ijsgang) van herfst en winter nog gering is. De netjes zijn in de periode van 20 november tot 23 november weer opgehaald. De accumulatie duur wisselde van 42 dagen voor Maas Eijsden, Ketelmeer en Hollands Diep tot 44 dagen voor Hollandse IJssel (Tabel 2). Een aantal netjes met mosselen is niet uitgehangen, maar op 10 oktober in de vriezer opgeslagen om de uitgangssituatie (IJsselmeer-Zeughoek), inclusief verblijf in het doorstroomaquarium, vast te leggen.

Tabel 2 Overzicht van de accumulatie duur aangegeven per locatie van uitgehangen Quaggamosselen in 2017.

WMR request nummer	WMR LIMS code	Locatie	Accumulatieduur
RQ20171106/106	2017/2423	IJsselmeer Zeughoek	0
RQ20171106/107	2017/2425	Maas Eijsden	42
RQ20171106/108	2017/2427	Maas Keizersveer	43
RQ20171106/109	2017/2429	Hollandse IJssel	44
RQ20171106/110	2017/2431	Ketelmeer	42
RQ20171106/111	2017/2433	Hollands Diep	42

Van elk opgehaald monster, waarbij geen volledige sterfte werd geconstateerd, is een submonster, overeenkomend met ongeveer 250 g bruto mosselen, genomen. Van dit submonster zijn de volgende parameters bepaald: aanwezige tarra (lege schelpen), het aantal levende en het aantal dode mosselen, het totale gewicht, het totale schelpgewicht en het totale vleesgewicht. Vervolgens zijn van elk monster nog meer mosselen gepeld tot er uiteindelijk voldoende vlees was verzameld voor de chemische analyses. Hiervoor zijn alleen de Quaggamosselen >14 mm gebruikt. Ook dit jaar bestond het monster uit tamelijk kleine mosselen.

3.3 Monsteropwerking

Per mosselmonster is een hoeveelheid mosselen gepeld tot een totaal van circa 125g mosselweefsel (natgewicht) werd verkregen. Alleen het aanhangend mosselvocht is hierbij meegenomen. Het pellen is uitgevoerd in een speciale Contaminatie Arme Ruimte (CAR) met toevoer van gefilterde lucht. Dit om contaminatie van de monsters met PAK's te voorkomen. Het ruwe mosselmateriaal is tot een homogenaat verwerkt met behulp van een Ultra Turrax. Het homogenaat is vervolgens opgeslagen in een glazen pot voor analyse van organische microverontreinigingen. De potten zijn opgeslagen bij een temperatuur van -25°C tot verdere analyse.

3.4 Analysemethoden

De chemische componenten die in de monitoringscyclus van 2017-2018 zijn geanalyseerd en gerapporteerd zijn opgenomen in Tabel 3. Ten opzichte van vorig jaar is de lijst verkort, nu worden alleen PAK's gemeten.

Tabel 3 Overzicht van de chemische componenten die zijn geanalyseerd en gerapporteerd inclusief bijbehorende naam zoals gebruikt in dit rapport, de DONAR-code en CAS-nummer.

Component	Rapport	Donar-code	CAS-nummer
Accumulatieduur (dagen na inhangdatum)	Accumulatieduur	ACCMLTDR	n.v.t.
Gemiddeld vleesgewicht bovenmaats	Gemiddeld vleesgewicht	GEM_WGT	n.v.t.
Gemiddelde lengte schelp bovenmaats	Gemiddelde lengte	GEM-LTE	n.v.t.
Percentage droge stof	Droge stof %	%DS	n.v.t.
Percentage gloeiverlies	AVDG	%GV	n.v.t.
Percentage gloeirest	As	%GR	n.v.t.
Vet: totaal B&D	Vet B&D	VET	n.v.t.
Benzo(b)fluoranteen	Benzo(b)fluoranteen	BbF	205-99-2
Benzo(k)fluoranteen	Benzo(k)fluoranteen	BkF	207-08-9
Fluoranteen	Fluoranteen	Flu	206-44-0
Benzo(a)pyreen	Benzo(a)pyreen	BaP	50-32-8
Benzo(g,h,i)peryleen	Benzo(g,h,i)peryleen	BghiPe	191-24-2
Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	Indeno(1,2,3-c,d)pyreen	InP	193-39-5
Fenantheen	Fenantheen	Fen	85-01-8
Anthraceen	Anthraceen	Ant	120-12-7
Benzo(a)anthraceen	Benzo(a)anthraceen	BaA	56-55-3
Chryseen	Chryseen	Chr	218-01-9
Pyreen	Pyreen	Pyr	129-00-0
Dibenzo(a,h)anthraceen	Dibenzo(a,h)anthraceen	DBahAnt	53-70-3
Acenafteen	Acenafteen	AcNe	83-32-9
Fluoreen	Fluoreen	Fle	86-73-7

In paragraaf 3.4.1 t/m 3.4.3 wordt een korte beschrijving en een verwijzing naar de Interne Standaard Werkvoorschriften (ISW's) gegeven die gebruikt zijn voor de uitvoering van de chemische analyses.

3.4.1 Droge stof, as en asvrijdrooggewicht

Voor de bepaling van het droge stofgehalte werd het gewogen monster gemengd met een oppervlakte vergrotende stof, vervolgens gedroogd in een stoof (105°C, 3 uur) en na afkoelen in een exsiccator teruggewogen.

De methode is vastgelegd in Wageningen Marine Research ISW 2.10.3.011 "*Dierlijk weefsel. Bepalen van het gehalte aan vocht; gravimetrie*" staat op de scope van de Raad voor Accreditatie onder testlaboratoriumnummer L097, verrichting nummer 2.

Voor de asbepaling werd het monster langzaam verwarmd en gedroogd in een kroes op een kookplaat. Daarna werd het monster gedurende 22 uur verast in een moffeloven bij een temperatuur van $550 \pm 15^\circ\text{C}$. Na afkoelen in een exsiccator is het monster teruggewogen.

De methode is vastgelegd in Wageningen Marine Research ISW 2.10.3.018 "*Dierlijk weefsel. Bepalen van het gehalte aan as; gravimetrie*" en staat op de scope van de Raad voor Accreditatie onder testlaboratoriumnummer L097, verrichting nummer 4.

Het percentage asvrijdrooggewicht wordt berekend uit het gehalte droge stof en as.

3.4.2 Vet

De totaal vet bepaling werd uitgevoerd volgens een aangepaste versie van de Bligh and Dyer methode, gebaseerd op een koude chloroform-methanol extractie.

De methode is vastgelegd in Wageningen Marine Research ISW 2.10.3.002 "*Dierlijk weefsel. Bepalen van het gehalte aan vet volgens Bligh and Dyer; gravimetrie*" en staat op de scope van de Raad voor Accreditatie onder testlaboratoriumnummer L097, verrichting nummer 1.

3.4.3 Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

PAK's werden vrijgemaakt uit het monster door onder reflux te extraheren met methanolische kaliumhydroxide. Na extraheren met hexaan werd het verkregen extract gezuiverd over een silicagel-aluminiumoxide-kolom. Van het gezuiverde extract is hexaan afgedampt onder toevoeging van acetonitril. De PAK's, in acetonitril, werden in een hogedrukvlloeistofchromatograaf gescheiden en gedetecteerd door een fluorescentiemeter. Er werden twee aparte programma's gedraaid om alle PAKs goed te kunnen scheiden én detecteren met fluorescentie.

De methode is vastgelegd in Wageningen Marine Research ISW 2.10.3.005 "*Schaal- en Schelpdieren. Bepalen van het gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) na extractie; HPLC met fluorescentiedetectie*" en staat op de scope van de Raad voor Accreditatie onder testlaboratoriumnummer L097, verrichting nummer 15.

3.5 Dataopslag en -registratie

De gegenereerde data werden opgeslagen in LIMS. Een DONAR-script is beschikbaar dat ervoor zorgt dat de gegevens uit LIMS op de juiste manier in een DONAR-file terecht komen. De analyseresultaten uit het meetrapport die in LIMS zijn geïmporteerd, werden gecontroleerd door een andere analist die bevoegd is voor de uitvoering van betreffende bepaling dan de uitvoerend analist. De Exceltabellen die uit LIMS zijn gegenereerd en in het rapport zijn opgenomen, werden door de uitvoerende analisten gecontroleerd op eventuele fouten en geparafeerd voor vrijgave. Van elk analyseresultaat is beoordeeld of het voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn genoemd in het betreffende ISW, indien dit niet het geval was is de reden daarvan in het rapport vermeld.

4 Resultaten

De resultaten vermeld in dit rapport zijn alleen van toepassing op de geanalyseerde monsters. De chemische analyses hebben plaatsgevonden in de periode van november 2017 t/m april 2018 in het laboratorium van Wageningen Marine Research locatie IJmuiden.

De verzamelde gegevens en analyse-uitkomsten zijn in tabelvorm weergegeven in de bijlagen van dit rapport en zullen volgens opdracht tevens als Excel spreadsheet elektronisch worden verzonden. Een beschrijving van de bijlagen is weergegeven in Tabel 4.

De analyse-uitkomsten en bijbehorende biologische gegevens van de Quaggamosselen zijn tevens als DIF-file voor opslag in DONAR opgeleverd.

Tabel 4 Beschrijving van de Bijlagen

Bijlage	Titel
Bijlage 1	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 1: Gehalten Biochemische parameters Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).
Bijlage 2	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 2: Gehalten PAKs in Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).
Bijlage 3	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 3: Biologische gegevens in Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).
Bijlage 4.1	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.1: Validatiegegevens analysemethoden / Resultaten referentiematerialen
Bijlage 4.2	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.2: Validatiegegevens analysemethoden / Resultaten Ringonderzoek Quasimeme in biota
Bijlage 4.3	ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.3: Validatiegegevens analysemethoden / Rapportagegrenzen en meetonzekerheid

Ten aanzien van de resultaten van Wageningen Marine Research kan opgemerkt worden dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals genoemd in 5 Kwaliteitsborging. Wel is een afwijking van de kwaliteitscriteria geconstateerd voor het geaccrediteerde component benzo(b)fluoranteen. De afwijking betrof enkel voor de monsters met code 2017/2428 en 2017/2432. Hier werd een verschuiving van de retentietijd in de tweede run geconstateerd waardoor de gehalten van deze monsters niet correct bepaald konden worden. De gehalten van de eerste run, die wel goed verlopen was, is gebruikt voor de rapportage, maar worden niet met het kwaliteitskenmerk Q gerapporteerd en zijn als indicatieve waarden (kwaliteitswaardecode 4) opgegeven.

De resultaten van de IRM's, gemeten door Wageningen Marine Research, zijn gecontroleerd met betrekking tot overschrijdingen van de 2s- en 3s-grenzen van de door Wageningen Marine Research intern gehanteerde kwaliteitscontrolekaarten voor de betreffende elementen. Dit is weergegeven in Bijlage 4.1. Indien de 3s-grens wordt overschreden wordt daarop, vastgelegd in ons kwaliteitssysteem, adequaat actie ondernomen. Bijlage 4.1 toont dat aan de metingen in de IRM's, in 2017 uitgevoerd door Wageningen Marine Research, de kwalificatie goed kan worden toegekend.

In Bijlage 4.2 zijn de resultaten van deelname aan Quasimeme ringonderzoeken weergegeven (de labcode van Wageningen Marine Research is Q127). Indien een z-score de kwalificatie 'unsatisfactory' heeft gekregen wordt daarop, vastgelegd in ons kwaliteitssysteem, adequaat actie ondernomen. Hierop vindt jaarlijks controle plaats door de Raad voor Accreditatie.

De betekenissen van de kwalificaties, zoals door Quasimeme toegekend, zijn als volgt:

Satisfactory:	$ Z < 2$, resultaat voldoet
Unsatisfactory:	$ Z > 3$, resultaat voldoet niet (adequate actie vereist)
Questionable:	$ Z < 3$, resultaat is twijfelachtig (geen actie vereist)
Consistent:	er is een waarde (x) < rapportagegrens door het deelnemend lab gerapporteerd, deze waarde was in overeenstemming met de assigned value (consensus waarde), bv. < 0.03 gerapporteerd, terwijl assigned value 0.02 is
Inconsistent:	er is een waarde (x) < rapportagegrens door het deelnemend lab gerapporteerd, deze waarde was niet in overeenstemming met de assigned value (consensus waarde), bv. < 0.03 gerapporteerd, terwijl assigned value 0.06 is
Blanc:	geen z-score bepaald door Quasimeme (mogelijke oorzaken: te weinig laboratoria hebben resultaten gerapporteerd of de spreiding van de resultaten tussen de laboratoria onderling was te groot)

Bijlage 4.2 laat voor de PAK-analyse de resultaten van de ringonderzoeken in 2016 en 2017 zien. In 2017 werd niet officieel deelgenomen aan ringonderzoekrondes van Quasimeme deelgenomen; de monsters voor de ringtesten zijn wel gemeten in 2017, maar door defect van de apparatuur waren de resultaten te laat verkregen waardoor de inlevertermijn voor indienen was verstreken. De genoteerde Z-scores van 2017 zijn achteraf berekend op basis van de resultaten van het ringonderzoek.

In 2016 werd in totaal drie keer de kwalificatie unsatisfactory toegekend, betreffende de componenten dibenz(ah)antracene, benzo(a)pyreen en indeno(123-cd)pyreen. Dibenz(ah)antracene staat niet op de scope en deze resultaten worden daarom zonder Q gerapporteerd. Benzo(a)pyreen werd sindsdien nauwlettend in de gaten gehouden, maar omdat de overige controles voldeden aan de gestelde eisen en de vergelijking van de resultaten uit de ringtest in 2017 binnen de gestelde eisen viel wordt deze stof onder Q gerapporteerd. Specifiek voor indeno(123-cd)pyreen betrof het een probleem met de blanco in 2016, welke in de periode erna opgelost is. De resultaten van de ringtest in 2017 bevestigen dat het probleem met de blanco bij indeno(123-cd)pyreen niet meer aanwezig is. De resultaten van indeno(123-cd)pyreen worden daarom ook onder Q gerapporteerd.

In Bijlage 4.3 zijn de rapportagegrenzen en meetonzekerheden weergegeven. Hierover kan het volgende worden vermeld:

De rapportagegrenzen voor de anorganische componenten en voor de metalen zijn vaste grenzen die zijn vastgesteld uit de historie van de blanco bepalingen.

De rapportagegrenzen voor de organische componenten worden vastgesteld aan de hand van de laagst gemeten standaard. De rapportagegrens is afhankelijk van de hoeveelheid ingewogen monster en is dus eigenlijk voor ieder monster verschillend, de compromis rapportagegrenzen zijn in Bijlage 4.3 weergegeven.

De meetonzekerheid wordt door WMR volgens NEN7779 bepaald, met RMS (root mean square) als uitgangspunt. Hierbij wordt uit de standaardonzekerheid de uitgebreide (meet)onzekerheid berekend. Dit is het 95% betrouwbaarheidsinterval dat in de meetwaarden gebruikt wordt.

Als basis voor de bepaling van de meetonzekerheid als relatieve waarde met interne laboratoriumgegevens en met de berekening RMS als uitgangspunt zijn er drie mogelijkheden:

1. Ringonderzoek (afgedekt zijn: reproduceerbaarheid, juistheid en tussen-monsterspreiding)
2. CRM (afgedekt zijn reproduceerbaarheid en juistheid)
3. Terugvinding (afgedekt zijn reproduceerbaarheid en juistheid)

Door de selectie van de gegevensbronnen zijn de vereiste parameters reproduceerbaarheid, gemiddelde methode-juistheid, tussen-monsterspreiding en monsterinhomogeniteit zo goed mogelijk afgedekt.

De volgende formule uit NEN7779 wordt hiervoor gebruikt:

$$U_{rel} = 2u_{rel} = 2RMS_{rel} = 2 \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i - \mu_i}{\mu_i} \right)^2}$$

Waarin:

- U_{rel} uitgebreide relatieve (meet)onzekerheid, in %
- u_{rel} relatieve standaardonzekerheid, in %
- RMS_{rel} relatieve Root Mean Square, in %
- n aantal ($n \geq 8$)
- y_i meetresultaat
- μ_i (conventioneel) ware waarde

Voor de rapportage aan OSPAR door RWS wordt het 95% betrouwbaarheidsinterval van de meetwaarde aangeleverd. Dit is de U_{rel} uit bovenstaande formule. OSPAR gebruikt hiervoor echter een U_c (de absolute uitgebreide meetonzekerheid, in eenheid van concentratie component), berekend op basis van de volgende twee formules uit de OSPAR guideline:

$$s_c = \sqrt{d_c^2 + \left(\frac{vc}{100} \right)^2 C^2}$$

waarin:

- s_c standaarddeviatie, in eenheid van concentratie component
- d_c gecombineerde constante fout, in eenheid van concentratie component
- vc variatiecoëfficiënt, in %
- C concentratie van de component in het monster (meetwaarde)

$$U_c = 2s_c$$

waarin:

- U_c absolute uitgebreide (meet)onzekerheid, in eenheid van concentratie component
- s_c standaarddeviatie, in eenheid van concentratie component

In Bijlage 4.3 worden de vereiste parameters voor deze OSPAR-berekening getoond.

5 Kwaliteitsborging

Wageningen Marine Research beschikt over een ISO 9001:2008 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (certificaatnummer: 187378-2015-AQ-NLD-RvA). Dit certificaat is geldig tot 15 september 2018. De organisatie is gecertificeerd sinds 27 februari 2001. De certificering is uitgevoerd door DNV Certification B.V.

Het chemisch laboratorium te IJmuiden beschikt over een NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 accreditatie voor testlaboratoria met nummer L097. Deze accreditatie is geldig tot 1 april 2021 en is voor het eerst verleend op 27 maart 1997; deze accreditatie is verleend door de Raad voor Accreditatie. Het chemisch laboratorium heeft hierdoor aangetoond in staat te zijn op technisch bekwame wijze valide resultaten te leveren en te werken volgens de ISO17025 norm. De scope (L097) met de geaccrediteerde analysemethoden is te vinden op de website van de Raad voor Accreditatie (www.rva.nl).

Op grond van deze accreditatie is het kwaliteitskenmerk Q toegekend aan de resultaten van die componenten die op de scope staan vermeld, mits aan alle kwaliteitseisen is voldaan. Het kwaliteitskenmerk Q staat vermeld in de tabellen met de onderzoeksresultaten. Indien het kwaliteitskenmerk Q niet staat vermeld is de reden hiervan vermeld.

De kwaliteit van de analysemethoden wordt op verschillende manieren gewaarborgd. De juistheid van de analysemethoden wordt regelmatig getoetst door deelname aan ringonderzoeken waaronder die georganiseerd door QUASIMEME. Indien geen ringonderzoek voorhanden is, wordt een tweede lijnscontrole uitgevoerd. Tevens wordt bij iedere meetserie een eerstelijnscontrole uitgevoerd. Naast de lijncontroles wordende volgende algemene kwaliteitscontroles uitgevoerd:

- Blanco onderzoek.
- Terugvinding (recovery).
- Interne standaard voor borging opwerkmethode.
- Injectie standard.
- Gevoeligheid.

Indien sprake is van onbeheerste kwaliteit worden passende maatregelen genomen.

Bovenstaande controles staan beschreven in Wageningen Marine Research werkvoorschrift *ISW 2.10.2.105*.

Indien gewenst kunnen gegevens met betrekking tot de prestatiekenmerken van de analysemethoden bij het chemisch laboratorium worden opgevraagd.

Verantwoording

Rapport C050/18

Projectnummer: 4316100090

Dit rapport is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De wetenschappelijke kwaliteit is intern getoetst door een collega-onderzoeker en het verantwoordelijk lid van het managementteam van Wageningen Marine Research

Akkoord: Dr. Ir. M.J.J. Kotterman
Senior Onderzoeker

Handtekening:



Datum: 13 augustus 2018

Akkoord: Drs. J. Asjes
Manager integratie

Handtekening:



Datum: 13 augustus 2018

Bijlagen rapport C050/18 ABM

Schelpdieren zoet: 1 t/m 4.3

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 1: Gehalten Biochemische parameters in Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).

LIMS code	Lokatie	Droge stof % Q	Asvrijdrooggewicht %	As % Q	Vet(BD) g/kg Q
2017/2424	IJsselmeer Zeughoek	3.2	2.8	0.4	3
2017/2426	Maas Eijsden	3.6	3.0	0.6	3
2017/2428	Maas Keizersveer	3.6	3.0	0.6	3
2017/2430	Hollandse IJssel	2.9	2.5	0.4	2
2017/2432	Ketelmeer	3.0	2.7	0.3	2
2017/2434	Hollands Diep	3.4	3.1	0.3	3

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 2: Gehalten PAKs in Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).

		2017/2424 IJsselmeer Zeughoek	2017/2426 Maas Eijsden	2017/2428 Maas Keizersveer	2017/2430 Hollandse IJssel	2017/2432 Ketelmeer	2017/2434 Hollands Diep
Acenafteen	Q	0.5	1.1	1.3	1.4	1.0	1.2
Fluoreen	Q	<0.2	0.7	0.3	0.9	0.3	<0.2
Fenantreen	Q	<1.8	6.7	2.4	5.0	1.8	<1.8
Anthraceen	Q	<0.1	1.0	0.4	1.4	0.4	0.3
Fluoranteen	Q	<0.9	19	7.8	16	4.3	4.1
Pyreen	Q	<0.7	20	8.6	20	4.8	5.0
Benzo(a)anthraceen	Q	<0.1	9.7	3.5	10	2.4	2.4
Chryseen	Q	<0.3	12	4.8	12	3.3	3.9
Benzo(b)fluoranteen	Q	0.2	13	5.1	11	3.6	3.1
Benzo(k)fluoranteen	Q	<0.1	6.9	2.8	1.8	2.0	0.6
Benzo(a)pyreen	Q	<0.1	9.9	3.7	8.5	2.9	2.0
Dibenz(a,h)anthraceen		<0.3	<0.3	<0.3	<0.4	<0.3	<0.3
Benzo(g,h,i)peryleen	Q	<0.1	5.5	2.1	0.3	1.5	1.0
Indeno(1,2,3-cd)pyre	Q	0.2	7.5	2.6	4.5	1.9	1.1

nb= niet bepaald, kwaliteitswaardecode 99

indicatief, kwaliteitswaardecode 4

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 3: Biologische gegevens in Quaggamosselen (onderzoek najaar 2017).

LIMS code	Lokatie	Accumulatieduur	Gem. Vleesgew.	Gem Lengte Schelp
2017/2423	IJsselmeer Zeughoek	0	0.12	16.3
2017/2425	Maas Eijsden	42	0.10	15.9
2017/2427	Maas Keizersveer	43	0.09	16.0
2017/2429	Hollandse IJssel	44	0.11	16.1
2017/2431	Ketelmeer	42	0.10	15.7
2017/2433	Hollands Diep	42	0.08	15.7

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.1: Validatiegegevens analysemethoden

Resultaten referentiematerialen

Chem. groep	Component	Referentie-materiaal	WMR-waarde in 2017	n in 2017	WMR-waarde QC-kaart	n totaal	gecertificeerde waarde	eenheid	kwalificatie
-	Ash-Weight	IRM 2002/0757 Mosselen	1.58 ± 0.04	5	1.58 ± 0.04	97	n.v.t.	%	goed
-	Dry-weight	IRM 2005/0775 Haring/makreel	69.93 ± 0.29	13	70.00 ± 0.249	268	n.v.t.	%	goed
-	Total-Lipid	IRM 2005/0775 Haring/makreel	11.49 ± 0.15	14	11.53 ± 0.14	198	n.v.t.	%	goed
PAK	Benzo(b)fluoranteen	IRM 682	12	4	13.5 ± 1.95	19	n.v.t.	µg/kg	goed
PAK	Benzo(ghi)peryleen	IRM 682	6	4	6.4 ± 1.15	19	n.v.t.	µg/kg	goed
PAK	Fluoranteen	IRM 682	39	4	36.6 ± 2.56	18	n.v.t.	µg/kg	goed
PAK	Indeno(1,2,3-cd)pyreen	IRM 682	7.5	4	6.9 ± 0.80	18	n.v.t.	µg/kg	goed
PAK	Pyreen	IRM 682	32	4	27.2 ± 3.18	19	n.v.t.	µg/kg	goed

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.2: Validatiegegevens analysemethoden

Resultaten Ringonderzoek Quasimeme in biota

labcode: Q127 WMR

Groep	Ronde	Periode	Matrix	Chem. groep	Component	Eenheid	Z-score	Qualificatie	Opmerking	accreditatie
BT1	2016.01	april 2016	QTM110BT	-	Ash-Weight	%	-0.3	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.01	apr 2017	QTM112BT	-	Dry-weight	%	0.0	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.01	apr 2017	QTM113BT	-	Dry-weight	%	-0.2	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.02	nov 2017	QTM114BT	-	Dry-weight	%	-0.3	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.02	nov 2017	QTM115BT	-	Dry-weight	%	-0.4	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.01	apr 2017	QTM112BT	-	Total-Lipid	%	0.0	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.01	apr 2017	QTM114BT	-	Total-Lipid	%	1.4	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.02	nov 2017	QTM115BT	-	Total-Lipid	%	0.0	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT1	2017.02	nov 2017	QTM117BT	-	Total-Lipid	%	0.1	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Acenafteen	µg/kg	1.1	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Antraceen	µg/kg	1.4	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Antraceen	µg/kg	2	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Benzo(a)antraceen	µg/kg	1.7	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Benzo(a)antraceen	µg/kg	2	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Benzo(a)pyreen	µg/kg	1.8	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Benzo(a)pyreen	µg/kg	3.2	Unsatisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Benzo(b)fluoranteen	µg/kg	2.4	Questionable	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	benzo(ghi)peryleen	µg/kg	1.9	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Benzo(k)fluoranteen	µg/kg	1.6	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Benzo(k)fluoranteen	µg/kg	1.9	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Chryseen	µg/kg	1	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Chryseen	µg/kg	1.7	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Dibenz(ah)antraceen	µg/kg	2.5	Questionable	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Dibenz(ah)antraceen	µg/kg	3.5	Unsatisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Fenantreen	µg/kg	2.2	Questionable	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Fluoranteen	µg/kg	1.1	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Fluoranteen	µg/kg	0.9	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Fluoreen	µg/kg	0.6	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Fluoreen	µg/kg	0.8	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Indeno(123)peryleen	µg/kg	3.2	Unsatisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Indeno(123)peryleen	µg/kg	2.5	Questionable	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH083BT	PAK	Pyreen	µg/kg	2.1	Questionable	Quasimeme	ja
BT4	2016.02	nov 2016	QPH084BT	PAK	Pyreen	µg/kg	1.6	Satisfactory	Quasimeme	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Acenafteen	µg/kg	-1.8	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Acenafteen	µg/kg	2.0	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Antraceen	µg/kg	-0.45	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Antraceen	µg/kg	-0.98	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Benzo(a)antraceen	µg/kg	0.64	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Benzo(a)antraceen	µg/kg	2.5	Questionable	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Benzo(a)pyreen	µg/kg	0.90	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Benzo(b)fluoranteen	µg/kg	0.10	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Benzo(b)fluoranteen	µg/kg	1.4	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Benzo(ghi)peryleen	µg/kg	0.29	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Benzo(k)fluoranteen	µg/kg	2.3	Questionable	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Chryseen	µg/kg	-0.33	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Chryseen	µg/kg	1.2	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Dibenz(ah)antraceen	µg/kg	2.4	Questionable	WMR	nee
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Fenantreen	µg/kg	3.0	Questionable	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Fenantreen	µg/kg	2.4	Questionable	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Fluoranteen	µg/kg	0.51	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Fluoranteen	µg/kg	0.35	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Fluoreen	µg/kg	-2.2	Questionable	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Fluoreen	µg/kg	0.12	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Indeno(123)peryleen	µg/kg	0.87	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH087BT	PAK	Pyreen	µg/kg	-1.3	Satisfactory	WMR	ja
BT4	2017.02	nov 2017	QPH088BT	PAK	Pyreen	µg/kg	0.95	Satisfactory	WMR	ja

ABM Schelpdieren zoet 2017 / Bijlage 4.3: Validatiegegevens analysemethoden

Rapportagegrenzen en meetonzekerheid

Groep	Component	rapportagegrens	detectielimiet	eenheid	vc	n	d_c
PAK	Acenafteen	0.13	0.07	µg/kg	23.4	20	0
PAK	Antraceen	0.13	0.07	µg/kg	30.7	28	0
PAK	Benzo(a)antraceen	0.13	0.07	µg/kg	21.2	35	0
PAK	Benzo(a)pyreen	0.13	0.07	µg/kg	16.8	34	0
PAK	Benzo(b)fluoranteen	0.13	0.07	µg/kg	21.4	42	0
PAK	benzo(ghi)peryleen	0.13	0.07	µg/kg	22.0	36	0
PAK	Benzo(k)fluoranteen	0.13	0.07	µg/kg	23.0	32	0
PAK	Chryseen	0.33	0.17	µg/kg	19.9	37	0
PAK	Dibenz(ah)antraceen	0.33	0.17	µg/kg	30.6	9	0
PAK	Fenantreen	1.80	0.90	µg/kg	17.8	20	0
PAK	Fluoranteen	0.85	0.43	µg/kg	13.6	39	0
PAK	Fluoreen	0.20	0.10	µg/kg	19.6	31	0
PAK	Indeno(123)peryleen	0.13	0.07	µg/kg	28.3	26	0
PAK	Pyreen	0.72	0.36	µg/kg	13.0	42	0
-	Dry-weight	0.3	0.15	%	3.5	50	0
-	Ash-Weight	0.12	0.06	%	9.0	31	0
-	Total-Lipid	0.2	0.1	%	16.6	39	0

verwaarloosbaar klein

n = aantal ringonderzoeken aan de hand waarvan een Z-score bepaald kon worden

d_c = gecombineerde constante fout in de eenheid van de concentratie van de component

Wageningen Marine Research
T: +31 (0)317 48 09 00
E: marine-research@wur.nl
www.wur.nl/marine-research

Visitors address

- Ankerpark 27 1781 AG Den Helder
- Korringaweg 7, 4401 NT Yerseke
- Haringkade 1, 1976 CP IJmuiden



Wageningen Marine Research is the Netherlands research institute established to provide the scientific support that is essential for developing policies and innovation in respect of the marine environment, fishery activities, aquaculture and the maritime sector.

Wageningen University & Research is specialised in the domain of healthy food and living environment.

The Wageningen Marine Research vision:

‘To explore the potential of marine nature to improve the quality of life.’

The Wageningen Marine Research mission

- To conduct research with the aim of acquiring knowledge and offering advice on the sustainable management and use of marine and coastal areas.
- Wageningen Marine Research is an independent, leading scientific research institute.

Wageningen Marine Research is part of the international knowledge organisation Wageningen UR (University & Research centre). Within Wageningen UR, nine specialised research institutes of Stichting Wageningen Research (a Foundation) have joined forces with Wageningen University to help answer the most important questions in the domain of healthy food and living environment.
