

RIJKE PLANTENTEEK  
WAGeningen

*Index*

DERDE BESCHRIJVENDE  
RASSENLIJST  
VOOR FRUIT  
1936 - 1937

---



NADRUK VERBODEN

Landbouwhogeschool

66675 -

1936/37

DEN NEDERLANDSCHEN  
RIJSDIENST (N.A.K.)

NN36900

NN36900

1011

DERDE BESCHRIJVENDE  
RASSENLIJST  
VOOR FRUIT  
1936 - 1937

---



NADRUK VERBODEN

CENTRALE LANDBOUWCATALOGUS



0000 0190 8173

UITGEGEVEN DOOR DEN NEDERLANDSCHEN  
ALGEMEENEN KEURINGSDIENST (N.A.K.)

## VOORBERICHT VOOR DEN TWEEDEN DRUK

In samenwerking met de talrijke medewerkers, aan wie ik voor hun zoo waardevolle raadgeving en voor hun groote moeite veel dank verschuldigd ben, is de rangschikking der verscheidenheden herzien.

Evenmin als bij den eersten druk heb ik hier alle inzichten geheel weergegeven. Niet alle medewerkers stellen zich op het standpunt van een *bedrijfsleiding*, die in den moeilijken strijd om het bestaan slechts tevreden kan zijn, wanneer hooge opbrengst en goede prijs samengaan en ook niet allen hebben tevens bedacht, dat het *algemeen belang* ten slotte wel eens zijn veto dient uit te spreken, wanneer de ooglijkheid een minderwaardig gewas bedriegelijkerwijze duur doet verzilveren. Maar er zijn meer redenen aanwezig geweest om wel eens van een advies af te wijken. Er blijken ook in het groote fruit *degeneratieziekten* voor te komen en dit maant tot groote voorzichtigheid wanneer wordt aanbevolen om de een of andere antiquiteit weer in eere te herstellen. Ook de eisch der *beperking* blijft klemmen. En ten slotte moet ik nog bewijzen hebben, dat een opgegeven variëteit inderdaad bestaat! Vreemdelingen *zonder paspoort* heb ik niet opgenomen.

Sommige variëteiten heb ik zelf niet beschreven. Ze zijn gemerkt met een \* vóór den naam.

Een nieuw bestanddeel vormen de onderstammen.

Ook de opgaven der synoniemen en de beschrijvingen zijn nieuw of aanmerkelijk vergroot.

Een register der namen moge van nut zijn.

Tot mijn leedwezen is de alfabetische rangschikking binnen de groepen A, B, C en D nog niet ingevoerd. Dat zij voor een volgende druk, die met veel verbeteringen — waarvoor ik gaarne de gegevens reeds inwacht — moge worden toegerust.

Voor een algeheele herziening ontbrak ditmaal de tijd en de bedoeling om die in 1935—1936 ter hand te nemen is dan ook gebleven. De noodzakelijkheid van enkele correcties was inmiddels reeds gebleken en deze zijn dan ook aangebracht; zij betreffen in hoofdzaak de appels en perziken.

Breda, December 1934.

DR. I. RIETSEMA.

## VOORBERICHT VOOR DEN DERDEN DRUK

In overleg met eenige medewerkers bracht ik wijzigingen en aanvullingen aan. De gegevens over koele bewaring zijn ontleend aan de circulaires van den Rijkstuinbouwconsulent Mulder, die over vitamines aan een voordracht van Prof. Göthlin te Uppsala. De alphabetische rangschikking is thans toegepast.

R.

## LITTERATUUR

Bij de afzonderlijke verscheidenheden wordt meestal verwezen naar beschrijvende pomologische litteratuur; als regel is de verwijzing naar een of ander recent en algemeen bekend werk; de bedoeling is niet geweest te verwijzen naar de vaak schier ontoegankelijke origineele beschrijvingen.

In verband met de bestuivingsdata is niet voor ieder gegeven de litteratuurplaats aangehaald. Behalve uit de eigen proefverslagen en uit de oudere Nederlandsche verslagen van v. OYEN GOETHALS en SPRENGER is geput uit:

- J. A. DOORTJES, Verslagen van den Pomologischen Tuin te Tiel, 1915–1935.
- B. G. BRINK c.s., Verslag Proefvelden Oost-Gelderland, 1934.
- M. B. CRANE & W. J. C. LAURENCE, Studies in Sterility; Intern. Congr. Hortic. London 1930 en de daar geciteerde andere auteurs.
- In verband met de groote nauwkeurigheid der fruitnomenclatuur in Zweden is van de daar gedane onderzoekingen dankbaar gebruik gemaakt:
- G. CALLMAR & E. JOHANSSON, Pollinering och fruktsättning hos äpplesorter, Sver. Pom. Fören. Årsskrift, 1934.
- Befruktningförsökallanden hospäron Sv. Pom. För. Årsskrift 1936.
- E. H. Florin, Pollinering och fruktsättning hos plommonsor. Medd. från perm. kommittén f. Fruktodlingsförsök, 1927.
- E. H. FLORIN, Pollinering och fruktsättning hos päronsor. Medd. fr. perm. kommittén f. Fruktodlingsförsök, 1925.
- E. JOHANSSON, Blombiologiska försök med frukträd vid Alnarp Sver. Pom. För. Årsskrift 1926 en 1931.
- E. JOHANSSON, Frömjölets förmåga att utbilda pollenslangar i sockerlösning utan och vid närvaro av mineralsalter. Sv Pom. För. Årsskrift, 1926.
- Undersökningar av pollenets beskaffenhet hos fruktsorter Sv. Pom. För. Årsskrift 1929.
- E. JOHANSSON och GUNNAR CALLMAR, Bidrag till kännedomen om befruktningens förhållanden hos plommon och körsbär Sv. Pom. för. Årsskr., 1936: 3.
- Een groot deel der buitenlandsche onderzoekingen zijn overigens voor ons van zeer weinig waarde, althans van weinig practische waarde en zijn daarom buiten beschouwing gebleven.

Wat de onderstammen aangaat is in hoofdzaak gebruik gemaakt van:  
R. G. HATTON, Apple Rootstock studies. Journ. Pom. a. Hort. Science XIII: 4, 1935.

R. G. HATTON, Plum. Rootstock studies. Journ. Pom. a. Hort. Science XIV: 2, 1936.

## INLEIDING

### DE INDEELING VAN NEDERLAND IN ZES GEBIEDEN

Nederland is, overeenkomstig de kaart van blz. 7, verdeeld in 6 gebieden, ieder gekenmerkt door een eigen klimaat. Meestal zijn de grenzen zeer flauw, zoodat de door ons getrokken scheidingslijnen iets willekeurigs hebben. Zij loopen echter door streken, waar heel weinig ooftteelt is: door veen, over zandbergen, wateren, e.d.

*Gebied I.* Zeeland, een smalle strook van Noord-Brabant en het Zuid-Westen van Zuid-Holland. *Gunstig zeeklimaat.* Veel wind, zachte winters, koele zomers, weinig nachtvorst, weinig regen. Slechts rakelings langs de kust kan het klimaat hier algeheel onbruikbaar zijn.

Windschutsels raadzaam; klimaat voor vroege bloeiers en voor stookkasten.

*Gebied II.* Noordzeekuststrook van Den Haag tot Rottum. *Ongunstig zeeklimaat.* Veel wind, zachte winters, koele zomers, weinig nachtvorst, en op het vastelandsgedeelte van dit gebied veel regen vooral in zomer en herfst.

Windschutsels raadzaam; klimaat voor aardbeien en koude serres.

Verdere fruitteelt is hier nauwelijks mogelijk.

*Gebied III.* Kleigebied van Steenberg en tot Delfzijl. *Bruikbaar zeeklimaat.* Tamelijk veel wind, tamelijk koele zomers, matige tot strenge winters, matig veel nachtvorst en uiteenlopende, doch over het algemeen niet meer dan middelmatige regen.

Goede luchtstreek voor bessen, in het westelijk gedeelte ook voor hazelnoten. Koude serres en vooral die appels en peren, die niet te gevoelig zijn voor wind en schurftziekte. De grond leent zich slecht voor kersen.

*Gebied IV.* Zandstreken benoorden den Rijn en het IJsselgebied.

*Ongunstig landklimaat.* Matige wind, warme zomers, strenge winters, veel nachtvorst en tamelijk veel zomerregen. Men plante hier vooral late bloeiers. Enkele peren zijn hier minder schurftig dan in het Westen.

*Gebied V.* Rivierkleistreek en zandgedeelten van Noord-Brabant en Limburg. *Tamelijk gunstig landklimaat.* Matige wind, warme zomers, matige winters en — behalve in de oostelijke zandstreek — tamelijk weinig nachtvorst, regen matig. Een uitgesproken geschiktheid voor bepaalde takken der ooftteelt kan men hier niet vaststellen, doch wel een practisch voldoende bruikbaarheid voor alle onderdelen der fruitteelt, die zich hier dan ook in alle gedaante blijkt te ontwikkelen.

*Gebied VI.* Zuid-Limburg. Zwakke wind, zeer warme zomers, zachte winters, weinig nachtvorst, matige regen, droge lucht. *Gunstig landklimaat.*

Bijzonderlijk kersen, peren en pruimen worden hier van een goede hoedanigheid. Voor frambozen en bessen, vooral laatbloeiende bessen is de luchtgesteldheid hier echter minder passend dan dichter bij de zee. De opmerking moet gemaakt worden, dat hier, evenals trouwens elders, de nachtvorst en windschade sterk onder invloed staan van toevalligheden in het terrein. Laagten en luwten hebben veel nachtvorst, hoogten en vlakten veel wind.

## DE INDEELING VAN HET OOFTE IN VIJF GROEPEN

We onderscheiden 5 groepen, A, B, C, D en E.

**A** zijn de meer algemeen aanbevolen verscheidenheden. Zij vormen als het ware het algemeene Nederlandsche sortiment.


**B** zijn die verscheidenheden, die geen algemeene aanbeveling verdienen, doch slechts plaatselijk, bijvoorbeeld in 1 of 2 districten thuis zijn of die slechts voorwaardelijk mogen worden aanbevolen, nl. voor bestuiving of in handen van bijzonder ervaren tuinders, e.d. Zij vormen een helaas niet geheel onmisbare aanvulling op het sortiment A.

**C** zijn nieuwe en minder bekende variëteiten. Daarvan is wel eenige, doch toch nog te weinig ervaring opgedaan. Zij gaan na verdere observatie hetzij naar A of B, hetzij, indien zij ongeschikt zijn, naar de zwarte lijst, D. Men zij met de aanplanting hiervan zeer voorzichtig.

**D** is de lijst der onbruikbare rassen. Er is echter onbruikbaarheid en onbruikbaarheid. Sommige verscheidenheden staan op D omdat een ieder ze veroordeelt, zooals de Charlamowsky, andere daarentegen omdat de boomkweker ze niet kan leveren, weer andere omdat de controle op echtheid ons onmogelijk is, weer andere omdat zij door minderwaardige kwaliteit den naam van ons oofte op de markt schaden.

Rassen onder D kunnen geen plombeering verwerven en krijgen dus van den keuringsdienst van den N.A.K. geen aanbeveling mee. Wij hopen, dat zij uit onze kweekerijen zullen verdwijnen, al moge het zijn, dat enkele er later, ontstaan van synoniemen en vrij van homoniemen, van bijmengselen of degeneratieziekten weer gaarne worden teruggehaald.

**E** zijn nieuwe variëteiten, waarvan nog zóó weinig ervaring is verkregen, dat zij slechts voor proefneming waarde bezitten. Zij zijn ongenummerd en komen ook niet voor plombeering in aanmerking.



## ONDERSTAMMEN

**ABRIKOOS**, zie blz. 32.

### APPEL.

**East-Malling Type I**, Broadleaf English Paradise. Engelsch. Groei tamelijk krachtig. Niet voor hoog- of halfstam. Niet voor no 3. Geldt in Engeland met no II voor een der beste onderstammen. Geeft tamelijk vroeg dragende boomen. Invloed op div. variëteiten ongelijk.

**East-Malling Type II**, Doucin. Niet te verwarren met de zoogenaamde Doucin amélioré (= Type V). Groei tamelijk krachtig. Niet voor hoog- of halfstam. Geldt in Engeland met no I voor een der beste onderstammen. Geeft tamelijk vroeg dragende boomen. Invloed op verschillende variëteiten niet dezelfde.

**East-Malling Type III**, Holly Leaf. Zelden gebruikt, zeer geringe ervaring.

**East Malling Type IV**, Holstein Doucin. Groei tamelijk zwak. Vroeg vruchtbare boomen vormende.

Op type IV geënte boomen neigen vermoedelijk tot afwaaien van den onderstam. Voorzichtigheid is ook om andere redenen raadzaam, zoowel in kwekerij als boomgaard. Niet voor hoog- of halfstam. Bloedluis.

**East-Malling Type V**, Doucin amélioré. Ontraden.

**East-Malling Type VI**, Rivers Nonsuch Paradise. Groei tamelijk krachtig. Niet voor hoog- of halfstam. Invloed op verschillende variëteiten niet dezelfde. Verdient geen aanbeveling.

**East-Malling Type VII**, Zelden gebruikt. Groei tamelijk zwak. Geeft vroeg vruchtbare boomen. Men zij voorzichtig met het gebruik van dezen onderstam, zoowel in de kwekerij als in den boomgaard.

**East-Malling Type VIII**, Pommier Paradis. Ontraden.

**East-Malling Type IX**, Paradis jaune de Metz. Groei zwak; vroeg vruchtbare boomen vormende. De hierop geënte boomen kankeren soms sterk; de groei is vaak uiterst zwak en de vruchten plegen vroeg, voor winteroort te vroeg te rijpen.

Zij zijn op jonge boomen wel zeer groot. Op veel gronden meer en meer ontraden.

**East-Malling Type X**, Onderstam van slechts middelmatige waarde.

**East-Malling Type XI**, Geeft tamelijk vroeg dragende boomen. De schaarsche ondervinding is niet slecht!

**East-Malling Type XII**, Sterke groeier; bruikbaar voor hoog- en halfstam. Moeilijk te vermenigvuldigen. Boomen hierop geënt zijn, tenzij van zeer vruchtbare variëteiten, geneigd zeer laat te dragen.

**East-Malling Type XIII**, Groei tamelijk krachtig. Niet voor hoog- of halfstam.

**East-Malling Type XIV en XV**, zelden gebruikt.

**East-Malling Type XVI**, Ketziner Ideal. Duitsch. Groei sterk. Vermoedelijk voor hoog- en halfstam bruikbaar. Boomen hierop eerder vruchtbaar dan die op XII.

### KERS.

a. **Zaailingkriek**. Men neme zaad van wilde kriecken. Verbastering of vermenging met zure kersen kan tot afkeuring leiden.

b. **Eastmallingsche** ongeslachtelijk gekweekte Mazzards van verschillende groeiocracht.

c. **Zaailing Prunus Mahaleb**.

### PEER.

a. **Zaailingpeer**. Men neme zaailingen van diploide peren. Vooral Pieter Jan Huig wordt aanbevolen. Zwakgroeiende zaailingen verwijdere men uit de partij.

b. **Kweeper**. East-Malling type A. Vermoedelijke naam kwee van Angers.

East-Malling type B.

East-Malling type C. Hierop geënte boomen dragen vaak vroeg. Groei der boomen al naar den grond.

Kweeonderstam slechts aanbevolen voor struik of leiboom, alleen voor bepaalde variëteiten in verband met gevaar voor afwaaien, slechten groei of muskus-smaak.

Bovendien alleen in klei- en veenstreken van het lage deel des lands. De vrucht is



# WEET GIJ WAT KALI DOET?

**KALI** helpt vast, stevig hout vormen.

**KALI** voorkomt daardoor vorstschade en wonden, die toegangspoorten voor ziekten zijn.

**KALI** maakt, dat het fruit vaster op het hout zit en niet afwaait.

**KALI** bevordert de kleur van het fruit.

**KALI** helpt randjesziekte voorkomen en levert gezond blad.

**KALI** levert suikerrijk, zoet fruit.

## DE KALI-MESTSTOFFEN VOOR FRUITTEELT:

KALIZOUT 40 %

PATENTKALI 26 %

ZWAV. KALI 48 %

Voor inlichtingen wende men zich tot:

**N.V. VEREENIGDE KALIMAATSCHAPPIJ  
LANDBOUWKUNDIG BUREAU**

Amsterdam-C - Heerengracht 342

Voor de 4 Noordelijke Provinciën:

**LANDBOUWKUNDIG BUREAU „ZWOLLE”**

Zwolle - Prins Hendrikstraat 2

Voor de 3 Zuidelijke Provinciën:

**LANDBOUWKUNDIG BUREAU „BRED A”**

Breda - Koninginnestraat 41

## Onderstammen

op kwee vaak minder schurftig, grooter en iets eerder rijp. Kwee met bladziekte vermijden.

### PERZIK.

**Roode Kroosjespruim.** Gele Kroosjespruim. Voor leiboomen de beproefde onderstam. Oculeert vaak moeilijk.

**Brompton.** Door East-Malling bijzonder aanbevolen onderstam.

**Zaailing Perzik.** Men neme zaad van de in het Zuiden des lands alom voorkomende kleine boerenperziken, bekend als pierken, purken, porsen of rauwkousen. Voor struikvorm op hoogen grond.

**Andere Pruimen,** zooals zaailing Saint Julien (ongelijkmatig), blauwe kroosjespruim, e.d.

### PRUIM.

**Varkenspruim.** Meest gebruikte onderstam. Goede stamvormer. Sommige

pruimen waaien er wel eens af. Veel oploop. Vaak vitrose. Voor Czar en verwante variëteiten (Early Laxton, Monarch) niet aanbevolen. Geeft voor Victoria goede resultaten.

**Tonneboer.** Vermoedelijk voor veel pruimen bruikbaar. Weinig oploop. Kan latent vitreus zijn.

**Eastmallingsche onderstammen:** o.m. Myrabolan B, Saint Julien, Damas, Common Mussel, Common Plum, Brompton.

**Myrabolan B.** Blijkt in Engeland een zeer goede en algemeen bruikbare onderstam te zijn, die krachtigen groei geeft. Kweekt gemakkelijk van afleggers en stek. Is voor de meeste variëteiten geschikt. Maakt weinig oploop.

Verdere **Eastmallingsche onderstammen** zijn Smalbladige en Breedbladige Gladde Mussel. Geen van al deze is een practisch bruikbare dwergonderlaag gebleken.

## Een goede soortenkeus

op de gewenschte onderstammen bepaalt voor een groot gedeelte de rentabiliteit eener fruitaanplanting. Wij zijn gaarne bereid bij alle aanplantingen advies te geven. Wij laten **alle boomen**, die daarvoor in aanmerking komen keuren door den Nederl. Algemeenen Keuringsdienst. Voorradig allerhande

## VRUCHTBOOMEN

in hoogstam, halfstam en struiken op de aanbevolen onderstammen.

# Gebr. Rulkens

Boomkweekerijen

Maasbracht

# SPEK VAN NES

TELEF. 140 - BOSKOOP

## MALLING TYPES

### TAMME VERSCHIEDENHEDEN

#### AALBES.

**Roode en Witte Bes.** Voor zwarte bes zie onder Z.

#### C

5 **Correction.** Selectie van 1921, afkomstig van K. Maring te Leermens. Vruchtbaar, bloeit laat. Flink tros, bes zoet. Krachtig groei. Tafelbes. Gevoelig voor regen.

#### A

3 **Erstling aus Vierlanden.** Waarschijnlijk een bastaard.  
Rheinland.  
Schaal, Stein- und Beerenobst, met gekl. pl.

Omtrent den oorlog gevonden in een tuinderij bij Hamburg en door H. Rosenthal te Rötha in den handel gebracht.

Bloesem tamelijk vroeg, flauw roodachtig getint, klokvormig. Vrucht lichtzuur, vroeg, tamelijk groot, in groote tros. Groei krachtig. Gezond. Draagt rijk en vroeg. Fabrieks- of tafelbes. Onbruikbaar onder glas. Gevoelig voor regen.

In de kuststreken voor tafelbescultuur niet aanbevolen, daar hier nu 2 beter voldoet. Vermoedelijk eenigszins kieskeurig op den grond. Voldoet op zandgrond zeer goed.

#### A

2 **Fay's Prolific.** Ribes sativum Syme var.

macrocarpum Bailey. Fay's new prolific, Fay's Fruchtbare.

Bunyard Handbook p. 152. Gekl. pl. in Schaal, Stein- und Beerenobst p. 82. In 1868 gewonnen door Lincoln Fay te Portland N.Y.

Bloesem vroeg, bronsgeel, schotelvormig. Vrucht licht zuur, middentijds rijp, groot, in middelmatige tros. Ruit vaak in verband wellicht met nachtvorst. Groei matig tot krachtig. Maakt veel blinde twijgtoppen in verband waarmee men stekhout moet kiezen met enkel goede knoppen. Gezond. Draagt middelmatig. Goed voor tafelbes. Bruikbaar onder glas. Gevoelig voor nachtvorst. Staat bij sterken groei gaarne tegen den wind beschut.

#### A

1 **Prince Albert.** Ribes petraeum Wulf.  
Verrière rouge, Rouge de Hollande, Hollandische Rote, Deutsche zure, Dikkop. Bunyard, Handb. p. 156. Gekl. pl. Schaal Stein- und Beerenobst p. 85. Oude bes, vermoedelijk reeds in 1758 door Knoop bedoeld als „groote roode bes met roode bloesem”. Herkomst onbekend. In verband met de Fransche en Deutsche namen niet te verwarren met de oude, inheemsche en dus ook „Hollandsche roode” bessen.

Bloesem laat, roodachtig, klokvormig.

## Aalbes

Vrucht sterk zuur, laat, tamelijk groot, in flinke trossen. Groei krachtig. Gezond. Draagt doorgaans rijk. Als versche vrucht oneetbaar; uitsluitend fabriek. Vraagt veel suiker. Gevoelig voor regen. Voor verschillende grondsoorten bruikbaar.

**Witte bessen.** Zoolang geen productieve, gezonde, sterke, fraaie en smakelijke witte bes kan worden aangewezen, wordt de groep der witte bessen met inbegrip van de hieronder genoemde ontraden: Langtrossige Witte, Witte Parel, Hollandsche Witte, Witte van Bar le Duc, White Transparent, Weisser aus Jüterbog en Weisse Kaiserliche.

|                               | I | II | III | IV | V | VI |
|-------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Prince Albert . . . . .   | x | —  | x   | x  | x | —  |
| 2 Fay's Prolific . . . . .    | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 3 Erstling aus Vierlanden . . | — | x  | x   | x  | x | x  |
| C 5 Correction . . . . .      | x | —  | x   | x  | x | —  |

x = geschikt. — = onbekend. o = ongeschikt.

## AARDBEI.

### A

#### 2 **Deutsch Evern.** *Fragaria chiloensis* Duch. hybrida.

Vroege Mof.

In 1903 gewonnen door Joh. Böttner te Frankfurt a. d. Oder. Schaal, Stein- und Beerenobst p. 90 met gekl. plaat. Deutschlands Obstsorten No. 265 id.

Bloei vroeg. Vrucht middelmatig groot tot groot, later in het seizoen en bij overjarige of minder gezonde planten spoedig te klein. Kegelvormig, bij zeer groote vruchten overlangs gegroeid, stevig, ook in den kook, goed van smaak, gewoon van kleur, rood van vleesch, vroeg. Bloeit soms tweemaal en geeft zelfs wel tweemaal in het jaar vrucht. Blad matig groot, iets gevouwen, lobben toegespitst, scherp van rand en met ruigen steel. Tamelijk vatbaar voor degeneratieziekten. Vraagt selectie van plantgoed. Slechts matig vruchtbaar, vooral in verband met nachtvorst. Geschikt voor glas en buiten. Tafel en fabriek.

### A

#### 1 **Jucunda.** *Fragaria chiloensis* Duch. hybrida.

Amazone, Late Mof, Walluf, Elers Fruchtbare, Wüdericher, Volltragende.

## Aardbei

**Oude Nederlandsche Roode bessen.** Hoewel zich hieronder uitstekende en zelfs geselecteerde stammen bevinden met vruchten van beste kwaliteit, zijn, voor zoover ons bekend, weinig belangrijke, vertrouwde partijen plantgoed meer algemeen voorhanden, kan althans omtrent het aanwezige plantgoed onze kweekrijen in het algemeen zelden waarborg worden gegeven; te minder omdat juist in deze groep veel synoniemen en homoniemen voorkomen. We moeten dus nog afzien van het keuren van Geelsteel, Hoornsche, Sint Anna's Korfke, Westlandsche Lentsche, Vlijmensche, Oostvoornsche e.d.

District:

|                               | I | II | III | IV | V | VI |
|-------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Prince Albert . . . . .   | x | —  | x   | x  | x | —  |
| 2 Fay's Prolific . . . . .    | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 3 Erstling aus Vierlanden . . | — | x  | x   | x  | x | x  |
| C 5 Correction . . . . .      | x | —  | x   | x  | x | —  |

In 1854 gewonnen door J. Salter te Hammersmith Engeland.

Schaal, Stein- und Beerenobst p. 96 met gekl. pl.; Deutschlands Obstsorten No. 272 id.

Bloei laat. Vrucht groot, regelmatig gevormd, hartvormig of stomp kegelv., stevig, laat, middelmatig van smaak, gewoon rood van kleur, vleesch bleekrood. Vruchtbaar. Blad glanzend, ongeveer vlak, groot, met weinig behaarden steel. Vraagt selectie plantgoed. Tafel en fabriek.

### A

#### 3 **Madame Lefeb.** *Fragaria chiloensis* Duch. hybrida. President Roosevelt.

Journal Royal Hort. Soc. XLVII p. 53. In den handel gebracht door R. Hendriksen te Reeuwijk en genoemd naar een te Gouda of Boskoop woonachtige familie. Herkomst onbekend. Men meent wel, dat deze aardbei oorspronkelijk anders heet. Hoe, weet de schr. niet. Wellicht Incomptable. Bloei vroeg. Vrucht groot, regelmatig kegelvormig, week, matig van smaak, donkerrood, donkerrood-vleezig, iets na No. 2 rijpend. Top blijft vaak groen en daarom wel eens minder goed in prijs. Sommigen klagen over moeilijke onkruidbestrijding. Blad bleek, kloek, vaak sterk omhoogkrullend, stomp, stomp gezaagd, zeer ruig van steel.

# FRUITKWEEKERS

BEMEST UW BOOMGAARDEN  
EN UW FRUITTUINEN MET

## STIKSTOF

in den vorm van:

- 1) half salpeter-, half ammoniakstikstof

**KALKAMMONSALPETER**

20,5 % stikstof

- 2) salpeterstikstof

**KALKSALPETER** 15,5 % stikstof

- 3) Ammoniakstikstof

**ZWAVELZURE AMMONIAK**

20,6 % stikstof

---

Inlichtingen en brochures over deze meststoffen worden op  
aanvraag gratis verstrekt door:

**HET LANDBOUWKUNDIG BUREAU VAN DE  
STAATSMIJNEN IN LIMBURG EN N.V. MEKOG  
TE HEERLEN**

**EN HET LAND- ENTUINBOUWBUREAU DER  
I.G. FARBENINDUSTRIE A.G. TE AMSTERDAM  
AMSTELDIJK 37**

## Aardbei

Meeldauw, verder weinig ziekte. Tafel. Kan onder glas worden geteeld. De meesten hebben echter liever No. 2, althans in het Zuid-Westen des lands.

## A

- 4 **Madame Moutot.** *Fragaria chiloensis* Duch. hybrida.  
Fraisier tomate, Madame Kooy, Princes Juliana.  
Deutschlands Obstsorren No. 276c gekl. pl.; Schaal, Stein- und Beerenobst p. 94 id.  
Fransche aardbei vermoedelijk van het begin dezer eeuw.  
Bloeit middeltijds. Vrucht zeer groot, onregelmatig, vaak ruw geribd, niet zelden hol, matig stevig, zeer flauw van smaak, bleek van kleur, bleekvleezig. Halflaat. Blad zeer groot, meestal iets omlaag gewelfd, stomp gelobd, zeer ruig van bladsteel. Sterk vatbaar voor degeneratieziekte. Selectie noodzakelijk. Meeldauw. Voor étalage. Deze aardbei wordt in de centra niet graag geplant in verband met de minder goede vrucht.

## B

- 5 **Oberschlesien.** *Fragaria chiloensis* Duch. hybrida.  
Moulin rouge.  
Schaal, Stein- und Beerenobst p. 98

|                             | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Jucunda. . . . .        | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 2 Deutsch Evern. . . . .    | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 3 Mme Lefebv. . . . .       | o | x  | x   | x  | x | x  |
| 4 Mme Moutot . . . . .      | x | o  | x   | x  | x | x  |
| B 5 Oberschlesien . . . . . | o | x  | x   | x  | x | x  |
| 6 Scarlet . . . . .         | o | o  | o   | —  | x | —  |

x = geschikt. — = onbekend. o = ongeschikt.

## Appel

- met gekl. pl. Deutschlands Obstsorren No. 271d id.  
Vermoedelijk omstreeks 1923 door Schindler te Proskau gewonnen.  
Bloeit tamelijk laat. Vrucht groot tot zeer groot, regelmatig, kam- of kegelvormig, week, middelmatig van smaak, gewoon van kleur, roodvleezig, tamelijk laat. Zeer vruchtbaar. Blad groot, vaak een weinig omhoog of omlaag gekruld, tamelijk scherp gerand en met ruigen, groenen steel. Vatbaar voor degeneratieziekten. Selectie!  
Tafel. Ongeschikt voor fabriek en verzending en daardoor van zeer beperkte waarde.  
6 **Scarlet.** *Fragaria virginiana* Duch. Een der weinige verscheidenheden van de volkomen winterharde Noordamerik. aardbei, die we nog kweeken. Stellig zeer oud. Oorspronkelijke naam misschien iets langer dan de hier gegevene. Niet te verwarren met de recente Schotsche Scarlet. Kleine Breda'sche, Breda'sche, Nassauer, Skarlakans Smultron. Bloeit vroeg. Vrucht klein, plat rond, minder lang dan breed; blijft heel in den kook, zeer geurig, donker rood, roodvleezig, vroeg. Matig vruchtbaar. Gezond. Blad klein, weinig behaarde steel, scherpe zaagrand. Tafel, fabriek. Laat zich verzenden. Niet voor glasteelt. Veel arbeid.

## District:

aan antischeurbuikvitamine. Cultuureischen onvoldgende nagegaan.

## E

**Anna Boelens.** In 1914 gezaaid door den heer S. A. Blijstra in het bedrijf van den Heer G. A. van Rossum te Naarden. Kruising van No. 3 en Freiherr. v. Berlepsch. Zie tijdschrift Ned. Pom. Vereeniging, April 1934 en Maart 1935 (gekleurde plaat). Omtrent den boom nog zeer weinig ervaring. De vrucht is platrond, matig groot, groen, later geel, met fraaie roode streeping. Vruchtvleesch licht zuur en zeer goed van smaak. Late herfstappel.

## APPEL.

## E

**Åkerö.** Åkerö glasäpple, Schmidts Junkeräpfel? Herkomst onbekend. In Zweden (Södermanland) sedert rond 100 jaar gekweekt, doch misschien Duitsch of Nederduitsch van herkomst. Dahl Pomologi I, p. 150. Pollen goed. Zou kunnen worden bestoven door No. 7. Boom matig groot. Vrucht middelmatig groot, hoog, zeer fraai rood gestreept op bleeken grond. Vast tot hard, zeer goede, lichtzure handappel voor herfst en vroegen winter. Arm

Wilt U zeker zijn van

## **Prima Vruchtboomen**

koopt dan Uw benodigd plantmateriaal bij

**A. JANSEN & ZONEN – BEUGEN**

In voorraad flinke partijen, uitgebreid sortiment,  
mooi gevormd en op zandgrond gekweekt.

Vele soorten veredeld van standaardboomen uit den proeftuin en van  
gezonde vruchtdragende boomen uit eigen fruittuin. ●

Kwekerijen reeds jaren onder contrôle N.A.K.

De boomen worden geleverd met plombe en certificaat.

**Vraagt gratis advies op 't gebied van soortenkeus, planting, enz.**

Gaarne wordt op aanvraag soortenlijst met prijs verstrekt.

Een bezoek aan onze kwekerijen zal U niet teleurstellen.

Beleefd aanbevelend

**N.V. ZAADHANDEL & BOOMKWEKERIJEN**

**WED. P. DE JONGH TE GOES**

**VRUCHTBOOMEN** op **EAST-MALLING** onderstam-typen en van  
vruchtdragende boomen veredeld, alles  
onder N.A.K. contrôle. Kwaliteit prima.

Beschrijvende prijscouranten op  
aanvraag gratis en franco.

**VRAAGT ONS ADVIES!**

## Appel

### C

- 15 **Allington Pippin.** Waarschijnlijk in de 2e helft der vorige eeuw in Zuid-Lincolnshire ontstaan en in 1916 in den handel gebracht door het kweekershuis Bunyard en Co. te Maidstone. Diploid. Stuifmeel goed. Gaarne bestuiving door Filippa. Boom op wild klein tot matig, vroeg dragend, zeer vruchtbaar. Vrucht middelmatig tot klein, bij behoorlijk dunnen beter, kort kegelvormig, geel met wat bos en streepen. Vleesch licht-zuur en knappend. Zeer goede tafelpappel, in sommige gevallen tot in December, dan weer weinig duurzaam. Alle onderstammen windvast. Gezond. Zand. Ervaring in Zeeland minder gunstig (kanker en bloedluis en onzekere duurzaamheid).

### C

- 48 **Beauty of Bath.** Gewonnen te Bailbrook bij Bath, Engeland, en geïntroduceerd door de heeren Cooling in 1864. Bunyard Handbook I, p. 23. Diploid. Stuifmeel goed. Vraagt vreemd pollen, bijv. Filippa.

Matig groote, zeer vroeg en rijkdragende boom. Appel klein, regelmatig gevormd, plat, geel met bos, ruw, zachtvleesig, goed als handappel in Augustus. Struik op sterken onderstam. Gezond. Druipt sterk. Zand en klei. Kan misschien dienen ter vervanging van No. 19. Monilia.

### E

**B. G. Apple.** Engelsche aanwinst, die met veel reclame in den handel is gebracht, doch waarvan de deugdelijkheid nog moet blijken. De eenige mij bekende boom is aan kanker bezweken.

### B

- 6 **Bloemeezoet.** Herkomst onbekend. Waarschijnlijk 19e eeuw en Geldersch. Bloei laat. Op wild, groote boom, tamelijk laat dragend. Vrucht middelmatig groot, ongeveer rond, regelmatig, zeer zachtvleesig, groen met fraaie roode streeping, zoet. Handappel. September. Kroonboom. Windvast. Gezond. Klei.

### E

**Bosappel.** Gewonnen door H. Bos te Dodewaard, rond 1880. Maandschrift Ned. Pom. Ver. 1928, p. 38.

Bloeigegevens geen. Matig groote, vroegdragende, zeer vruchtbare appelboom, dicht en breed van groei. Platte,

bleek geelgroene appel met wat bos. Matig goede tafelpappel tot in den nautwinter. Windvast. Gezond. Klei.

### B

- 22- **Brabantsche Bellefleur.** Roter Bellefleur. Oude appel van onbekende afkomst. Deutschlands Obstsorlen. Gekl. pl. Boom groot. Bloei laat. Zelffertil. Draagt op sterken onderstam laat. Vrucht klein tot middelmatig groot, wat onregelmatig gevormd. Geel met fraaien bos. Vast van vleesch. Licht zuur. Duurt tot in de lente. Tafelpappel. In den handel weinig in trek. Nog slechts in Zuid-Limburg bij gebrek aan een goeden plaatsvervanger aanbevolen.

Is zeer windvast. Boom vaak kankerachtig.

### A


- 13 **Bramley's Seedling.** Triomphe de Kiel. Rond het midden der vorige eeuw gewonnen door Bramley te Southwell (Notts) Engeland. In 1876 in den handel gebracht. Triploid. Vraagt vreemd pollen, bijv. dat van No. 5. Boom groot op wild. Rijkdragend. Vrucht groot, onregelmatig, plat, groengeel met wat bos, vast, zuur, goede moesappel, tot einde winter. Rijk aan antischeurbuikvitamine. Windvast. Struik op II of sterken onderstam en kroonboom. Gezond. Klei en zand. Geschikt om op andere variëteiten te enten.

### A

- 3 **Cox's Orange Pippin.** Cox's Orange, Cox's Orangen Renette, Orange de Cox. Rond 1830 gewonnen door Cox te Colnbrook Lawn, Bucks, Engeland en in 1850 door Ch. Turner in den handel gebracht. Bunyard Handbook I, pag. 43. Deutschl. Obsts. gekl. pl. Diploid. Goed stuifmeel. Bloei midden-tijds, zelf-steriel. Bestuivers voor No. 3 zijn No. 5, 7, 21, 29 en 60. Boom op wild matig groot en vroeg dragend. Vruchtbaar. Vrucht matig tot klein, ongeveer rond, regelmatig, groen, later geel met veel bos en eenig roest. Duurt den winter in. Aangenaam zuur. Bijzonder fijne handappel. Struik. Diverse onderstammen; windvast. Zand of klei. Wat schurft en soms Monilia of kanker, vooral op rivierklei en ook bij enting op type IX. Gevoelig voor Calif. pap.



**DIT IS DE  
MACHINE  
DIE U  
ZOEKT**



Constructief de meest volmaakte

Alle werkende deelen in oliebad.

Buitengewoon eenvoudig

Grootste bedrijfszekerheid

Langste levensduur

Schitterende druk

Vakkundig gebouwd

Laag model

**VRAAGT CATALOGUS**

**G. VAN SAND**

**POMPEN & COMPRESSOREN**

**UTRECHT**

**TELEFOON 13102**

**DE BESTE**

## Appel

### E

**Dekkers Glorie.** Handappel, ongeveer 1930 gewonnen door C. Dekker te Blokker.

Oct.-Jan. Lijkt in kleur op Zoete Ermgaard. Langwerpig. Bij langdurige bewaring van binnen bruin wordende. Smaak eerst zachtzuur, later zoet. Geurig. Aanbevolen in Noord-Holland.

### B

- 34 **Drentsche Bellefleur.** Vermoedelijk uit Drenthe. Fraaie herfstappel. Schijnt in het Noorden den Sterappel te kunnen vervangen. Groote, gezonde boom. Draagt vaak om het andere jaar. Vrucht lang, fraai rood gekleurd, echter slechts van sobere qualiteit.

### A

- 4 **Early Victoria.** Emneth Early. In 1899 door de fa. Cross te Wisbech in den handel gebracht. Bunyard Handbook, p. 53. Diploid. Goed pollen.

Bloei middentijds. Boom op wild matig groot en zeer vroeg dragend. Bijzonder vruchtbaar. Vrucht matig groot, onregelmatig, iets hoog, groengeel, vaak met een lijn overlans. Augustus-September. Zuur. Matig goed voor moes. Struik, desnoods kroonboom. Onderstam sterk. Matig windvast. Zand of klei. Doorgaans weinig ziekte. In sommige streken weinig in tel.

### E

**\*Eethense Wijnappel.** Gewonnen te Eethen, vermoedelijk door den Heer Branderhorst in de eerste helft der vorige eeuw. Middelmatic groot, hoog, eigenaardige steelaanzetting, groen; weinig bloes, vleesch vast, lichtzuur, zeer fijne tafelappel voor September. Boom middelmatic groot, zeer vruchtbaar, gezond, windvast. Bloei tamelijk laat; bestuivingseischen onbekend. Op sterken onderstam.

### B

- 27 **\*Eisdener Klumpke.** Sabot? Misschien uit de omgeving van Eisdén in het Nederlandsche taalgebied. De sterke verspreiding in die streek doet een leeftijd gissen van tenminste 50 jaar, mede in verband met den ouderdom der boomen. Geen gegevens over bestuiving. Bloeit laat. Boom middelmatic tot groot. Sterk hangende takken. Vruchtbaarheid vroeg en zeer voldoende.

Vrucht middelmatic tot groot, hoog met knobbel bij den steel, groen met veel roode streeping, zeer stevig, lichtzuur, goede moes- en matig goede tafelappel tot Maart. Hoogstam. Kieskeurig op grond. Zeer schurftig en hier en daar kanker.

### C

- 57 **Ellisons orange.** Gewonnen door C. C. Ellison te Bracebridge en Wipf te Hartshorne Hall als kruising van No. 3 en W. W. Calville. In 1911 in den handel gebracht door Pennell en Zonen. Bunyard Handbook. Goed pollen. Vruchtbaarheid middelmatic. Vrucht goudgeel met wat bloes en streeping. Vleesch zacht en redelijk van smaak. Lange steel. Herfst. Zou kunnen worden opgevat als een vroege Cox's.

### E

**Dr. Seeligs Orangepepping.** Dr. Seeligs Orangerenette, Orangepepping. Gewonnen door den predikant Henzen bij Kiel en genoemd naar Dr. Seelig aldaar. Voor het eerst beschreven in 1879. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Bloeigegevens geen. Boom middelmatic, vroeg en goeddragend. Appel middelmatic groot, rond, groen, later goudgeel, tamelijk zachtvleezig, lichtzuur, zeer goede handappel tot Maart. Meestal gezond; soms kanker. Zand. Windvast.

### B

- 25 **\*Fransche Zure.** Herkomst onbekend. Bloei vroeg. Bestuivingseischen onbekend. Boom groot. Vruchtbaarheid uiteenlopend. Vrucht middelmatic tot groot, groen met fraaie rooden bloes, zeer vast, sterk zuur, goede moesappel tot ver in de lente. Kroonboom. Vatbaar voor schurft. Heet goede bestuiver voor No. 1.

### C

- 42 **Glorie van Holland.** Zou volgens sommigen rond 1890 gewonnen zijn door den Heer Hazelbach te Rockanje. Maandschrift Ned. Pom. Ver., 1932, p. 96-97. Boom middelmatic en tamelijk vroeg en rijk dragend. Fraai gevormd. De appel is rond, middelbaar van grootte, fraai wasgeel met zwakken bloes, lichtzuur, zeer goed als handappel voor herfst. Struik op II of sterken onderstam. Voorzover we kunnen beoordeelen gezond op zand. Op klei wordt over kanker geklaagd.

See eig. Mh.

## Appel

### A

- 10 **\*Groninger Kroon.** Engelse Kroon, Zure Kroon, Rond 1875 gevonden door S. H. Brouwer te Noordbroek in den tuin van den heer Engels. De Greeff, Onze appels en peren. Zelffertiel. Op wild tamelijk groote boom, 8 tot 10 m breed, tamelijk vroeg dragend. Vrucht middelmatig groot, hoog, iets kegelvormig, groengeel, later roodgeel met veel blos en streepen, lichtzuur, iets knappend; goede handappel tot Februari. Struik op II, of sterken onderstam of wel kroonboom. Windvast. Meestal gezond. Iets meer schurft dan vroeger, vooral in beschutte tuinen. Meeldauw. Soms bloedluis. Zand of klei. Bij Harlingen niet aanbevolen.

### C

- 36 **James Grieve.** Gewonnen door J. Grieve in 1890 door het Schotsche kweekers-huis Dickson te Edinburg in den handel gebracht. Bunyard Handbook I, p. 73. Pollen goed. Kan worden bestoven door Filippa. Boom middelmatig groot, vroeg en rijk vruchtbaar. Vrucht rond, iets kegelvormig, bleek geelachtig met wat blos en tamelijk groot. Vruchtvleesch zeer week. Smaak uitstekend. Er bestaat een meer roode afwijking van deze verscheidenheid.

### C

- 43 **Jonathan.** Vóór 1826 gewonnen door Ph. Rick te Woodstock N.-Y. Ver. St. Hedrick, Apples of New York I, p. 172. Pollen goed. Boom matig groot, zeer vroeg en rijkdragend. Appel klein tot middelmatig, iets hoog, groen met wat blos. Tamelijk vast, licht zuur, gewone smaak der Amerikaansche appels, tamelijk goede handappel voor herfst en voor winter. Dikwijls te klein. Struik op sterken onderstam. Warme standplaats. Vraagt luwte. Gezond, behoudens bloedluis. Dunnen. Klei en desnoods zand.

### E

**Kesterens Wijnzuur.** Uil. Gewonnen in een boomgaard van J. C. van den Berg te Kesteren, denkelijk rond 1900. Maandbl. Ned. Pom. Ver. 1927, p. 174 en 1928, p. 33. Bekroond Lunteren 1927. Bloeigegevens geen. Flinke, vruchtbare boom. Middelmatig groote vrucht, gevormd als Brab. Bellefleur sober tot goed gekleurd en matig tot goed als handappel tot

begin December. Gezond en windvast. Klei.

### B

- 60 **Keswick Codlin.** Engelsche appel, wild gevonden in Cumberland, waar hij door een boomkweeker, J. Sander, werd opgemerkt en vervolgens vermeerderd omstreeks 1800. In 1818 voor de Hort. Soc. gebracht.

Levert goed pollen. Boom matig groot, vroeg en rijkdragend. Appel middelmatig van grootte, hoog, groen, bij rijpheid goudgeel, scherp zuur, rijpt begin September. Een uitstekende moesappel, die door Early Victoria niet wordt geëvenaard. De boom is kieskeurig op grond en wellicht ook op klimaat. Op lichte gronden o.m. kan veel kanker optreden; ook nogal wat last van schurft en een minder ooglijk product voortbrengend. Flink snoeien! Vooral in het Noorden des lands aanbevolen.

### E

**Koningszuur.** Engelsche Bellefleur. Rond 1840 gewonnen in een boomgaard te Lienden, die later in eigendom kwam van Js. de Kock Aspremont. Maandschrift Ned. Pom. Ver. 1928, p. 35. Middelmatig groote, hooge, regelmatig gevormde, grotendeels roode, zeer fraaie, sterke appel. Zou volgens sommigen minderwaardig zijn, doch wordt door anderen, vooral in het Geldersche, hoog aangeslagen. Boom kloek. Klei, Soms kanker.

### B

- 18 **Landsberger Renette.** Rond 1853 door Justizrat Burchardt te Landsberg a.d. Warthe. Deutschlands Obstsorten, gekl. pl. Bloei middentijds. Matig zelffertiel. Draagt goed met No. 3, 5 en 21. Pollen goed. Vrucht middelmatig, kegelvormig, ongeveer zoo hoog als breed, groen, later geel met weinig blos, weinig of geen roest, licht zuur, zacht, middelmatig goede handappel tot halfweg den winter. Boom op wild matig groot, vroeg dragend. Zeer vruchtbaar. Struikvorm op sterken onderstam of desnoods kroonboom. Windvast. Zand. Neigt op veel gronden tot kanker. Weinig schurft in het algemeen. Meeldauw.

### B

- 21 **Lane's Prince Albert.** In de 19e eeuw te Rothamptstead gewonnen en in 1857

# VREDEHOF

LEVERT U DE ALLERBESTE

## VRUCHTBOOMEN

OP DE JUISTE ONDERSTAMMEN

SPECIAAL GEKWEekte

APPEL- EN PERESTRUIKEN

VOLGENS ERVARINGEN IN EIGEN BEDRIJF

Aanbevelend, TH. A. VOGELAAR, dir.

**N.V. VREDEHOF - TEL. 14 - KRABBENDIJKE**

**N.V. Gebr. Leenders - Steyl-Tegelen**  
**Boom- en Rozenweekerij - Telefoon 387**

---

Speciale Culturen van **Vruchtboomen**  
(hoogstam, halfstam, struikvorm, laaglei-appel,  
peer, pruim, kers en perzik) **Coniferen**,  
**Bloemheesters Groenblijvende planten**,  
**Klimplanten, Rozen** (struik, stam, klim,  
en treurrozen) **Rots- en vaste Planten**, enz.  
Alles eigen teelt, flink gewas en lage prijzen.

Aangesloten N.A.K. Vraagt prijs en soortenlijst

**AANLEG VAN BOOMGAARDEN EN SIERTUINEN**

## Appel

in den handel gebracht. Bunyard Handboek p. 80.

Weinig bloeigegevens. Boom klein tot matig groot, zeer vroeg en zeer rijk dragend. Vrucht middelmatig groot, iets plat, groen met vaak eenige roode streeping, zuur. Middelmatig goede moesappel tot in den winter en dan wel eens als handappel bruikbaar. Struik op sterken onderstam. Vraagt luwte. Druipt. Klei of zand. Gezond. Voorzichtig met zwavel. Waarschijnlijk is No. 13 beter dan deze.

## C

- 41 **Laxton's Superb.** Recente aanwinst van het Engelsche kweekershuis Laxton. Vraagt vreemd stuifmeel. Onderlinge vruchtbaarheid met No. 3 is twijfelachtig. Boom waarschijnlijk iets groter dan die van No. 3, waarop de verscheidenheid overigens gelijkt. Vrucht wat kloeker, iets minder goed van smaak. Duurt zeer goed naar men meent. Alle onderstammen. Vermoedelijk een goede aanwinst. In Zeeland op type IX zeer veel kurkstip, vooral op jonge boomen.

## B

- 2 **Lemoenappel.** Rond 1885 gewonnen door Notaris J. H. Th. W. van den Ham te Lunteren en aldaar 1899 bekroond. Bloei middentijds, zelffertil, misschien toch kruisbestuiving gewenscht. Vrucht groot, iets plat, bijna rond, groen, later geel met veel roest, geen blos. Aange-naam zuur. Zeer goede tafelappel. Tot in winter. Boom op wild zeer groot en zeer laat dragend. Later voldoende vruchtbaar. Struik en kroonboom. Alle onderstammen. Zand of klei. Op goeden grond weinig ziekte. Voldoet in Zeeland, Betuwe en Utrecht niet. Druipt sterk. Meestal geeft men aan No. 1 de voorkeur, daar die eerder draagt en duurzamer is, op enkele gronden, vooral natte, verkiest men wel Lemoenappel, die trouwens ook bij minder goede verzorging beter is dan No. 1.

## C

- 63 **London Pippin,** London Peppin, Pepin de Londres, London Pepping, Calville de Londres. Oude Britsche appel. Deutschl. Obsts. gekl. pl. Bunyard, Handb. p. 82. Vroege bloeier. Matige groeier, fraaie boomvorm. Vruchtbaar. Middelmatig groote vrucht, sterke rib-

ben aan den top. Kleur verschillend, vaak met blos. Duurt tot de lente. Hand- en moesappel. Zeer vatbaar voor schurft, kanker en meeldauw. Reeds zeer lang in ons land, doch weinig opgang gemaakt.

## C

- 37 **Luntersche Pippeling.** Zeer late zure appel. Draagt vroeg. Luntersche zaailing van omstreeks 1900. De boom is van matige grootte en vruchtbaar. Appel matig groot; nogal roestig met betrekkelijk weinig kleur. Zeer laat en duurzaam. Vruchtvleesch hard en daardoor van beperkte bruikbaarheid. Zuur. Wordt met name in Groningerland met succes verbouwd, doch geeft ook in Noord-Brabant goede resultaten. Zand en dalgrond.

## A

- 8 **Manks Codlin.** Manks Appel. Door Kewley op 't eiland Man gewonnen. Droeg voor 't eerst in 1815. Deutschlands Obstsorren. Gekl. pl. Diploid. Zelffertil. Zeer goed is bestuiving door No. 7. Bloei vroeg. Boom op wild door-gaans klein, buitengewoon vroegdragend. Zeer vruchtbaar. Vrucht middelmatig tot klein. Bij behoorlijk dunnen beter. Kegelvormig, iets hoog, geel-groen met bleeken blos, vast, zeer licht zuur. Bruikbaar voor de bakkerij (appel-bollen). Minder goede handappel. September-October. Struik. Onderstam sterk. Nogal windvast. Zand of klei. Meestal tamelijk gezond. Meeldauw. Zaagwesp.

## E

**May Queen** te Worcester gewonnen en door Penwill in den handel gebracht. Bunyard Handboek.

Boom van matige groeikracht en groote vruchtbaarheid. De eenige dragende boom in ons land staat te Breda op zandgrond en levert jaarlijks een rijken oogst op.

Vrucht meer breed dan hoog, op den boom groen met donkerrood, na eenige bewaring zeer fraai geel met helder rooden en grooten blos. Lichtzuur en zeer aromatisch. Duurt tot in de lente. Gezond.

Vermoedelijk een late appel van bijzonder goede eigenschappen, beide als boom en als vrucht.

Aan **kwaliteit en soortechtheid**  
wordt de meeste zorg besteed.  
Dit is **ons belang** zoowel als dat van **onze afnemers**

## **VRUCHTBOOMEN EN BESSENSTRUIKEN**

**in de beste soorten**

Onderlagen, Haagplantsoen, Heesters,  
Laanboomen, Rozen, Coniferen en Den-  
nen, Vaste planten enz.

**GIEBR. JONGMAN**  
**BOOMKWEKERIJ - SAPPEMEER**

## **HENRI FLEURIEN**

**SPECIALE VRUCHTBOOMCULTUUR**  
**BAARLO (L) TELEFOON 19**

Wanneer U een goed bekweekt, ge-  
zond en soortecht product eischt  
en waardeert, dan houden wij ons  
beleefd aanbevelen.

**Kwekerijen onder contrôle van de N.A.K.**

★ **Tot een bezoek beleefd uitgenoodigd.**

## FIRMA A. HERIJGERS-DAEMEN

### ZUNDERT

bij Breda

Telefoon 43

**N.A.K.-garantie**

U overweegt aanplanting? Vraagt ons!

Onze gediplomeerde fruitteelkundige maakt voor U teekening en begroting gratis! Vlagger, beter en meer fruit per H.A.

**Bezoekt onze prima verzorgde kwekerijen en bezichtigt door ons aangelegde moderne fruit-aanplantingen.**

**B**

- 28 **Notarisappel.** Rond 1890 gewonnen door J. H. Th. W. v. d. Ham, notaris te Lunteren en wereldkundig gemaakt op de tentoonstelling aldaar in 1899. Bloei middentijds. Met eigen stuifmeel matig dragend. Zet goed vrucht met 5, 7, 18 en 60. Op sterken onderstam een flinke boom, matig vroegdragend. Later voldoende vruchtbaar. Vrucht hoog, tamelijk groot, groen, weinig blos, lichtzuur. Matig goede, soms zeer goede handappel tot Januari. Struik op halfsterken of op sterken onderstam en kroonboom. Vraagt luwte. Druipt. Kanker. Soms veel schurft. Zand of lichte klei. Behalve in distr. IV, V en VI ook plaatse-lijk in Friesland aanbevolen.

**B**

- 24 **\*Ossenkop.** Oude Fransche. Herkomst onbekend. Genoemd in 1850. Bloei vroeg. Boom groot, met iets hangende takken, vroeg, regelmatig en goed vruchtbaar. Vrucht zeer groot, onregelmatig, iets plat, groen met roode streeping, matig vast, zuur, goede moesappel van September tot Februari.

Kroonboom. Niet kieskeurig op grond. Gezond.

Heet goede bestuiver voor No. 1.

**E**

**Pater v. d. Elsen.** In 1928 gezaaid door den Heer P. J. G. Aarts te Bergeyk, 25 Oct. 1934 te Lunteren bekroond met 1e kl. certificaat. Zie tijdschrift Ned. Pom. Vereeniging Februari 1935; gekl. plaat. Voor zoover men op de uiterst schaarsche gegevens kan afgaan, mogen we een middelmatige groei-kracht en groote vruchtbaarheid verwachten. Waarschijnlijk thuis op zandgrond. De appel is kloek, meer hoog dan breed en bij rijpheid bijzonder fraai gekleurd. Duurt tot in den winter en is zeer goed van smaak. Licht zuur. Een fout is, dat de appel in sommige jaren bruine spikkels in het vruchtvleesch vertoont. De bloei wordt ondersteld laat te vallen.

**B**

- 19 **Pfirsichroter Sommerapfel.** Perzikroode zomerappel, Persikrödt Sommeräpfel. Wellicht door J. V. Sickler (1741-1820) uit Frankrijk naar Duitschland gebracht. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Bloei vroeg. Diploid. Draagt met eigen stuifmeel niet steeds voldoende.

## FIRMA A. HERIJGERS-DAEMEN

### ZUNDERT

bij Breda

Telefoon 43

**N.A.K. garantie**

Moderne fruitteelt op East Malling-onderstam typen. Om te voorkomen, dat U fouten maakt in keuze van soort en onderstam, in verband met de te beplanten grondsoort en het doel, dat men met intensieve beplanting beoogt, vraagt U ons deskundig advies.

**Al onze vruchtbomen zijn van geselecteerde standaardmoederbomen veredeld, zoover dit door den N.A.K. vereischt wordt.**

## FIRMA A. HERIJGERS-DAEMEN

### ZUNDERT

bij Breda

Telefoon 43

Moderne vakkundige aanleg van boomgaarden op **East-Malling** onderstamtypen.

Het juiste sortiment op den juiste onderstam.

**Hét beste**

**plantmateriaal, aan goedkoopsten prijs met N.A.K. garantie**

Goede bestuiving door 7, 21 of 60. Op wild klein en zeer vroeg dragend. Vrucht middelmatig groot, ongeveer rond, meestal geheel rood, zacht zuur, los, goed voor de tafel. Augustus. Niet in eens plukken. Duurt slecht. Struik op sterken onderstam. Tamelijk windvast. Zand en klei. Weinig kanker en soms schurft. Meeldauw. Zaagwesp. In Friesland plant men liever de Rode Tulpappel, die daar beter voldoet.

#### B

17 **Present van Engeland.** Heerappel. Herkomst onbekend. Had reeds in 1863 aanmerkelijke verspreiding. Beschrijving Vruchtsoorten 2e reeks 1863, p. 72. Bloei middentijds. Zelffertil. Boom matig groot, zeer vroeg en rijkdragend. Lastige groei voor den snoeier. Boven enten. Vrucht groen, later geel, met somtijds wat blos, zachtzuur, los, groot klokhuis, zoete tafelappel tot einde winter. Kroonboom. Matig windvast. Neigt tot kanker en min of meer beschadigde vruchten. Zaagwesp. Heeft plaatselijk beteekenis. Wordt aangeraden om op andere soorten om te enten.

#### E

**Present van Holland.** In 1914 gewonnen door de Fa. Ludwig & Co te Hillegom, zaailing van No. 17, bekroond met certificaat 1e kl. in 1934. In den handel gebracht door G. A. van Rossum te Naarden. Tijdschrift Ned. Pom. Vereeniging, April 1934.

Middelmatige groeikracht. Vruchtbaar. Vermoedelijk gezonde boom.

Vrucht van vorm als No. 17, doch iets minder hoog en iets minder onregelmatig. Zuur, weinig aroma. Duurt tot in April. Misschien in district II bruikbaar.

#### C

29 **Princesse Noble.** Kroonappel, Noblesse, Bles, Alantappel, Grosser edler Prinzessin Apfel, Pomme d'Aunée, Prince d'Orange, Prinsesäpple. Zeer oude, misschien inheemsche appel. Werd in 1708 echter als uitheemsch genoemd. Nederl. Boomgaard. Gekl. pl. Bloei middentijds. Bestuift No. 3. Boom matig groot, vroeg vruchtbaar, doch waarschijnlijk ondanks goede ziektebestrijding niet overrijk dragend. Vrucht matig groot, groengeel met strepen, hoog, vast, later zacht, lichtzuur, buitengewoon

## FIRMA A. HERIJGERS-DAEMEN

### ZUNDERT

bij Breda

Telefoon 43

Moderne, speciale

Vruchtboomculturen

Noodigt U vriendelijk tot bezoek!

**Sinds 1929 als eerste geheel onder keur N.A.K.**



## Appel

fijne handappel tot halfweg den winter. Struik op sterken onderstam, desnoods kroonboom. Alle gronden. Vatbaar voor schurfft. Men zij bedacht op mozaïek. De hooge handelswaarde dezès appels rechtvaardigt een ernstige poging om hem, geholpen door de hedendaagsche bemesting en ziektebestrijdingsmiddelen, weer in eere te herstellen. Vooral in district IV heeft men aanmoedigende resultaten.

Volgens betrouwbare gegevens komen onder de P. N. verscheiden onderrassen voor, waarvan de beste zou zijn een type met langwerpige, boven afgeplatte vrucht en sterk geel gekleurd vleesch.

## B

- 26 **Reinette van Ekenstein.** R. v. Eckenstijn. Waarschijnlijk kort voor 1830 gewonnen door Jhr. O. R. Alberda van Ekenstein te E. bij Appingedam. Nederl. Boomgaard I No. 45. Geen bloeigegevens. Boom flink, vruchtbaar. Vrucht matig groot, kort kegelvormig, groen, later geel met eenig roest, zacht, licht zuur, handappel voor October tot December. Moesappel. Deze appel vangt in sommige streken van Friesland de Transparente de Croncels, in Groningerland niet aan te raden. Weinig schurfft. Meeldauw.

## B

- 16 **Renette von Zuccamaglio.** Von Zuccamagliorennett. Gewonnen door Diedrich Uhlhorn Jr. te Grevenbroich, Rheinland. Waarschijnlijk tusschen 1852 en 1870 gezaaid. In 1878 benaamd. Diploid. Gaarne bestoven door Filippa. Boom matig groot, vroeg en rijkdragend. Vrucht rond, groen, later geel met zeer weinig blos, middelmatig groot. Wil gedund worden. Zeer goede handappel tot na den winter. Struik op sterken onderstam. Windvastheid goed. Zand en klei. Meestal gezond, doch in IV acht men bespuiting tegen schurfft noodzakelijk. Soms kanker.

## B

- 61 **\*Roode Tulpappel.** Een oude appel van onbekende herkomst, waarvan reeds Knoop in 1758 gewag maakt, en die vermoedelijk reeds veel eerder wordt bedoeld in een oudere vermelding. Roode Kroonsappel. Roode Joop. Draagt zonder vreemd stuifmeel. Bloei vroeg. Middelmatig groeikracht. Breede

kroon. Rijk en bij niet overdadige productie jaarlijks dragend. Langwerpige, middelgrootte, bleekroode vrucht, zachtzuur. Spoedig melig. Aug.-Sept. Beschutte standplaats; op klei. Matig schurfft. Weinig monilia. Opnattengrond kanker. Zaailing of type II. Struik of halfstam. In Friesland aanbevolen.

## C

- 47 **Royal Jubilee.** Gewonnen door J. Graham te Hounslow en in den handel gebracht in 1893 door het kweekershuis G. Bunyard & Co. te Maidstone. Bunyard, Handbook I, p. 114. Bloei laat. Pollen goed. Vraagt vreemd stuifmeel, bijv. No. 21. Boom klein en zeer vroeg en rijkdragend. Appel middelmatig groot, soms groot, kegelvormig, bleek geel, soms iets donkerder aan zonzijde. Vaste, lichtzure, goede moesappel. Struik op sterken onderstam. Gezond. Klei en wordt voor het midden des lands zeer aanbevolen in de zandstreken.


## B

- 51 **Schellinghouter.** Omstreeks 1900; gewonnen door den Heer G. Dekker te Schellinkhout en in West-Friesland tamelijk veel aangeplant. Voldoet ook te Groningen goed. Vermoedelijk zaailing van No. 29. Bekroond met cert. 1e klasse te Lunteren in 1934. Zie tijdschr. Ned. Pom. Vereeniging Nov. 1934. Geen bloeigegevens. Boom van matige tot middelbare grootte, vruchtbaar, gezond. Vrucht middelmatig groot tot groot, meer hoog dan breed, bleek geelgroen, voorzien van een dunne roode streeping. Vleesch wit. Sept. Nov. Lichtzuur met aangenaam aroma, dat aan No. 29 herinnert. Carpopapsa. Tamelijk windvast.

## C

- 30 **Schöner von Nordhausen.** Gewonnen door Kaiser te Nordhausen bij den Harz en in 1892 verspreid. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Deutsche Obstbauzeitung 1916 p. 1. Bloeigegevens geen. Boom matig groot, vroeg en rijk dragend. Vrucht rond, middelmatig groot, regelmatig gevormd, groen of bleek groengeel met zachten blos, fraai, tamelijk zachtvleezig, licht zuur, goede tot zeer goede handappel voor herfst en eerste gedeelte des winters. Struik op sterken onderstam. Gezond. Zand. Windvast.

# „HARDIE” DE MOTORSPROEIMACHINE



Groote

capaciteit

Hooge druk

Eenvoud

Betrouwbaar

**HARDIE** van 21 tot 56 atmosferen druk. Capaciteit per minuut van 25 tot 187,5 LITER.

Vraagt Catalogus met prijsopgave aan bij

**KEMPES & WATERREUS ELST (Gld.)**

**TELEFOON 306**

## Appel

### A

- 1 **Schoone van Boskoop.** Belle de B., Schöner von B., **Goudreinette** (falso), Rein. monstreuse (falso), Reinette von Montfort. Nederl. Boomg. I No. 43, gekl. pl. Waarschijnlijk in de 18e eeuw onder Utrecht, bij Montfoort wellicht, ontstaan. Triploid. Bloeit middentijds, vraagt kruisbestuiving. Stuifmeel slecht kiemend. Boom op wild groot en laat dragend. Op den duur voldoende vruchtbaar, in sommige omstandigheden met neiging tot beurtjaren. Duurt den winter uit. Vrucht groot, bijna rond, iets meer hoog, groen, later geel met veel roest en neiging tot blos. Scherp zuur, in nawinter matig. Zeer goede hand- en moesappel. Rijk aan antischourbuikvitamine. Struik en kroonboom. Diverse onderstammen. Zand of klei. Vraagt luwte. Vrij veel schurft en, soms zelfs veel, kanker; meeldauw. Onder den naam „Goudreinette”, welke de meest populaire benaming in ons land is, gaan behalve Sch. v. B. ook een groot aantal andere vormen, die er betrekkelijk weinig van verschillen. Het is nog niet mogelijk hierover een duidelijk overzicht te geven, doch in ieder geval is men wel overtuigd van de noodzakelijkheid om in deze „variëteitengroep”, als blijkt dat die aanduiding niet misplaatst is, op het enthout te letten.

### E

**Signe Tillisch.** In 1866 gezaaid door den schout Tillisch te Bjerre bij Horsens in Denemarken en in 1884 door het kweekershuis Mathiesen te Korsör in den handel gebracht. Deutschlands Obstsorten, gekl. plaat. Stuifmeel vermoedelijk niet best. Draagt met eigen stuifmeel slecht. Bestuivers voor ons land niet nagegaan. Waarschijnlijk is Filippa goed. Flinkke boom, die op sterken onderstam wat traag draagt. Vrucht tamelijk groot, meer breed dan hoog, groengeel, bij rijpheid geel, nage-voeg zonder blos. Vleesch zacht en zeer goed van smaak. Herfst. Vatbaar voor schurft, monilia en meeldauw. Velen raden een onbeschutte standplaats aan. Geschikt voor verschillende onderstammen.

### E

**St. Cecilia.** Engelsche appel, door Bas-ham gewonnen. Bloeigegevens geen. Matig groote boom. Vrucht matig groot, iets hoog, goudgeel

met blos en streepen, lichtzuur en zeer goede handappel tot ver in den winter. Klei.

### A

- 9 **Sterappel.** Reinette rouge étoilée. Starappel, Sterreinette, Rote Sternreinette, Pomme de Coeur. In 1830 voor het eerst beschreven. Men meet, n dat de appel uit Nederland of België afkomstig is, rond Maastricht, Luik of Sint Truyen. Bloei laat, gaarne kruisbestuiving, mis-schien Brab. Bellefleur zoete appels of Court pendu. Boom op wild groot, laat dragend. Later meestal behoorlijk vruchtbaar. Vrucht middelmatig, rond, regelmatig, na eenige bewaring geheel rood, licht zuur, knappend. Tamelijk goede handappel. October-December. Vermoedelijk slechts voor sterke onderstammen. Vraagt luwte. Doorlatende grond, zand of klei. Zelden ziekte. Men ente niet van het roodgestreepte Ster-appeltype. Druipt. Op enthout letten.

### A

- 5 **Transparente de Croncels.** Apfel aus Croncels. In 1869 gewonnen door het Fransche kweekershuis Baltet te Troyes (Aube). Deutschlands Obst. Gekl. pl. Diploid. Bloei tamelijk vroeg. Boom op wild flink, matig vroeg dragend. Later goed vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot tot groot, regelmatig, rond, bleekgeel met goudgele zonzijde. Zeer week. September. Lichtzuur. Handappel. Struik of kroonboom. Nogal windvast. Zand of klei. Meestal gezonde boom, een enkele maal kanker. In Friesland te schurftig (zie Rein. v. Ekenstein). Gevoelig voor Californische pap. Bijzonder lastige soort, die slechts bij groote toewijding goed product oplevert. Dan echter ook voldoening geeft.

### E

**\*Vogel Calville.** Rond 1884 te Hooge Zwaluwe gewonnen door den Heer C. A. Vogel, thans wonende te Goedereede. Kleine boom, zeer vruchtbaar en geregeld dragend. Appel groot, goudgeel, rond, regelmatig, vleesch hard, bij rijpheid zacht, rijpt van October tot Maart. Goede tafelappel. Waarschijnlijk ook zeer goede moesappel. Gezond. Struik op sterken onderstam.

### C

- 31 **Wealthy.** Rond 1861 gewonnen door P. M. Gideon te Excelsior, Minn. Ver. Staten, Hedrick, Apples of New York, II, p. 236. Diploid. Pollen twijfelachtig.

**Vruchtboomkwekerijen  
„HAESTERDT”**

**JOS. KUYPERS - SWALMEN  
TELEFOON 595 - ROERMOND**

**Uitgebreide kwekerijen van uitsluitend  
VRUCHTBOOMEN**

**Aangesloten bij de N.A.K.  
Groot-cultuur op East-Malling typen**

**SPROEIKALK**

**HOOG KALKGEHALTE  
GROOTE FIJNHEID**



**STOEL'S KALKFABRIEK**

**LUTTIK OUDORP 25 - ALKMAAR - TELEF. 3541**

## Appel

Kan worden bestoven door Filippa. Boom matig groot en zeer vroeg en rijkdragend. Wil gedund worden. Appel matig groot tot groot, ongeveer rond, groen met schitterende roode streeping, vleesch zacht, lichtzuur met den smaak van veel Amerikaansche appels. Goede handappel voor September. Struik op sterken onderstam. Zand of klei. Vraagt beschutting. Gezond. Een der weinige Amerikanen, die hier een goed figuur maakt.

## E

**Worcester Pearmain.** Gewonnen door den Heer Hale te Swan Pool bij Worcester als zaailing van Devonshire Quarrenden en in 1874 in den handel gebracht door R. Smith te Worcester. Boom van middelbare grootte en groote productiviteit. Vrucht middelmatig groot, rond en regelmatig gevormd, goudgeel met veel blos. Zuur, aromatisch. Vroege herfst. Zie verder Hogg Fruit Manual 1875 en Bunyard Handbook.

## A

**7 Yellow Transparent.** White Transparent, Transparente jaune, Weisser Klarapfel, Vitt Klaräpple, Klaraeble. Madeleine falso.

Uit het Baltische deel van 't oude Tsarenrijk, men meent wel Lijfland. Diploid. Pollen goed. Bloei middentijds. Wordt bestoven door No. 5, 18 en 60. Boom op wild matig groot, zeer vroegdragend. Vruchtbaar. Vrucht middelmatig groot, iets hoog, regelmatig, bleek groen, Juli-Augustus, iets knappend, zuur, goede moesappel, als handappel juist bruikbaar. Onderstam sterk. Struik. Nogal windvast. Zand of klei. Weinig schurft, veel, soms te veel kanker, veel zaagwesp. Naast de Juli-Yellow treft men ook een latere, groene, die men mijde. Of dit een andere variëteit is, is onzeker.

## C

**39 Zigeunerin.** Voor rond 20 jaren door het kweekershuis Vallen te Swalmen ingevoerd uit Riga, waar de appel werd

gekweekt door „Gartendirektor Kuphaldt”. Zelffertil. Boom vermoedelijk slechts matig, vroeg en rijk dragend. Appel groot, rond, onregelmatig. Buitengewoon fraai rood gekleurd. Vleesch tamelijk zacht, zuur; zuinige tot matig goede handappel, doch op sommige plaatsen en in sommige jaren aanmerkelijk beter. Augustus-September. Struik op sterken onderstam. Zand of klei. Gezond. Wordt soms aanbevolen.

## A

**12 Zoete Ermgaard.** Herkomst onbekend. Vermoedelijk Nederlandsch. Was in 't midden der vorige eeuw reeds door 't land verspreid. Nederl. Boomgaard No. 7. Bloei laat; bestuivingseischen onbekend. Boom groot op wild, matig laat dragend, later goed vruchtbaar, doch beurtjaren. Vrucht hoog, middelmatig groot, evenals Zoete Campagner bijna geheel met roode streeping overdekt, doch van levendiger kleur. Sorteert goed. Zoet. Potappel tot ver in den winter. Windvast. Kroonboom. Zand of klei. Gezond. Gevoelig voor zwavel.

## B

**23 \*Zoete Kroon.** Zoete Winterkroon. Gelijkt op de Rozekroon. Gevonden door S. H. Brouwer te Noordbroek in den tuin van Van der Molen-Stelmaker te Noordbroek rond 1870 en door den heer Brouwer rond 1890 in den handel gebracht. Feestgids Tentoonstelling Provinciale Boomkweekersvereeniging rond 1908. Zelffertil. Goede stuifmeelleverancier. Bloeit laat.

Boom matig groot, op wild 6-8 m breed, vroeg en rijkdragend. Vrucht middelgroot tot klein, bolrond, fraai roodgestreept op goudgelen grond, matig vast tot zacht, zoet. Handappel en goede potappel tot Februari. In het Zuiden soms slechts vroege herfstappel. Struik op sterken onderstam, desnoods kroonboom. Buitengewoon gezond. Wantsen. Voor bijna alle gronden. Wordt aanbevolen ter vervanging van 12 en Zoete Campagner. In het Zuiden nog onvoldoende nagegaan.

District:

## A Algemeen sortiment.

|                      | I | II | III | IV | V | VI |
|----------------------|---|----|-----|----|---|----|
| 1 Boskoop . . . . .  | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 3 Cox's . . . . .    | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 4 Victoria . . . . . | x | —  | x   | x  | x | x  |
| 5 Croncels . . . . . | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 7 Yellow . . . . .   | x | —  | x   | x  | x | x  |
| 8 Manks . . . . .    | x | —  | x   | x  | x | o  |

x = geschikt, o = ongeschikt, — = onvoldoende ondervinding.

# JAN VAN WILLEGEN Gz.

BOOMKWEKER  
**HEERLE (N.-BR.)**

(OVER 'T STATION WOUW)

BIEDT AAN: ALLE SOORTEN

## VRUCHTBOOMEN

OP DE GEVRAAGDE ONDER-  
STAMMEN IN PRIMA KWALITEIT

Onder contrôle N.A.K.

uitgestrekte kweekerijen opzandgrond van

**vruchtboomen,**

**laanboomen,**

**boschplantsoen,**

**border- en rotsplanten,**

**coniferen** en verder alles wat tot het vak behoort, ook in de **nieuwste** en **fijnste sortimenten**.

lage prijzen; prima bekweekte waar.

Kosteloos advies enz. bij opdracht van het werk.

vanaf den zomer 1936 onder contrôle N.A.K.;  
aanbevelend

**boomkweekerijen**

**fa gebr. hartemink · doetinchem**

**tuinarchitectuur.**

telefoon 460

## Appel

|                          | I | II | III | IV | V | VI |
|--------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| 9 Sterappel . . . . .    | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 10 Gron. Kroon . . . . . | o | o  | x   | x  | x | —  |
| 12 Ermgaard . . . . .    | x | —  | x   | x  | x | —  |
| 13 Bramley . . . . .     | x | —  | x   | x  | x | x  |

## B Plaatselijk sortiment.

|                               |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lemoen . . . . .            | o | o | x | x | x | — |
| 6 Bloemee . . . . .           | o | o | o | x | x | — |
| 16 Zuccamaglio . . . . .      | o | o | — | x | x | o |
| 17 Present v. E. . . . .      | o | o | x | x | x | o |
| 18 Landsberger . . . . .      | o | o | o | o | x | o |
| 19 Pfirsichroter . . . . .    | x | o | x | o | o | o |
| 21 Lane's . . . . .           | x | o | o | o | o | o |
| 22 Brab. Bellefl. . . . .     | o | o | o | o | o | x |
| 23 Zoete Kroon . . . . .      | x | o | x | x | — | — |
| 24 Ossenkop . . . . .         | o | o | o | o | o | x |
| 25 Fransche Zure . . . . .    | o | o | o | o | o | x |
| 26 Ekenstein . . . . .        | — | — | x | — | — | — |
| 27 Klumpke . . . . .          | o | o | o | o | o | x |
| 28 Notaris. . . . .           | o | o | o | x | x | x |
| 34 Drentsche Bellefl. . . . . | o | — | x | x | o | o |
| 51 Schellinghouter . . . . .  | — | — | x | — | — | — |
| 60 Keswick . . . . .          | o | o | x | x | x | o |
| 61 Roode Tulp . . . . .       | o | o | x | — | o | o |
| 63 London Pippin . . . . .    | — | — | x | — | — | — |

## C Beproeverswaardige appels.

|                                |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 15 Allington Pipp. . . . .     | o | — | x | — | — | — |
| 29 Princessenobel . . . . .    | — | — | — | — | — | — |
| 30 Nordhausen. . . . .         | — | — | — | — | x | — |
| 31 Wealthy . . . . .           | — | — | — | — | x | — |
| 36 James Grieve . . . . .      | — | — | — | — | x | — |
| 37 Luntersche Pipp. . . . .    | — | — | x | x | — | — |
| 39 Zigeunerin . . . . .        | x | — | x | — | — | x |
| 41 Laxtons Superb . . . . .    | x | — | x | — | x | — |
| 42 Glorie v. Holland . . . . . | x | — | x | — | x | — |
| 43 Jonathan . . . . .          | x | — | — | o | o | — |
| 47 Jubilee . . . . .           | — | — | x | x | x | — |
| 48 Bath . . . . .              | — | — | x | — | — | — |
| 57 Ellisons . . . . .          | x | — | — | — | — | — |

## E Nieuwe appels.

|                             |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Signe Tillisch . . . . .    | — | o | o | o | o | o |
| Koningszuur . . . . .       | — | — | — | — | — | — |
| Åkerö . . . . .             | — | — | — | — | x | — |
| Dr. Seeligs . . . . .       | — | — | — | — | — | — |
| St. Cecilia . . . . .       | — | — | — | — | — | — |
| Bosappel . . . . .          | — | — | — | — | x | — |
| Wijnzuur . . . . .          | — | — | — | — | x | — |
| Vogelcalville . . . . .     | — | — | — | — | — | — |
| Eethensche Wijn . . . . .   | — | — | — | — | x | — |
| Pater v. d. Elsen . . . . . | — | — | — | — | — | — |
| Anna Boelens . . . . .      | — | — | — | — | — | — |
| Pres. v. Holland . . . . .  | — | — | — | — | — | — |
| Worcester . . . . .         | — | — | — | — | o | — |
| B.G. Apple . . . . .        | — | — | — | — | o | — |
| May Queen . . . . .         | — | — | — | — | x | — |
| Dekkers Glorie . . . . .    | — | — | x | — | — | — |



Hofleverancier  
van H.M.  
de Koningin

## **F. KUIPER** **VEENDAM**

**Speciale cultures van:**

**Onderlagen, als Doucin, Kweeper,  
Pruim, Kers, Appel, Peer, enz.**

**Jong Vruchtgoed en  
Klein Fruit**

Onder Contrôle van de N.A.K.

Prijscourant, ook van andere artikelen, op aanvraag

## **FRUITTELERS!**

Vraagt nu Uw handelaar of organisatie  
voor bemesting van **Vruchtboomen**

**A.S.F. KORRELS** 12 x 10 x 18

**Geconcentreerde volledige meststof in Korrelvorm**

Analyse: 12% Stikstof — 10 % Fosforzuur  
18% Kali — Chloorvrij, in water oplosbaar

Bemesting voor boomgaarden en fruitaan-  
plantingen: 1000 à 1200 kg per hectare

**N.V. Amsterdamsche Superfosfaatfabriek**

**UTRECHT - Maliebaan 81**



## Abrikoos, Braam

### ABRIKOOS.

De teelt dezer ooftsoort is in ons land zoo weinig belangrijk en biedt zoo slechte vooruitzichten in verband met ons klimaat en de hoedanigheid der vruchten, die men hier pleegt te oogsten, dat het nauwelijks betekenens heeft er melding van te maken. Slechts voor den liefhebber moge de abrikoos aantrekkelijk blijken. In het rivierkleigebied van Eisdon tot Gorkum vindt men vaak abrikozen als leiboom tegen het huis. De naam der verscheidenheid of wellicht de namen der verscheidenheden zijn, voor zoover de schrijver weet, nimmer goed nagegaan. Men noemt **Breda'sche** en **Oranje**. Voor de serre wordt speciaal de Oranje aanbevolen. Misschien is er geen verschil. De abrikoos wordt geoculeerd op de Enkele Boerenwitte pruim, die elders Enkele Witte Wijnpruim, Boerengeeltje of Gele Kroosjespruim heet.

**Bes Rood** zie Aalbes.

**Bes Witte** zie Aalbes.

**Bes Zwarte** zie Zwarte bes.

### BRAAM

De teelt van bramen beteekent hier te lande zeer weinig. Een braam, die bijna altijd goede uitkomsten geeft is de **Parsley-leaved**, ook bekend als *Rubus laciniatus* Hort, kenbaar aan de peter-selieachtige, diep ingesneden bladeren. De zwarte vrucht is in September rijp en heeft de eigenschappen van flinke inheemsche wilde bramen. Eischen aan grond en standplaats uiterst matig.

### DRUIF

#### A

- 2 **Alicantsche**. Spaansche, Blaue Alicante, Black Alicante, Granacke, Granaxa Oude Spaansche druif. Deutschlands Obstsorten, Goethe, Handbuch Tafeltraubenkultur p. 40, beide met gekl. pl. Pacottet et Dairat Cultures de Serres p. 503. Zelfbestuiver. Blad gewoon. Zeer vruchtbaar. Korrel middelmatig groot. Bij sommige boomen langwerpig, bij andere rond. Tros groot tot zeer groot, vaak onregelmatig, zeer goed geschouderd, blauw, tamelijk laat, stevig en een matig goede tafeldruif, wanneer zij niet te vroeg gebruikt wordt. Verdraagt verzending goed. Staand of liggend snoer. Snoei kort. Krent niet zoo gemakkelijk als andere druiven. Dood gaan der gestekte boomen komt nogal voor. Men meent het te kunnen verhelpen door,

#### Druif

boven den grond, te enten op No. 1. De sterke teruggang onzes uitvoers heeft tot zeer slechte prijzen geleid. Vooral bij koude teelt is dat te verwachten. De A. laat zich door stoken vervroegen, rijpt in koude serre en laat zich verlaten. Koelhuis. Gezond.

#### C

- 13 **Appley Towers**. Gewonnen door Th. Myles op het eiland Wight. In 1889 bekroond door de R. H. Society. Ontstaan door kruising Alicante en Colman. Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd. Vuchtbaar. Bes groot, iets langwerpig. Tros regelmatig, behoorlijk geschouderd en van middelbare grootte. Blauw, zwaar bedauwd, knappend vleesch, rijpt vóór Alicante, goede tafeldruif. Meeldauw. Staand of liggend snoer. Snoei lang. Ruim krenten. Koude kast of stookserre.

#### A

- 1 **Frankendaler**. Blauer Trollinger, Black Hamburg, Frankenthal, Frankenthaler, Blå Frankendaler. Oude druif van onbekende herkomst. Men meent wel uit Italië. Pacottet et Dairat, Cultures de serres p. 505. Zelfbestuiver. Blad gewoon. Matig vruchtbaar. Korrel middelmatig groot, tros middelmatig groot, behoorlijk geschouderd, blauw, vroeg, zoet, week en een zeer goede tafeldruif, die de verzending echter slecht verduurt. Liggend snoer en lang snoeien. Selectie van stekhout wordt zeer aanbevolen. Stookserre of koud. Niet voor verlaten. Lamsteel.

#### B

- 4 **Golden Champion**. Engelsche druif, in 1863 door Thompson te Dalkeith gewonnen. Bunyard Handbook Hardy Fruits II p. 206, Pacottet et Dairat Cultures de Serres p. 482. Kunstmatig bestuiven met Alicantsche. Blad diep ingesneden. Vuchtbaar. Vucht groot, tros groot, goed geschouderd, bleekgroen, vroeg, zoet, tamelijk stevig en zeer goede tafeldruif. Liggend of staand snoer. Stookserre of koud.

#### B

- 3 **Gros Colman**. Dodrelabi, Blaues Ochsenauge, Gros Colmar. Waarschijnlijk zeer oude druif uit den Caucasus. Goethe Handbuch Tafeltraubenkultur p. 46, Deutschlands Obstsorten, beide met gekl. pl. Pacottet et Dairat Cultures de Serres p. 508. Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd. Boom vruchtbaar. Bes

TELEF. 27

**FR. FRENKEN & ZOON**

TELEF. 27

**BOOM- EN ROZENKWEKERS**

**HEIJTHUIJSEN**

(bij Roermond)

**HEIJTHUIJSEN**

---

**Wij leveren U prima kwaliteit**

Aan kwaliteit en soortechtheid wordt de meeste zorg  
besteed, zoowel in het belang van ons en onze afnemers.

**Aanleg van Boomgaarden en Fruittuinen.**

**Kwekerijen onder contrôle N.A.K.**

Wij noodigen U beleefd uit tot een bezoek aan onze kwekerijen.

**Gebr. Poelmans - Ravenstein**

**Boomkwekerijen**

**Speciale vruchtboomcultures**

op type I • II • IV • IX • XIII en XVI

alsmede Kwee A en C

**Bezoekt onze kwekerijen**

Onze kwekerijen staan reeds vanaf 1931 onder contrôle  
van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.)

## Druif

groot. Tros flink en regelmatig gevormd, behoorlijk geschouderd. Blauw, laat, stevig en een zeer goede tafeldruif, die de verzending uitstekend verdraagt. Staand of liggend snoer, snoei kort. Krent gemakkelijk. Stookserre. Kan worden verlaat. Buitengewoon vatbaar voor lamsteligheid. Goed ontwaterde grond. Klei. Temperatuur hoog houden (30° C).

## B

- 6 **Gros Maroc.** Blauer Damascener. Uit het Middellandschezeegebied, wellicht Azië of Afrika. Goethe Handbuch Tafeltraubenkultur p. 47, gekl. pl. Pacottet et Dairat Cultures de Serres p. 510. Zelfbestuiver. Matige vruchtbaarheid. Blad gewoon. Bes groot, tros slechts bij goede behandeling behoorlijk groot, anders klein, goed geschouderd. Blauw, donker gekleurd en zwaar bedauwd, uit koude kast zuur, uit stookkast zoet, tamelijk stevig, middelmatig vroeg. Al naar behandeling matige tot goede tafeldruif. Liggend snoer, zeer lange snoei. Krent gemakkelijk. Koud of stook. Zeer gezond.

## C

- 10 **Koning der Witten.** Gewonnen in 1920 door den Heer A. G. de Vette te Wateringen en in 1932 in den handel gebracht. Zeer vruchtbare boom. Bes buitengewoon groot, tros zeer groot en breed geschouderd. Bleek groengeel, rinsch, iets weeker als Alicantsche en even later rijp. Tafeldruif van middelmatige tot matige hoedanigheid. Snoei kort. Wellicht vatbaar voor meeldauw.

## B

- 7 **Muskaat van Alexandrië.** Weisser M. v. A., Muscat of A., Muscat d'A. Eenige

eeuwen oude druif uit het Middellandsche zeegebied, waarschijnlijk Egypte. Goethe Handb. Tafeltraubenkultur. Gekl. pl. Pacottet et Dairat. Cultures de Serres p. 515. Zelfbestuiver; bestuiving echter nog al eens onvoldoende. Blad diep ingesneden. Bij goede vruchtzetting flink vruchtbaar. Bes groot. Tros groot, lang, met afhangelende schouders. Bleekgroen geel, knappend, muskusachtig, laat. Fijne tafeldruif. Duurzame en verzendbare vrucht. Staand snoer, kort snoeien. Vooral in bloei flink warm houden. Soms veel lamsteligheid. Meeldauw en spint.

## C

- 8 **Victoria.** Gewonnen in 1920 door den Heer A. G. de Vette te Wateringen. In den handel gebracht in 1929. Bekroond in 1929 te Poeldijk, in 1933 te Naaldwijk. Zelfbestuiver. Blad diep ingesneden. Zeer vruchtbaar. Bes flink. Tros tamelijk groot en middelmatig geschouderd. Groenwit, ongeveer de stevigheid van Alicantsche, smaak goed, rijpt iets voor Alicantsche. Goede tafeldruif. Liggend snoer. Snoei gewoon. Stook of koud. Weinig lamsteel. Vruchtbaar.

## C

- 11 **Witte Frankendaler.** Gewonnen in 1920 door A. G. de Vette, te Wateringen. In den handel gebracht in 1929. Zelfbestuiver. Blad gewoon gevormd. Vruchtbaarheid goed. Bes middelmatig groot, tros grootte goed, regelmatige, weinig geschouderde tros. Bleek groengeel, fraai, bij volledige rijpheid bijzonder zoet, iets steviger als Frankendaler, vroeg, zeer fijne tafeldruif. Liggend snoer, kort snoeien. Stookkast. Bij te langen snoei lamsteligheid.

|   |                           | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A | 1 Frankendaler . . . . .  | x | x  | x   | x  | x | x  |
|   | 2 Alicantsche . . . . .   | x | x  | x   | x  | x | x  |
| B | 3 Gros Colman . . . . .   | x | o  | o   | o  | x | x  |
|   | 4 Golden Champion . . .   | x | —  | x   | x  | x | x  |
|   | 6 Gros Maroc . . . . .    | x | o  | x   | —  | x | —  |
|   | 7 Muskaat van Alexandrië  | x | o  | x   | o  | o | o  |
|   | 8 Victoria . . . . .      | — | —  | —   | —  | — | —  |
| C | 10 Koning der Witten . .  | — | —  | —   | —  | — | —  |
|   | 11 Witte Frankendaler . . | — | —  | —   | —  | — | —  |
|   | 13 Appley Towers . . . .  | — | —  | —   | —  | — | —  |

x = geschikt, o = ongeschikt, — = onvoldoende ervaring.

## Framboos

### FRAMBOOS.

#### A

2 **Lloyd George.** Bunyard Handbook II p. 234; Schaal, Stein- und Beerenobst p. 110. Gekl. pl. Gewonnen door den Engelschen bloemist Kettle en in de oorlogsjaren in den handel gebracht. Bloeit tweemaal, eerst vroeg in Mei, en dan kortstondig en later in den herfst op het einde van de jonge loten. Heeft zeer veel en donker gekleurde stekels. Groeit niet hoog en maakt veel uitloopers. Draagt rijk. Vruchten der late bloemen worden vaak niet goed rijp. Vrucht groot. Op zand week, langwerpig, flauw van smaak, donker van sap. Oogsttijd vroeg en kort van duur. Tafel en fabriek. Bloeitoppen in September uitsnijden. Heeft hier te lande alom mozaïek, hetgeen weinig aan de productie schaaft. Vatbaar voor verticillium en callusziekte. Byturus.

#### A

1 **Sint Walfried.** In 1926 door den schrijver gewonnen en in 1931 in den handel gebracht. Bloei kortstondig en vroeg; eenmalig. Stekeltjes, weinig talrijk, donker. Groeit hoog en maakt veel uitloopers. Draagt rijk. Vrucht buitengewoon groot, wanneer grond en weersgesteldheid niet te

|                          | I | II | III | IV | V | VI |
|--------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A St. Walfried . . . . . | x | x  | x   | x  | x | o  |
| Lloyd George . . . . .   | x | x  | x   | x  | x | o  |
| Preussen . . . . .       | x | —  | x   | x  | x | x  |

x = geschikt, o = ongeschikt, — = weinig ervaring.

### HAZELNOOT.

De verbouw van hazelnoten is niet aantrekkelijk. Zij bloeien soms reeds in het hartje van den winter, waardoor de oogst zeer wisselvallig blijkt te zijn. 't Meest geschikt zijn voor deze teelt de kustprovincies.

Behalve de plaatselijke verscheidenheden zou men Merveille de Bollwiller en de Hallesche Riesennuss kunnen planten. Men zij op bestuivingsproblemen bedacht. Laatstgenoemde is zelfsteriel.

## KERS.

### KRIEKEN.

#### A

9 **Abbesse de Mouland.** Bastaard-dikke, Eisdensche Kers. Oude kers uit de omgeving van Moelingen. Rietsema, Ker-

## Kers

droog zijn. Op zand week, op klei stevig, langwerpig, flauw van smaak, sap, kleur goed. Oogsttijd vroeg en kort van duur. Tafel en fabriek. Ruim planten. Geen noemenswaarde schade van verticillium of callusziekte. Wordt hevig ziek van mozaïek, doch er zijn gezonde partijen in den handel. Wie gezond plantgoed wil houden, isoleere en selecteere streng. Volgens sommigen moeilijk heel te plukken. Zal waarschijnlijk slechts tijdelijk betekenissen hebben.

#### A

3 **Preussen.** In 1915 in Deutschland als zaailing gewonnen en in 1919 door A. Langer te Helmstedt in den handel gebracht. Der Obst- und Gemüsebau 1926 p. 390; Schaal, Stein- und Beerenobst. Gekl. pl. p. 105. Bloeit laat en kortstondig, eenmalig. Matig gestekeld; stekels groen. Groeit buitengewoon hoog. Uitloopers middelmatig talrijk. Draagt matig. Vrucht groot, meestal stevig, op enkele zandgronden week. Rond, goed van smaak, bleek van sap. Oogsttijd laat en kort van duur. Heeft slechts als tafelframboos waarde. Lijdt sterk onder mozaïek, ofschoon er nog gezonde partijen voorkomen. Sterk vatbaar voor verticillium. Dankbaar voor Bordeauxsche sap. Byturus matig.

senvormen p. 185. Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 2. Kan worden bestoven door 2, en Blankette. Verder voor dit sortiment niet nagegaan. Boom groot, opgericht. Matig vruchtbaar. Kers zwart met zwartviolet, zoet en hard vleesch, hartvormig, rijp half Juli. Tafelkers. Op klei gezond.

#### C

22 **Beeksche late.** Zeer oude kers. Oorsprong onbekend. Rietsema Kersenvormen p. 165.

Boom groot, vruchtbaar. Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 8, en 21 en wordt in sommige jaren bestoven door 5, als regel zeer goed door 8, en 21. Kleur violet-zwart tot zwart. Vóór de volkomen rijpheid aan de buikzijde een zwarte streep overlangs. Hartvor-

## Kers

mig met ingedeukten top en bijzonder korten steel. Vleesch zwart-violet, hard. Rijpt eind Juli tot soms in Augustus. Tafel. Zand.

## B

- 15 **Dikke Loen.** Tamelijk vroege, weeke, zwarte kers. Klei. Uitsluitend voor Zuid-Limburg.

## A

- 8 **Drogans Gelbe Knorpelkirsche.** Citroenkers. Witte Wijnkers. Rond 1808 door Drogan te Guben gewonnen. Rietsema Kersenvormen p. 151. Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 14, 21 en 22. Kan worden bestoven door 5, 14, 21 en 22. Boom groot. Groei breed. Vruchtbaar. Kers groot, geheel geel, daardoor wel eens minder verkoopbaar, hard, zoet, rond, rijp in 2e helft Juli. Tafel. Gezond. Zand en klei. Vervangt De Gelbe Kn.k. van Dönnissen en van Büttner en „Witte Wijnkers” der Zeeuwen. In Zeeland echter nog weinig bekend.

## A

- 1 **Early Rivers.** Deutsche Meikers. Vroege Deutsche, Franche Meikers, Geldersche Kers. Droeg voor het eerst in 1869. Gewonnen door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth, Engeland. Rietsema, Kersenvormen p. 168. Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift No. 2, 3, 5, 6 en 23. Kan zelf worden bestoven door 2, 3, 5 en 6. Boom groot, vruchtbaar, groeit breed. Granaatrood van huid en vleesch, tamelijk week, hartvormig, zoet, rijp Juni. Tafel. Tamelijk gezond, klei en niet te natte zandgrond.

## B

- 18 **Eierkriek (Dubbele).** Eierkriek. Herkomst onbekend. Rietsema Kersenvormen p. 190. Late zwarte kers. Kan worden bestoven door No. 5 en bestuift wederkeerig No. 5 ook. Klei. Wat de vrucht aangaat is Klerk beter. Deze ontleent haar waarde in hoofdzaak aan de pollenproductie voor Klerk, waarvoor men echter ook andere kersen kan kiezen. De boom is kenbaar aan het eenigszins om de hoofdnerf gewrongen blad.

## B

- 13 **Elton Heart.** Bigarreau Elton, Elton. In 1806 in Engeland gewonnen door Th. A. Knight. Rietsema Kersen p. 23. Bloei vroeg of tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Verder hier te lande nog niet nage-

gaan. Boom groot, zeer vruchtbaar. Vrucht groot, spits hartvormig, bont, geelvleezig, zeer week, zoet, begin Juli rijp. Tafelkers. Zand en klei.

## B

- 16 **Hollander.** Stroopkers. Vroege zwarte kers. Herkomst onbekend. Rietsema Kersenvormen p. 192; gekenmerkt door een blaadje op den gemeenschappelijke vruchtsteel. Zelfsteriel. Kan worden bestoven door No. 5 en 17. Uitsluitend voor Zeeland aanbevolen.

## C

- 27 **Inspecteur Löhnis.** Rond 1920 door P. J. Nelissen te Oeffelt gewonnen. Bestuivingseisen onbekend. Hartvormig, zwart, donker van vleesch week, zoet, rijp 1e helft Juli. Tafelkers. Vruchtbare, breede boom.  
**Hedelfinger Riesen.** Laatbl. Vrucht groot, donkerrood, vast, met uitstekend stempelmerk. Slechts voor Limburg. Op zand vaak ziekelijk.

## A

- 5 **Klerk.** Beierlander, Beierlandsche Kriek Klerkekriek, Suikerkriek. Het vermeende of beweerde verschil tusschen Beierlander en Klerk is denkbeeldig. Vermoedelijk een zeer oude Nederlandsche, waarschijnlijk Zuidhollandsche kers. Rietsema kersenvormen p. 183. Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 1, 2, 3, 8, 16, 17, 18, 23 en 32. Wordt wederkeerig bestoven door 1, 2, 3, 7, 16, 17, 18, 23 en 32. Boom groot, opgericht. Vrucht zwart van huid, zwartviolet van vleesch, tamelijk week, hartvormig, zoet, einde Juli rijp. Gezond en vruchtbaar. Tafelkers. Klei en zand.

## E

**Koningskers.** Verscheidenheid van tot heden onbekende herkomst, die te Helenaveen is aangeplant in een door H. M. de Koningin geschonken aanplanting, waar zij thans zeer de aandacht trekt. De boom wordt groot en kan bij juiste bestuiving (vermoedelijk No. 7) rijk dragen. De vrucht is zeer groot, donkerrood, vastvleezig en laat rijp, ongeveer met Klerk en Beeksche Late. Wordt thans gekweekt door den Heer M. H. Erkels te Helenaveen.

## A

- 3 **Mierlo'sche Zwarte.** Mierlo'sche kriek, Udensche kriek, Ud. Zwarte en soms op de veilingen Loen. Rietsema kersenvor-

# ADR. LEYS & ZN - BREDA

TERHEYDENSCHWEG G 4 - TELEF. 3325

●

Eerste aangeslotene bij de keuringsdienst N. C. B.  
afdeeling van de N.A.K.

Vraagt plannen en prijsopgaaf,  
van de meest praktische en Economische  
Fruitaanplantingen

Door strenge selectie prima Moederboomen  
in eigen Fruittuin

●

Plannen en Teekeningen gratis

Vraagt Catalogus

# P. VISSER - NAARDEN

TELEFOON 3756

●

PERZIKKASSEN: Jac. Verhoeflaan 9

KWEEKERIJEN: Bollelaan

## VRUCHTBOOMEN

RUIM 100 SOORTEN PERZIKEN  
VAN IEDERE SOORT MOEDERBOOM IN DE KAS!!!

## Kers

men p. 180. Waarschijnlijk een 19e eeuwse aanwinst uit de Meierij van den Bosch.

Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift No. 1, 2, 5, 7 en 23 en kan, omgekeerd, zelf door deze kersen worden bestoven. No. 7 bloeit vaak iets na 3. Boom groot, vruchtbaar, opgericht groeiend. Zwart van huid, zwart-violet van vleesch, tamelijk week, hartvormig, zoet, vóór rijpheid bitter, rijp begin Juli. Tafel. Gezond. Zand.

## C

- 23 **Molenkers.** Herkomst onbekend. Door den schrijver te Princenhage zonder paspoort aangetroffen. Vermoedelijk reeds oud. Zie Rietsema Kersen p. 36. Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 2, 3 en 5. Wordt bestoven door 1, 2, 3 en 5. Boom groot en vruchtbaar. Kers langwerpig hartvormig, zwart met zwart-violet vleesch, week, reeds vóór rijpheid zoet. Tafel. Vochthoudende zandgrond deert deze kers minder dan de meeste andere. Gezond.

## A

- 21 **Pater van Mansfeld.** Père v. M., Father v. M., Vater v. M. Markies. Rond de eerste jaren dezer eeuw door W. Hage-naars te Bergen op Zoom gewonnen. Rietsema Kersenvormen p. 184. Bloeit tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 5, 8, en 22 en wordt wederkeerig door deze drie bestoven. Boom middelmatig groot, breed, zeer vruchtbaar. Kers rond of stomp hartvormig, granaatrood, donker van vleesch, tamelijk vast, zoet, begin Juli rijp. Tafelkers. Zand en klei.

## A

- 7 **Udensche Spaansche.** Misschien in en rond Uden en indien dat juist is, dan waarschijnlijk tamelijk vroeg in de vorige eeuw ontstaan. Rietsema, Kersenvormen p. 159. Bloei tamelijk vroeg. Zelfsteriel. Bestuift 3, 5, 8 en 21. Kan worden bestoven door 3. Boom groot. Opgericht. Vruchtbaar. Vrucht groot, bont, vleesch geelwit, hard, zoet. Hartvormig. Rijp Juli, enkele dagen na Big Napoleon. Tafel, suikerwerken, bakkerij. Laat zich beter verzenden dan Big. Nap. en kan deze waarschijnlijk alszins vervangen. Gezond. Klei en zand.

## A

- 2 **Variksche Zwarte.** Groote Zwarte. Groote Variksche Zw. Vrij zeker een late 18e

eeuwse of vroege 19e eeuwse kers uit Varik. Rietsema, Kersenvormen p. 176. Bloei vroeg. Zelfsteriel. Bestuift No. 1, 3, 5, 9 en 23, kan, omgekeerd, zelf worden bestoven door dezelfde kersen. Boom groot, vruchtbaar, wat opgericht groeiend. Zwart van huid, zwart-violet van vleesch, matig vast, kort hartvormig met gedeukten top, zoet, rijp rond 1 Juli. Tafel. Gezond, klei en zand.

## C

- 24 **Wilhelmina.** Gewonnen door P. J. Nellissen te Oeffelt rond 1920. Vermoedelijk kruising van Dubbele Meikers en Bastaarddikke. Bestuivingseischen niet bekend. Boom vermoedelijk middelmatig groot. Vruchtbaar. Zwarte kers voor midden Juli. Zoet, buitengewoon smakelijk. Week. Tafelkers. Voor zoover we kunnen oordeelen gezond.

## B

- 17 **Zeeuwsche Zoete Morel.** Bruine Blansje. Bruintje. Herkomst onbekend. Rietsema, Kersenvormen p. 178. Tamelijk late, granaatroode, kleine kers, breed van groei. Zelfsteriel. Kan worden bestoven door No. 5. Bestuift wederkeerig No. 5 ook. Zand en klei.

## B

- 12 **Zwarte Spaansche.** Oude kers van onbekende herkomst. Zelfsteriel. Hartvormig, zwart, hard, half Juli rijp. Tafel. Klei.

## Rojalen.

## A

- 10 **Dubbele Meikers.** Meikers, Geldersche M., Dutch Duke (early), Holländische Süßweichsel (früh). Tôt et tard (précoce). Deze Belgische naam is wel juist, doch alle T. et T. précoce is niet Dubb. Meikers, Rietsema Kersenvormen p. 203. Bloei tamelijk laat. Zelffertil. Boom matig groot. Zeer vruchtbaar. Vertoont vaak takken met afwijkende, nl. later rijpende, zuurdere, langwerpigere vruchten, volgers genaamd. De standaardboom te Breda wordt vrijgehouden van volger-takken. Vrucht kort hartvormig, zeer week, granaatrood of bloedrood, lichtzuur, in Juni rijp. Tafel en fabriek. Gezond. Zand en klei, vraagt een iets vochthoudender grond en verdraagt een iets lager grond dan de kriecken. Bruikbaar onder glas.

## Kers

### B

- 32 **Knolkers**. Rothe Maikirsche. Arch Duke. Griotte de Portugal. Oude kers van onbekende herkomst. Zou volgens Leroy uit den Romeinschen tijd dagteekenen, hetgeen echter niet waarschijnlijk is. Rietsema, Kersenvormen.  
Bloei middelmatig vroeg. Zelffertielt. Zet wellicht bij kruisbestuiving beter vrucht dan met eigen stuifmeel. Bestuiver is No. 5; bestuift ook omgekeerd de Klerk wel. Matige boom, vruchtbaar. Gelijkt op de Dubbele Meikers, doch is wat langwerpiger en even later. Goede tafelkers. Is denkelijk beter op hoogere gronden thuis dan No. 10, doch verdraagt ook lagere grond wel. Maakt weinig volgers. In het rivierklei-gebied geeft men de voorkeur aan No. 10. In het Zuiden acht de schrijver deze beter. In Zeeland onbekend.

## Walen.

### A

- 11 **Dubbele Morelkers**. Griotte du Nord. Grosse Lange Lothkirsche, Schattenmorelle, Morelle, Noordkriek, Zure Morel, Morel.  
Eeuwenoude kers van onbekende herkomst. Rietsema Kersenvormen p. 217. Bloei laat. Zelffertielt. Boom klein. Zeer vruchtbaar. Vrucht rond, groot, vooral

op vochthoudenden grond; granaat- of bloedrood, scherp zuur, week, rijp Juli-Augustus. Stoofkers. Geschikt voor brandewijn. Monilia. Zand, klei en veen. Bruikbaar aan Noordmuur.

### B

- 19 **Kentish**. Early Kentish Virginian May Cherry, Virginian, Roode Waalsche, Grienne, Griaine. Zeer oude kers van onbekende afkomst. Rietsema Kersenvormen p. 214.  
Bloei matig vroeg tot tamelijk laat. Waarschijnlijk zelffertielt. Boom matig tot middelmatig groot. Zeer vruchtbaar. Vrucht iets afgeplat, nl. meer breed dan hoog. Ceriserood, geelwitvleezig, zeer week, scherp zuur, begin Juli rijp. Groeit overal doch laat zich buiten Limburg moeilijk tegen loonende prijzen verkoopen. Bakkerij, keuken. Zand en klei.

### B

- 20 **Westerleesche Kriek**. Vermoedelijk in de vorige eeuw in Groningen gevonden. Rietsema Kersenvormen p. 216.  
Bloei laat. Bestuiving niet nagegaan. Kleine boom, vruchtbaar. Vrucht klein, aanmerkelijk meer breed dan hoog, zeer week, scherp zuur, granaat- of bloedrood. Juli-Augustus. Keuken of fabriek. Gezond. Zand en klei.

|                              | I | II | III | IV | V | VI |
|------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Early Rivers . . . . .   | — | o  | o   | o  | x | x  |
| 2 Variksche . . . . .        | — | o  | o   | o  | x | —  |
| 3 Mierlosche . . . . .       | — | o  | o   | o  | x | —  |
| 5 Klerk . . . . .            | x | o  | o   | o  | x | —  |
| 7 Udensche Spaansche . .     | — | o  | o   | o  | x | x  |
| 8 Drogans . . . . .          | x | o  | o   | o  | x | —  |
| 9 Abbessie . . . . .         | — | o  | o   | o  | x | x  |
| 10 Meikers . . . . .         | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 11 Morel . . . . .           | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 21 Mansfeld . . . . .        | x | o  | —   | —  | x | —  |
| B 12 Zwarte Spaansche . . .  | — | o  | o   | o  | o | x  |
| 13 Elton . . . . .           | — | o  | o   | o  | x | o  |
| 15 Dikke Loen . . . . .      | o | o  | o   | o  | o | x  |
| 16 Hollander . . . . .       | x | o  | o   | o  | o | o  |
| 17 Zoete Morel . . . . .     | x | o  | o   | o  | o | o  |
| 18 Eierkriek . . . . .       | x | o  | o   | o  | o | o  |
| 19 Kentish . . . . .         | — | —  | —   | x  | x | x  |
| 20 Westerleesche . . . . .   | — | —  | x   | —  | o | o  |
| 32 Knolkers . . . . .        | x | o  | x   | x  | x | —  |
| C 22 Beeksche Late . . . . . | — | o  | —   | o  | x | —  |
| 23 Molen . . . . .           | — | o  | —   | o  | x | —  |

x = geschikt, o = ongeschikt. — = weinig ervaring.



## Kers, Mispel

|                         | I | II | III | IV | V | VI |
|-------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| 24 Wilhelmina . . . . . | — | o  | —   | o  | x | —  |
| 27 Löhnis . . . . .     | — | o  | —   | o  | x | —  |
| E Koningskers . . . . . | — | —  | —   | —  | x | —  |

De Rijkstuinbouwconsulent te Groningen raadt aan in het Noorden de kersen van sortiment A te beproeven. Wellicht zijn 2, 3, 5 met 10, 11, 32 het meest aan te bevelen.

## KRUISBES.

### A

- 2 **Crown Bob.** Lentsche Blonde (in de omgeving van Nijmegen beduidt blond paars). Vóór 1825 in Engeland gewonnen door een zekeren Melling of Milling. Maurers Stachelbeerenbuch, p. 80. Gekl. pl. Groeiwijze iets overhangend. Vruchtbaarheid voldoende. Bes groot, roodbruin tot zeer donker purperrood, dun borstelig behaard, dun van huid, langwerpig, vaak iets scheef, goed tot zeer goed van smaak, tamelijk laat rijp. Tafelbes. Weinig ziekte. Het blad is meer omlaag gebogen dan bij No. 1. Verdraagt geen Californische pap. Wordt voor Groningen niet aanbevolen.

### A

- 3 **Early Sulphur.** Ruige Gele, Früheste Gelbe, Yellow Lion, Tidlige Gule, Golden Drop (falso). Gewonnen door Ward in Engeland en in 1825 in den handel gekomen. Maurers Stachelbeerenbuch p. 246. Gekl. pl. Krachtig, opgericht groeiende, dichte, doornige struik. Vruchtbaarheid middelmatig. Bes klein, mat, bleek goudgeel, dun van huid, dicht en lang borstelig behaard, iets langwerpig, zeer goed van smaak, vroeg rijp. Tafel, keuken. Gekenmerkt door ruige bladeren. Verdraagt geen Californische pap. Wordt voor Groningen niet aanbevolen. Veel plukarbeid.

### A

- 1 **Whitesmith.** Engelsche Witte, Groot-

## Kruisbes

vruchtige Eng. W., Weisse Triumphbeere. Gewonnen door Woodward of Woodman in Engeland, reeds vóór 1817. Maurers Stachelbeerenbuch 1913, p. 332, Gekl. pl. Groei gewoon. Zeer vruchtbaar. Bes groot, bleek, iets geelachtig groen, doorschijnend met enkele roode vlekjes, fijn donzig behaard, dun van huid, iets langwerpig, zeer goed van smaak en midden-tijds rijp. Fabriek of tafel. Weinig ziekte. Veel partijen Wh. zijn gemengd met andere kruisbessen. Verdraagt Californische pap.

### B

**Whinham's Industry.** Industry, Rote Triumphbeere. Naar het heet, is deze bes rond 1835 gewonnen in Schotland door R. Whinham te Morpeth, Northumberland. Eerst rond 1885 wordt er meer algemeen aandacht aan geschonken. Maurers Stachelbeerenbuch Gekl. pl. Groei krachtig. Rijkdragend. Bes middelmatig vroeg, groot, rood; korte, vilte beharing en schaarsche lange borstels. Smaak goed. Door het snelle aanzwellen der jonggeschapen vruchtjes bruikbaar voor zeer vroegen pluk. Ook zeer goed voor tafelgebruik. Amerikaanse meeldauw. Verdraagt slecht Californische pap. In veel kweekerijen niet echt; vaak verwisseld met Crown-bob, die echter in tegenstelling met W.I. aan de bovenzijde kale bladeren heeft.

|                           | I | II | III | IV | V | VI |
|---------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Whitesmith . . . . .  | x | x  | x   | x  | x | x  |
| 2 Crown Bob . . . . .     | x | x  | x   | x  | x | o  |
| 3 Early Sulphur . . . . . | x | x  | x   | x  | x | o  |
| B 8 Winham's . . . . .    | x | x  | x   | x  | x | x  |

x = geschikt, o = ongeschikt, — = weinig ervaring.

## MISPEL.

Teelt van weinig belang. De zoogenaamde Hollandsche Reuzenmispel is vaak een klein, moeilijk verkoopbaar ding.

Wie een goeden mispel wil kweken, neme enthout van den standaardboom proeftuin Breda. De naam is ook Hollandsche Reuzenmispel.

## **Fruittelers!      Doet Uw voordeel!**

Groote voorraad **VRUCHTBOOMEN** op East Malling Typen enz.

Hoogste kwaliteit, laagsten prijs, onder plombe en certificaat N.A.K.

**Kerngezond, ten volle gegarandeerd.**

40-jarige ervaring, deskundige voorlichting.

Wetenschappelijke ontwerpen.

**Aanleg van Boomgaarden** • Bezoekt onze uitgestrekte kweekerijen



KONINKLIJKE BOOMKWEKERIJEN

**PIERRE LOMBARTS - ZUNDERT**

Hofleverancier van H.M. Koningin Wilhelmina en Z.M. Ex.-Koning Alphons XIII v. Spanje

Tel. No 4



## **Geldersche fruitkweekers!**

Uw voordeeligste adres voor:

**Kopersulfaat 25 proc.**

**Sproeikalk**

**A.S.F. korrels**

en alle andere Kunstmeststoffen is

**DE ARNHEMSCHE KUNSTMESTHANDEL**

Korenmarkt 19a/b - Telefoon 22125

**A R N H E M**

## Moerbeï, Okkernoot

### MOERBEI.

De moerbeï voor fruitproductie is *Morus nigra*. De boomkweekers leveren, zonder het te weten, wel de *Morus alba*, die slechts voor zijderupsen waardevol bezit. De *nigra* is in den winter aan het zware hout goed kenbaar. Zie Schneider *Dendrologische Winterstudien*.

### OKKERNOOT. WALNOOT. NOOT.

Het is tot heden gebruikelijk geweest, de noten van zaad te kweken. Waarschijnlijk zullen binnen eenige jaren geente notebomen in den handel zijn. Zoolang dat niet het geval is zaaien men prima noten van gezonde en vruchtbare boomen. Men denke eraan, dat de noten wel niet geheel zaadvast zijn, doch dat niettemin slechte eigenschappen leelijk overerfelijk kunnen zijn. En dat is zeker, dat het goedkoopst is de goede noten te veilen en de kleine te zaaien dan andersom. Een vertrouwd adres is dus raadzaam!

### PEER.

Het succes met perenboomen te behalen wordt vooral beheerscht door twee vragen: die van onderstam en die van de peer zelf. Men lette op hetgeen over peeronderstammen is gezegd.

#### B

- 42 **Belle Lucrative.** Bergamote Lucrative, Esperens Herrenbirne, Seigneur d'Espere, Esperens Herrepäron. Belgische of Fransche peer van onbekende herkomst; Nederl. Boomgaard gekl. plaat. Pollen goed. Zeer goede bestuiver voor andere peren. Kan met eigen stuifmeel, vermoedelijk parthenocarpisch, goede oogsten leveren. Boom van slechts matige grootte doch van uitstekende vruchtbaarheid (beurtjaren) en meestal tevens gezond. De vrucht is tamelijk klein en door de roestachtige, bruine tint ook niet oogelijk, smaakt echter zeer goed. Rijpt in September-October. Voor den particulier een der beste peren, voor den handel slechts daar, waar de markt in het volle perenseizoen niet overvoerd wordt.

#### C

- 32 **Beurré Alexandre Lucas.** A. L. Butterbirne. Rond 1870 in een bosch te Blois (Fr.) gewonnen. In 1874 in den handel gekomen. Deutschlands Obstsor-

## Peer

Bloei zeer vroeg. Zelfsteriel. Bloeit gelijktijdig met Bonne Louise, met Hollandsche Zomervijg, Précoce de Trévoux en Conseiller à la Cour. Boom flink. Vruchtbaarheid verschillend. De schrijver heeft slechte ervaringen. Elders, naar men bericht, beter. Vrucht groot, korte peervorm, groen, geel wordend, goed van smaak en handpeer voor December. Gezond en windvast. Onderstam peer. Wellicht met tusschenveredeling ook wel kweek. Heet op eigen wortel vruchtbaar, hetgeen echter van andere zijden niet wordt bevestigd. Struik. Klei en zand.

#### B

- 16 **Beuckes Butterbirne.** Beurré Beucke. Vermoedelijk Duitsch. Voor het eerst beschreven 1887. Deutsche Obstbauzeitung 1917 p. 332. Pollen goed. Matig groote boom van groote vruchtbaarheid. Korte, vaak onregelmatige peervorm, aan het steeleind stomp, middelmatig groot, groen, later geel, veelal blos, eenig roest, redelijk goed als handpeer voor September. Weinig duurzaam. Smaak best. Kroonboom of Struik. Windvast, zeer gezond. Vroeg plukken.

#### B

- 25 **Beurré d'Amanlis.** Ruim een eeuw geleden ontstaan nabij Rennes (Fr.). Pollen slecht. Gezonde en vruchtbare peer, die in het algemeen van een buitengewoon slechte kwaliteit pleegt te zijn. In Zeeland wordt zij aangeraden, o.m. als spil tusschen 4 of 6. Lijdt veel onder schurft en kanker.

#### B

- 20 **Beurré Clairgeau.** Clairgeau's Butterbirne. Fransche peer van 1848. Diploid. Pollen goed. Boom klein, zeer steil groeiend. Vrucht langwerpig, middelmatig tot groot. Groen met blos. Smaak matig tot slecht. Handpeer van minderen rang. Geeft plaatselijk echter voldoening. November. Struik. Veelschurft. Dankbaar voor bespuiting. Beschutting raadzaam. Vooral in het Zuidwesten des lands aangeraden. Kan in het koelhuis slechts 4 tot 6 weken worden bewaard. Bij rijpheid voor verzending te week.

#### A

- 5 **Beurré Hardy.** Poire Hardy, Gellerts Butterbirne, Beurré Gellert. Fransche peer, gewonnen door Bonnet te Boonen aan Zee. In den handel gebracht door J. L. Jamin te Bourg la Reine (Seine).

## Peer

Deutschlands Obstsorfen. Gekl. pl. Zelffertiel. Diploid. Pollen goed. Kan worden bestoven door No. 11, No. 4 of Lectier. Boom groot, laat dragend. Later goed vruchtbaar. Vrucht groot tot zeer groot, groengeel, bijna geheel met bruin roest overdekt. Tamelijk korte peervorm. Goede, bij te vroegen oogst slechts matig goede handpeer, die tot in October reikt. Kroonboom of struik. Verdraagt kwee. Schurft en Monilia. In de rivierkleistreken niet aanbevolen. Overigens op klei of zand beide. Matig windvast. Wordt door de districten III en V met voorbehoud aanbevolen. Het is een peer voor het Zuiden des lands. Kan geruimen tijd worden gekoeld; verdraagt geen bewaring liggende op hout of karton.

## C

- 40 **Beurré Lebrun.** In 1856 gewonnen door den Heer Gueniot, kweeker te Troyes in Frankrijk. Pollen goed. Vooral goed dragend met 4 en 6. Een wel vruchtbare tot zeer vruchtbare en heel groote peer, doch door den muskussmaak van mindere qualiteit als handpeer. Bij vroeg plukken is de muskussmaak minder sterk. Voor den inmaak is inmiddels juist de muskussmaak van groote waarde. Struik of stamboom. Weinig schurft.

## B

- 21 **Beurré Superfin.** In 1844 gewonnen door Goubault te Millepieds bij Angers en 2 jaar later in den handel gebracht. Matig groote en middelmatig vruchtbare peer. Vrucht kort peervormig, vleezige steel. Smaak tamelijk goed. October. Struik op kwee voor klei. Groeit dan echter slecht.

## B

- 31 **Bonne d'Ezée.** In 1838 gevonden te Ezée bij Loches (Indre et Loire). Handpeer voor September. Zeer vruchtbaar. Onregelmatig gevormde vrucht. Smaak zeer goed.

## A

- 7 **Bonne Louise d'Avranches.** Gute Luise von Avr. Louise bonne of Jersey. Normandische peer, gewonnen door de Longueval te Avranches. Droeg voor het eerst rond 1780—1788. Deutschlands Obstsorfen. Gekl. pl. Bloeit vroeg. Zelfsteriel, doch met neiging tot parthenocarpische vruchtzetting. Diploid. Pollen goed. Bestuift No. 32. Kan zelf

worden bestoven door 10 en 39. Intersteriel met No. 18.

Boom matig, zeer vruchtbaar. Vroeg dragend. Vrucht middelmatig groot, peervormig, donker groen, later geelgroen met bos. Een der allerbeste handperen voor September, tot in October toe. Goed voor compôte. Staat graag warm, doch in verband met schurftgevaar niet al te beschut. Vraagt zorgvuldige schurftbestrijding. Struik. Verdraagt kwee. Zand en klei. In district III en de ruwere gedeelten van I slechts als leiboom op kwee. Kan geruimen tijd in koelhuis vertoeven.

## A

- 1 **Brederode.** Herkomst onbekend. De bij Knoop en Jahn (III. Handb. VII p. 353) vermelde „Brederode” is niet deze. Waarschijnlijk vroeg 19e eeuwse peer. Bloeigegevens geen. Boom groot, vruchtbaar, een enkele maal echter minder goed. Vrucht middelmatig, op kwee groot, meer breed dan hoog, groen met roest, weinig of geen bos. Winter tot in Mei. Goede stoofpeer. Weinig ziekte. Meestal windvast. Kroonboom of struik of peer. In Friesland niet aanbevolen. Naast de algemeene Br. bestaat een zoetere, die iets in vorm en twijgkleur afwijkt en waaromtrent het voorloopig oordeel der ooftkweekers zeer gunstig is, zoodat deze zoete Br. in de streken, waar zij bekend is, de voorkeur heeft boven de andere.

## B

- 19 **Calebasse de Tirlemont.** Gewonnen in de vorige eeuw, waarschijnlijk tusschen 1860 en 1880 bij Tienen (= Tirlemont) in België. Zie H. de Greeff: Onze Appels en peren, 4e serie. Matig groote boom, meestal vroeg en rijk dragend. Vraagt vrij zeker vreemd stuifmeel. Vrucht zeer groot, lang, wat onregelmatig en bultig, geheel bronskleurig. Goede handpeer voor October-November. Struik op peer. Wordt in Friesland aanbevolen tot het omenten van oudere boomen. Gezond. Beschutting.

## A

- 4 **Clapp's Favourite.** Clapp's Favorite, Clapp's Liebling, Favorite de Clapp. Vóór 1860 gewonnen door Th. Clapp te Dorchester Mass. Ver. Staten. Deutschlands Obstsorfen. Gekl. pl. Pollen goed; diploid; bestuiver voor Dr Jules Guyot. Een goede bestuiver voor

## Peer

Clapp's is ook, omgekeerd, Dr J. Guyot. Volgens Rawes (Journal R. H. S. LVIII p. 293) veel behoefte aan vreemd stuifmeel; bij oudere boomen minder. Boom groot en aanvankelijk wat onvruchtbaar. Later rijkdragend. Vrucht groot, fraai peervormig. Groen of groengeel met bos, weinig roest, meestal zeer matig van smaak, echter wel sappig. In sommige zomers is de smaak iets beter. Zuinige tot matige handpeer. Kroonboom. Niet rechtstreeks op kwee. Matig, soms echter sterk vatbaar voor schurft. Gaarne beschutting. Op sommige zandgronden is de smaak buitengewoon flauw. Vroeg plukken met het oog op beurschheid. Bij koeling vaak smakeeloos; langer dan 4 à 6 weken bewaren niet raadzaam.

## A

- 14 **Comtesse de Paris.** Gräfin von Paris. Fransche peer, gewonnen door den kweeker Tourcine te Dreux tegen 1882. Catalogue descriptif 1927 p. 239. Duitslands Obstsorfen. Gekl. pl. Pollen goed. Gaarne vreemd stuifmeel, b.v. No. 7. Boom klein tot matig groot, vroeg en buitengewoon vruchtbaar. Peer middelmatig tot groot, lang peervormig, bleekgroen met veel roest. Bij zeer laat plukken en koud bewaren een behoorlijk goede handpeer, soms tot in Januari, doch bij te vroegen oogst en ook op een te koude standplaats en op peer geënt als handpeer wel eens ongenietbaar. Struik op peer of kwee. Warme standplaats. Gezond. Zand en klei. Flink snoeien. In Noord-Holland, Friesland en Groningen ontraden. Bruikbaar voor het koelhuis.

## A

- 39 **Conference.** Engelsche aanwinst van vóór 1885 en in 1894 door den winnaar, het kweekershuis Rivers, in den handel gebracht. Bunyard Handbook of Hardy Fruits. Diploid. Pollen goed. Zelffertil. Boom matig groot, buitengewoon vruchtbaar. Middelmatig groot, langwerpig, groen, geel wordend, roestig. Tamelijk goed als handpeer voor October/November. Struik op peer. Gezond.

## E

**Désiré Cornelis.** Dr. Cornelis, Dr. Célestin. Belgische peer, gewonnen door van Mons; droeg in 1847 na het overlijden van den winner. Leroy Dict. Pom., de Greeff: Onze Ap-

pels en Peren 1e serie. Boom van matige groeikracht en normale vruchtbaarheid. Vrucht middelmatig tot groot, van vorm ongeveer als Beurré Diel, doch korter gesteeld. Kleur geel, soms met eenigen bos. September. Goede handpeer.

De variëteit is weinig bekend. In Friesland aanbevolen.

## B

- 27 **Doyenné Boussoch.** Beurré de Mérode, Philippe Double, Dubbele Flip, Doppelte Philipsbirn, Doppelt Philip, Merodespáron, Filip. Belgisch. Vermoedelijk door van Mons begin 19e eeuw gewonnen. Duitslands Obstsorfen. Gekl. pl. Bloei middelmatig vroeg. Pollen slecht. Boom groot en vruchtbaar. Zelffertil. Vrucht kort, nadert tot bergamoten vorm. Geelgroen met veel roestspikkels en weinig of geen bos. Matig goede tafelppeer. Korrelig vleesch. September. Kroonboom. Geringe tot matige, op natten grond tot sterke schurftaantasting. Windvast. Wordt slechts in regenarme streken aanbevolen. Kan waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven wegens den prijs, die meestal ver beneden dien van andere peren blijft. Kan geruimen tijd in het koelhuis worden bewaard.

## B

- 24 **Doyenné d'Alençon.** Dechantsbirne von Alençon. Gewonnen door iemand te Alençon, rond 1840 in den handel gebracht door een boomkweker aldaar. Pollen goed. Kleine, vruchtbare boom. Korte, peervormige vrucht, geel met roest en luttel bos. Vleesch smeltend. Handpeer voor den winter. Vroeg bloeier.

## A

- 8 **Doyenné du Comice.** Vereins Dechantsbirne. Gewonnen door den tuinbouwbond te Angers. Droeg voor het eerst in 1849. Leroy Dictionnaire de Pomologie II 1869 p. 61. Boom matig of tamelijk groot. Wat traag en slechts middelmatig, soms zelfs slecht vruchtbaar. Bloeit laat. Pollen goed. Diploid. In Zweden bleek Nouveau Poiteau een der beste bestuivers; hier wellicht ook. Middelmatig tot groot, peervorm zonder insnoering, groen later geelgroen met veel roest, soms wat bos. Goede tot buitengewoon goede handpeer voor October tot in November. Struik of

BOOM- EN ROZENKWEKERIJ

**J. A. KRUIP**

**LICHTENVOORDE**  
**TELEFOON 76**

---

Vruchtboomencultuur onder contrôle van de Ned. Alg. Keuringsdienst N.A.K.

Groote voorraden hoogst.-, struik- en leivorm in de meest gevraagde soorten op wild- en onderstamtypen.

Van boomen uit onze kweekerij op zandgrond met prachtig wortelgestel, is goede groei steeds gegarandeerd, zelfs op de schraalste gronden.

Stam-, struik-, klim, en treurrozen, alles op bottel en canina Bessen, ligustrum, sier- en laanboomen.

**J. MAARSE - SCHELLINKHOUT**  
**VRUCHTENKWEKERIJ „ARBEID”**



biedt aan grote partij **Fay's New Prolific-Stek** onder contrôle der N.A.K. ● Prijs per correspondentie enthout nieuwe appel „Schellinkhouter”.

## Peer

in het Zuiden wellicht kroonboom. Verdraagt kwee. Waar de grond het toelaat wellicht bij voorkeur kwee. Weinig schurft. Windvast. Smaakt op klei vaak aanmerkelijk beter dan op zand. De hoge prijs moet het mindere gewicht vergoeden. In het Noorden des lands nog weinig bekend. Men kieze enthout van goede boomen. Vruucht kan geruimen tijd in koelhuis vertoeven.

## A

- 10 **Emile d'Heyst**. Gewonnen door Majoor d'Esperen te Mechelen. Droeg voor het eerst in 1847 (het sterfjaar van den winner). Genaamd naar Emile Berckmans te Heyst op den Berg. Leroy Dictionn. de Pom. II 1869 p. 131. Volgens Rawes kruisbestuiving noodig. Of het pollen bruikbaar is? Boom matig groot, zeer vruchtbaar. Vruucht matig groot, peervormig, dik aan het steeleinde, groen of geelachtig met veel roest. Goed van smaak. Handpeer voor November. Gezond. Windvast. Struikvorm. Kwee wordt niet aangeraden. Zand en klei. Nogal vatbaar voor schurft hier en daar.

## C

- 36 **Eva Baltet**. Gewonnen door P. Tomasse te Béarn, Frankrijk, rond 1890 in den handel gebracht door het kweekershuis Baltet te Troyes. Deutsche Obstbauzeitung 1917 p. 333. Pollen goed. Flinke boom, tamelijk vroeg dragend. Vruuchtbaarheid nog onvoldoende nagegaan. Peer groot, korte peervorm, groen, later geel met flinken blos, fraai, goed als handpeer. October. Gezond. Verdraagt kwee.

## A

- 11 **Fondante de Charneu**. Köstliche von Ch., Merveille de Ch., Lézipont, Leopold (falso). Belgisch. Rond 1800. Gewonnen door den Heer Lézipont en reeds vroeg gekweekt te Charneu bij Luik. Leroy. Dictionn. de Pomologie II 69 p. 170. Pollen goed. Kan worden bestoven door No. 5, No. 18 of Lectier. Boom tamelijk groot, smal en zeer hoog. Vruuchtbaar en reeds vroeg dragend. Vruucht middelmatig groot, naar de kelk toegespitst, groen met vaak wat blos en eenig roest, peervorm, behoorlijk van smaak en tamelijk goede tafelpaar voor September-October. Kroonboom of struik. Verdraagt kwee, vermoedelijk echter niet alle kweerasen. Soms schurft. Wind-

vast. Zand en klei. Goed voor koelhuis. In Zeeland nog niet voldoende beproefd.

## E

**Forellenbirne**. Oude Duitsche peer uit Halle en daar rond 1800 door Büttner gewonnen. Pollen slecht. Wanneer de vrucht gezond is, is deze peer zeer fraai. Echter uiterst vatbaar voor schurft en daarom in Duitschland niet aanbevolen. Late herfst.

## B

- 41 **Gieser Wildemanspeer**. Nabij Gorinchem gewonnen door den Heer Wildemans en door een Boskoopsch kweekershuis, v.d. Willik en Zonen, in den handel gebracht. Midden vorige eeuw. Ned. Flora en Pomona. Gekl. pl. Boom tamelijk klein. Vruuchtbaar. Vruucht tamelijk klein, geel met veel roest en blos. Zeer goede stoofpeer tot ver in de lente. Struik of kroonboom. Gaarne beschutting. Vatbaar voor neusrot, op natten grond schurft en vatbaar voor *Agrilus* en daardoor een gevaar voor andere pereboomen. Klei en zand. Zelffertielt.

## E

**Gratioli of Jersey**. Oude peer van de Kanaaleilanden, waar in 1843 nog slechts één enkele boom — de eerste vermoedelijk — van deze verscheidenheid aanwezig was. Leroy Dict. de Pomologie. Bloeigegevens geen. Vruuchtbaar en voor hoogstam wel aanbevolen. Middelmatic groote, geel gekleurde peer met wat roestplekjes. De rijpingstijd is September-October. Goede handpeer.

## B

- 22 **Jut**. Poire Yat. Gute Graue. Grâpâron. Dubbele Jut. Koningsjut. Middeleeuwsche, vermoedelijk Nederlandsche peer. Pollen slecht. Bij een oriënteerende bestuivingsproef te Breda gaven Beurré Giffard, B. Beucke, Triomphe de Vienne goede vruchtzetting, Beurré Hardy, Noordholl. suikerp., Zwijndr. Wijnpeer daarentegen geen of slechte vruchtvorming. Boom zeer groot, doorgaans niet te vruchtbaar. In Zuid-Limburg echter wel goed dragend. Vruucht klein, peervormig, bronskleurig. Zeer goed als handpeer en voor compôte. Dubbele Jut en Koningsjut zijn vrij zeker te beschouwen als selecties uit Jut, die wellicht wat gezonder zijn. Naast elkaar geplant op denzelfden onderstam gaan de gewone Jut en de verbeterde weer op elkaar

## Peer

gelijken als enten van één boom. Kroonboom. In veel streken schurft. De Jut is een poging met moderne hulpmiddelen waard om in eere te worden hersteld. De prijs is namelijk goed.

## B

- 29 **Kleipeer.** Winterjan, Wintersuikerpeer, Steenjut, Kievitspeer, Spekpeer, Weldrager, Brittenpeer, Mandjespeer, Jan Groospeer. Zeker meer dan 200 jaar oud. Waarschijnlijk Nederlandsch. Van Noort Pom. Batava. Beschrijving vruchtsoorten 1e Reeks 1862 p. 60. Bloei tamelijk vroeg. Zelffertiel. Boom klein, vroeg en zeer rijkdragend. Peer klein, korte peervorm, groen, later geel met roest. Goede stoofpeer tot laat in de lente. Struik op peer of kroonboom. Zeer windvast. Heeft veel last van Agrilus en moet daarom ver van andere peren worden geplant. Verliest veel terrein, doch kan nog niet in alle opzichten worden vervangen door Brederode en Saint Rémy. Vooral de zoogenaamde Dubbele Kleipeer of Spekpeer zou zeer goed zijn.

## E

**Leon Ponçaint.** Herkomst onbekend. Draagt ook zonder vreemd stuifmeel. Bloei middentijds. Steile, eenigszins slappe groei. Rijkdragend. Geen beurtjaren. Ronde, betrekkelijk kleine, zeer smakelijke vrucht, die vlak na Clapp's rijpt. Kan eenigen tijd duren. Zaailing-onderstam. Weinig ziekte. In Friesland aanbevolen.

## B

- 26 **Maagdenpeer.** Nederlandsche peer, waarschijnlijk uit de eerste jaren van de 19e eeuw. Van Noort, Pomologia Batava. Bloei laat. Boom groot, goed dragend, doch een enkele maal onvoldoende. Vrucht matig groot, kort peervormig, geheel bronskleurig, matig van smaak. Handpeer van minderen rang voor Sept.-Nov. Kroonboom. Lijdt aan bladrandverkleuring en vroegen bladafval. Weinig schurft. Wordt door de meeste medewerkers ontraden. In Zeeland echter aanbevolen. Kan waarschijnlijk niet gehandhaafd blijven wegens de lage prijzen. Vraagt beschutting. Naast de gewone Maagdenpeer komt ook een late „Maagdenpeer” voor, die ook als Kraaipeer en Henegouwer bekend staat; het is een slecht gerenommeerde variëteit.

## L

- 43 **Madame Treyve.** Souvenir de Madame Treyve. In 1858 gewonnen door den Heer Treyve, boomkweker te Trévoux (Ain). Deutschlands Obstsornten. Gekl. pl. Boom niet groot; vroeg en rijk dragend. Zonder vreemd stuifmeel goed vruchtbaar. Vrucht tamelijk groot; groen of geel. Smaak zeer goed. Week en voor verzending niet bijzonder geschikt. Weinig ziekte. Aanbevolen in Groningen. Ook in district V goed gedijend.

## A

- 9 **Marguërite Marillat.** In 1874 gewonnen door den kweker Marillat te Villeurbanne bij Lyon. Catalogue descriptif. 1927 p. 304. Bloeit laat. Volgens Rawes l.c. zelffertiel. Diploid. Pollen slecht. Kan, naar het heet, worden bestoven door No. 8, 18, 39 en Dr. J. Guyot. Matig groote boom; groei steil; draagt wat laat, doch dan voldoende vruchtbaar. Vrucht zeer groot, variabel van vorm, meestal lange peervorm met dwarsstaanden steel, geel met fraaiën blo; goede tot zeer goede handpeer voor September. Struik; kwee wordt afgeraden. Zeer gezond. Matig windvast. Boom eischt stutten. Wordt in Zeeland afgeraden. Zand en klei. Geen kwee.

## E

**Nec Plus Meuris.** Beurré d'Anjou. In 1822 door van Mons gewonnen. Leroy Dict. de Pomologie II 1869 p. 460. Matig groote boom. Vrucht tamelijk groot, bleek groengeel met luttel blo. Smaak zeer goed. Of deze peer voor ons land geschikt is, weet men niet. Vroegere kennismaking moedigt niet aan. Misschien echter, dat de tegenwoordige ziektebestrijding en bemesting er iets van maakt. Nov.-Januari. Goed voor koelhuis.

## A

- 15 **Nouveau Poiteau.** Neue P. Belgische peer, gewonnen door van Mons. Droeg voor het eerst in 1843. Deutschlands Obstsornten. Gekl. plaat. Bloei laat. Diploid. Pollen goed. Vrij zeker een goede bestuiver voor Doyenné du Comice. Boom matig groot, vroeg en buitengewoon vruchtbaar. Vrucht peervormig met eigenaardigen onregelmatigen top. Groen-geel met roest en in sommige streken luttel blo. Vleesch zeer zacht en smeltend, smaak vaak heel flauw, bij



## Peer

minder goeden oogst en zonnig weer beter, vooral op klei. Snel buikziek. Matig goede handpeer voor November. Struik of peer of kwee. Gezond. Windvast. Voor Zeeland niet aanbevolen.

## B

- 28 **Oomskinderpeer.** Kruidenierspeer. Waarschijnlijk Zuidhollandsche aanwinst rond het midden der vorige eeuw. Zou door de familie Kruidenier nogal verspreid zijn. Bloeit laat. Boom groot en zeer laat vruchtbaar. Zelfs grootere boomen dragen soms slechts matig. Schurft. Vrukt klein, kort, bijna bergamote vorm, geel, matig lange steel, goed als handpeer. Augustus. Kroonboom. Ringworm. Windvast. Wordt bijna overal afgeraden. In Noord-Holland en Groningen aanbevolen.

## B

- 12 **Pitmaston Duchess.** Williams Duchess. De oorspronkelijke naam „Pitmaston Duchesse d'Angoulême" is reeds vroeg door Hogg losgelaten. Deutschland, Obstsorten. Gekl. pl. Gewonnen door Williams te Pitmaston bij Worcester rond 1865. Bloei laat. Triploid. Pollen slecht. Kan worden bestoven door No. 39. Gedeeltelijk zelffertil. Vruchtbaar. Vrukt middelmatig groot tot zeer groot, groen, later fraai geel met roest bij steel. Geen blos. Peervormig, iets rinsch of wrang, vooral op kwee. Goede tafelppeer voor October. Struik op peer of kwee. Grootte boom, breed groeiend. Vraagt beschutting. Druipt. Rot vaak op den boom. Soms schurftig. Zand en klei, geen natte grond. Wordt slechts in de kustprovincies (echter met uitzondering van Friesland) aanbevolen.

## A

- 3 **Précocé de Trévoux.** Frühe von Trévoux. Fransche peer, voor het eerst vermeld. in 1862. Gewonnen door den kweker Treyve te Trévoux (Ain). Catalogue descriptif 1906 p. 328, 1927 p. 327. Bloeit vroeg. Parthenocarpie! Pollen goed. Boom matig tot klein. Zeer vruchtbaar. Vrukt middelmatig groot, groen, later geel met eenigen blos, peervormig, stomp bij steel, iets wrang, goede tafelppeer voor midden Augustus. Kroonboom of struik op passenden grond rechtstreeks of middellijk op kwee. Vraagt bespuiting tegen schurft. Bijna onvatbaar voor nachtvorstschade. Windvast. Dunnen. Zand en klei, doch

geen te koude grond. Rijpt in sommige streken voor den handel iets te laat. Kan worden gekoeld.

## E

**Provisiepeer.** Door G. A. van Rossum te Naarden in 1916 gewonnen. In 1931 bekrond en beschreven in 1932 Maandbl. Ned. Pom. Ver. p. 96. Matig groote boom. Waarschijnlijk goed vruchtbaar. Peer middelmatig groot, roestbruin, goed als stoofpeer voor herfst en winter, tot in de lente toe.

## A

- 2 **Saint Rémy.** Volgens sommigen Bellissime d'hiver. Indien dat zoo is, is de peer zeer oud. Waarschijnlijk Belgisch of Fransch. Dufour Arboriculture fruitière 4e dr. p. 564. Bloei vroeg. Flinke, vruchtbare boom. Vrukt middelmatig of boven middelmaat, peervormig, stomp bij den steel. Zeer goede winterstoofpeer tot laat in de lente. Weinig ziekte. Gaarne op beschutte standplaats. Kroonboom of struik op peer.

## E

**Sint Walfried.** Gewonnen door den schrijver in 1920. Droeg voor het eerst in 1928. Middelmatig groot, peervormig, groenwit. Knappend vleesch. Handpeer van tweede kwaliteit voor September. Verdraagt den kweeonderstam.

## B

- 44 **Soldat Laboureur.** Soldat Esperen. Die Arenberg, Blumenbachs Butterbirne. Tusschen 1817 en 1820 gewonnen door den Belgischen Majoor Esperen. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Groei zwak, vroeg en regelmatig vruchtbaar. Bloei vroeg; weinig last van nachtvorst. Bestuivingseischen vermoedelijk zeer gemakkelijk. Vrukt klein tot matig groot, groen of geelgroen. Zoet, op sommige gronden steenachtig. Tweede deel van den herfst. Veelal sterk vatbaar voor schurft. Slechts voor Noord-Holland aanbevolen.

## B

- 30 **Souvenir du Congrès.** Andenken an den Kongress. Gewonnen door Morel te Lyon-Vaise. Droeg voor het eerst in 1863. Zie Gauchers Pomologie No. 28. Gekl. pl. Pollen dubieus. Zou echter weinig behoefte aan vreemd stuifmeel hebben. Matig groote boom van goede vruchtbaarheid. Vrukt groot tot zeer groot, onregelmatige, lange peervorm,



Hof-  
leverancier

WETENSCHAPPELIJK SELECTIEBEDRIJF  
**D. J. VAN DER HAVE**  
**KAPELLE-BIEZELINGE**

Aanleg van Boomgaarden en Fruituinen - 80 ha in cultuur

**FRUITBOOMEN** in de meest gewenschte vormen en  
soorten, veredeld op de geschikte onderstammen en van  
goedgekeurde moederboomen.

**BESSENSTRUIKEN**

Alles onder contrôle N.A.K.

**Beschrijvende prijscourant op aanvraag**

**AARTS**

**BOXMEER**

TELEF. 81

**MASSA**

**VOORRAAD**

**OP**

**TYPE**

**I**

**II**

**IV**

**IX**

**XIII**

**XVI**

**VRUCHTBOOMEN**

**ONDER CONTROLE N.A.K.**

**OP KWEE**

**A**

**C**

**ENZ.**

## Peer

wat dik bij den steel, fraai geel met blos. Smaak goed, behoudens niet zelden muskus-bijsmaak. Bruikbare handpeer voor September-October. Struik, niet op kwee. Beschutting raadzaam; wil goed ontwaterden grond en een warme standplaats. Schurft.

## E

**Sucrée de Montluçon.** In 1812 in den schooltuin van het college te Montluçon (Allier) door den Heer Rochet, tuinman aldaar, gevonden.

Bloeigegevens geen. Groei sterk. Zeer vruchtbaar. Tamelijk groote, betrekkelijk korte, groene, later gele peer met weinig roest. October. Zeer goede tafelpeer. Weinig aan schurft onderhevig. Wordt wel gezegd een „verbeterde Curé” te zijn. De bruikbaarheid in Noord-Frankrijk en Wageningen beide doet onderstellen, dat deze peer ook in Zuid-Limburg, Zeeland en de Zuidelijke zandstreken, alsmede in het rivierkleigebied goed zal blijken te voldoen.

## B

- 6 **Triomphe de Vienne.** Gewonnen door Jean Collaud, bijgenaamd Côte te Montagnon (Isère) in Frankrijk. In den handel gebracht door Cl. Banchet te Vienne (Isère). Deutschlands Obstsorren. Gekl. pl. Volgens Rawes veel behoefte aan vreemd stuifmeel. Een goede bestuiver is Clapp's. Diploid. Pollen goed. Boom wat traag in het dragen. Later vaak wel, doch stellig niet altijd, goed vruchtbaar en de oorzaak dezer onbetrouwbaarheid is niet bekend. Vrucht groot, vaak zeer groot, peervormig, geel met soms veel roest; geen blos. Zeer goede handpeer voor September. Struikvorm op peer. kan ook, met tusschenstam op kwee. Zand of klei. Beschutting. Wordt vaak te vroeg geplukt. Moeilijk te bewaren indien de vrucht rijp is. Kan 4 tot 6 weken in koelhuis vertoeven.

## B

- 18 **Williams Bon Chretien.** Bon Chr. W., Bartlett? Williams Christbirne. Stair's

Pear. Engelsch. Rond 1770 gewonnen door den onderwijzer Stair of Wheeler te Aldermaston, Berkshire. Diploid. Pollen goed. Kan worden bestoven door No. 39, 4 en Dr. Jules Guyot. Is intersteriel met No. 7. Bestuiving voor ons land niet nagegaan. In Engeland zelftiet. Voorzichtigheid echter raadzaam. Boom matig groot, in den regel wel vruchtbaar. Vrucht middelmatig tot groot, peervormig, goudgeel met roest en zeer weinig of geen blos, vleesch zacht, sterk naar muskus smakend. Als handpeer voor velen oneetbaar. In keuken en fabriek zeer goed. Blijft bij koken wit. Struik of kroonboom. Geen kwee. Nogal windvast. Gezond, behoudens in het westen nogal vatbaar voor schurft. Kan goed in het koelhuis worden bewaard.

## B

- 45 **Winterlouwte.** Oude, waarschijnlijk inheemsche peer, die voor het eerst wordt genoemd door van Noort in diens Pomologia Batava. Flinkke boom. Bestuivingseischen niet bekend. Tamelijk kleine, duurzame, langwerpige, groene stoofpeer. Windvast. Enkel voor Noord-Holland aanbevolen.

## A

- 13 **Zwijndrechtsche Wijnpeer.** Oude peer van onbekende herkomst. Zou door Boskoopse kweekers zijn verspreid. Waarschijnlijk dezelfde als door van Noort beschreven is in diens Pomologia Batava. Bloeigegevens geen. Boom middelmatig groot, vroeg en zeer rijk dragend. Vrucht peervormig, matig groot of tamelijk klein, groen met brons en weinig of geen blos, goed tot zeer goed van smaak. Tafelpeer voor October-November, vooral indien niet te haastig geplukt, van goede tot zeer goede kwaliteit. Struik of kroonboom. Niet rechtstreks op kwee. Windvast. Zeer gezond. Zand en klei. Koelhuis!

|                          | I | II | III | IV | V | VI |
|--------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A Stoofperen:            |   |    |     |    |   |    |
| 1 Brederode . . . . .    | — | o  | x   | x  | x | —  |
| 2 Saint Rémy . . . . .   | x | o  | x   | x  | x | x  |
| Handperen:               |   |    |     |    |   |    |
| 3 Trévoux . . . . .      | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 4 Clapp's . . . . .      | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 5 Hardy . . . . .        | x | o  | x   | o  | o | x  |
| 7 Bonne Louise . . . . . | x | o  | x   | —  | x | x  |

Peer

Perzik

|                               | I | II | III | IV | V | VI |
|-------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| 8 Doyenné du C. . . . .       | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 9 Marillat . . . . .          | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 10 Heyst . . . . .            | x | o  | x   | x  | x | o  |
| 11 Charneu . . . . .          | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 13 Zwijndr. Wijn . . . . .    | x | —  | x   | x  | x | —  |
| 14 Paris . . . . .            | x | o  | x   | o  | x | x  |
| 15 Poiteau . . . . .          | x | —  | x   | x  | x | —  |
| 39 Conférence . . . . .       | x | —  | x   | x  | x | —  |
| B 6 Triomphe . . . . .        | o | —  | x   | x  | x | o  |
| 12 Pitmaston . . . . .        | x | —  | x   | —  | o | o  |
| 16 Beuckes . . . . .          | o | —  | x   | o  | o | o  |
| 18 Bon Chrétien . . . . .     | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 19 Tirlémont . . . . .        | — | o  | x   | x  | x | o  |
| 20 Clair geau . . . . .       | o | o  | o   | x  | x | x  |
| 21 Super fin . . . . .        | — | o  | x   | —  | — | o  |
| 22 Jut . . . . .              | — | o  | o   | o  | o | x  |
| 24 Alençon . . . . .          | o | o  | x   | o  | o | o  |
| 25 Amanlis . . . . .          | x | o  | o   | o  | o | o  |
| 26 Maagdenpeer . . . . .      | x | —  | x   | o  | o | o  |
| 27 Boussoch . . . . .         | x | o  | o   | o  | x | o  |
| 28 Oomskind . . . . .         | o | o  | x   | o  | o | o  |
| 29 Kleipeer . . . . .         | o | x  | x   | o  | x | o  |
| 30 Congres . . . . .          | o | o  | x   | x  | o | o  |
| 31 Ezée . . . . .             | o | o  | x   | o  | o | o  |
| 32 Beurré A. Lucas . . . . .  | x | —  | —   | —  | x | x  |
| 41 Gieser Wiedeman . . . . .  | o | o  | x   | o  | o | o  |
| 45 Winterlouwte . . . . .     | o | o  | x   | o  | o | o  |
| 42 Belle Lucrative . . . . .  | x | —  | x   | —  | x | —  |
| 43 Madame Treyve . . . . .    | — | —  | x   | —  | x | —  |
| 44 Soldat Laboureur . . . . . | o | o  | x   | o  | o | o  |
| C 36 Eva Baltet . . . . .     | — | —  | —   | —  | — | —  |
| 40 Beurré Lebrun . . . . .    | — | —  | —   | —  | x | —  |
| E Désiré Cornélis . . . . .   | — | —  | x   | —  | — | —  |
| Leon Ponçaint . . . . .       | — | —  | x   | —  | — | —  |
| St. Walfried . . . . .        | — | —  | —   | —  | x | —  |
| Nec Plus Meuris . . . . .     | — | —  | —   | —  | — | —  |
| Provisiepeer . . . . .        | — | —  | —   | x  | — | —  |
| Forellenbirne . . . . .       | — | —  | —   | —  | — | —  |
| Sucrée de Montluçon . . . . . | — | —  | —   | —  | x | —  |
| Gracioli of Jersey . . . . .  | — | —  | —   | —  | x | —  |

PERZIKEN.

A

- 17 **Alexis Lepère.** In 1876 door A. Lepère, kweeker te Montreuil verkregen uit een Duitsch zaaisel. Rietsema De Perzik. Bloem klein. Bladklier afwezig. Bleek geelgroen met weinig bloes. Steen los. Smaak zeer goed. Meeldauw! In koude serre midden Augustus (n.l.  $\pm$  5-20 Aug.). Voor koude serre.

A

- 3 **Amsden June.** Amsden. Amerikaan, gewonnen door L. C. Amsden te Carthago

Missouri in 1868. Rietsema De Perzik, pag. 8; Schaal Stein und Beerenobst. Gekl. pl.

Bloem groot. Bladklieren rond. Flink bloes op groenwitten grond. Steen hechtend. Buiten eind Juli, koude serre  $\pm$  20 Juni tot 5 Juli, smaak goed, grootte flink. Vruchtbaar. Stook, koud glas, buiten. Een der meest aanbevelenswaardige perziken.

C

- 31 **Belle de Beausse.** Schöne von Beauce. Belle de Beauce. De spelling Beauce berust op een misverstand. In de eerste

## Perzik

helft der 18e eeuw gewonnen door J. Beausse, tuinder te Montreuil. Bloem groot. Bladklier rond. Matige bos op bleek groengelen grond. Steen los. Kloeke vrucht. Smaak zeer goed. Buiten midden September, in koude serre midden Augustus gereed. Perzik voor koud glas.

### A

- 40 **Belle de Doué.** Schöne von Doué. In 1839 te Doué in Frankrijk gewonnen door den Heer Dimas-Chatenay. Met gekleurde plaat afgebeeld door Decaisne in Jardin fruitier du Muséum. Vruchtbare boom. In koude serre 4-15 Augustus. Bleekgeel met lichten bos. Steen los; smaak zeer goed. Bloemen klein, klier rond.

### A

- 23 **Belle Impériale.** Toevalskind in 1861 te Montreuil gevonden. Rietsema De Perzik p. 26. Bloem klein. Bladklier rond. Steen los. Tamelijke bos op geelachtigen grond. Smaak zeer goed. Vruchtbbaar. In koude serre eind Augustus rijp ( $\pm$  19 Augustus tot 1 September).

### E

**Blondeau.** In 1806 door J. Blondeau te Montreuil gewonnen. Rietsema De Perzik p. 25. Bloem klein. Bladklier rond. Flinker bos op groenwitten grond. Steen los. Smaak goed. Vruchtbbaar. Rijp 5-18 Augustus in koude serre.

### E

**Dido van Bijweg.** Rond 1919 gewonnen op het buitengoed Bijweg van B.esse van Ittersum te Bennebroek en in 1924 door het kweekershuis Abbing te Zeist in den handel gebracht. Ik kan van deze perzik nog geen beschrijving geven.

### A

- 5 **Duke of York.** In 1902 in den handel gebracht door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth in Engeland. Rietsema, De Perzik, p. 11. Bloem groot. Bladklieren langwerpig. Flinker bos op bleekgroenen grond. Steen los. Rijpt in koude serre ongeveer tusschen 1 en 20 Juli. Smaak middelmatig. Grootte flink. Zeer vruchtbbaar. Koud, buiten.

### A

- 8 **Duchess of Cornwall.** Gewonnen en in 1901 in den handel gebracht door het kweekershuis Rivers te Sawbridge-

worth onder den naam Duchess of York-later, in verband met homonymie verdoopt. Bloem groot. Bladklier langwerpig.

Maisgeel met weinig bos. Steen los. Smaak zeer goed. In koude serre ongeveer van 5 tot 15 Juli.

### A

- 6 **Dymond.** Engelsche perzik van het kweekershuis Veitch te Exeter en tegen 1863 in den handel gebracht. Rietsema De Perzik p. 17. Bloem groot, bladklier geen. Flinker bos op bleekgroengelen grond. Rijpt tusschen 3 en 20 Augustus in koude serre, buiten vermoedelijk een maand later. Steen los. Smaak goed. Buitengewoon vruchtbare perzik. Koud.

### A

- 19 **Elberta.** Hedrick Cyclopedie. Gewonnen door S. Rumph te Marshallville, Georgia in 1870. Bloem klein. Klier langwerpig. Oranjegeel met matigen bos. Vleesch oranjegeel. In koude serre 20-30 Aug. Vruchtbbaar. Sterke variëteit, die in uiteenlopende omstandigheden goed thuis is. De kleur der vruchten doet deze gemakkelijk verkoopen; bovendien is de vrucht goed bestand tegen vervoer en duurzaam. De smaak is minder nobel dan die van de meeste andere perziken.

### A

- 7 **La France.** Vóór 1887 te Montreuil in Frankrijk gewonnen. Rietsema De Perzik p. 19. Bloem groot. Bladklier rond. Matige bos op groengelen grond. Steen los. Smaak zeer goed. In koude serre van 13-28 Juli rijp. Vruchtbbaar.

### E

**Frau Marie Rudolph.** Zaailing rond 1910 door Prof. F. Rudolph te Kötzschenbröda-Niederlössnitz gewonnen. Rudolph Pfirsichbaum. Rijpt in koude serre medio Juli. Vrucht groot, maisgeel met matigen bos. Steen los; vleesch witachtig, plaatselijk rood, tamelijk goed van smaak. De bloem is groot; bladklier afwezig. Koude serre.

### C

- 32 **Greta Jonker.** Gewonnen door M. Visser te Naarden. Bloem middelgroot, bladklier rond., Vrucht geelachtig met weinig bos, vleesch witachtig, rood bij steen, steen los, grootte middelmatig. Smaak goed. Zeer vruchtbbaar en rijp in koude serre na Amsden. In Noord Friesland geeft

# Kweekerij „Voorne en Putten” J. VERSCHOOR • Zwartewaal



Al onze éénjarigen worden aan stokken gebonden

Onder keur  
der N. A. K.

Verschillende  
typen onder-  
stammen en  
één en twee-  
jarige verede-  
lingen hierop  
in de moderne  
soorten,

**Nieuwigheden**

**Bessen-Bramen**

Vraagt de 44ste jaargang onzer Prijscourant

MAAS- EN WAALSCHE BOOMKWEKERIJ

**JOHAN VAN OIJEN - REUSER**

LEEUVEN-BENEDEN - TELEFOON 46

## **Moderne speciale vruchtboomencultuur**

Kweekerijen staan onder contrôle van den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst (N.A.K.) Eerste aangesloten kweeker in Maas en Waal.

## **Vakkundige aanleg van Boomgaarden**

op de meest geëigende Onderlagen-Typen

Overal kosteloos te ontbieden. Levering: **gezond en goed  
gekweekt plantsoen**, soortecht met certificaat en plombe.

## Perzik

de berichtgever op Juli-Augustus. In Noord-Brabant waarschijnlijk een paar weken eerder.

### A

- 28 **Grosse Mignonne**. Grosse Mignon. Grosse Lieblingspfirsich. Rietsema De Perzik p. 22. 17e eeuwse Fransche verscheidenheid. Bloem groot. Bladklir rond. Flinker bloe op witgroenen grond. Steen los. Rijpt in koude serre van 1-20 Aug. Smaak zeer goed. Draagt goed. Koud.

### A

- 4 **Hale Early**. Précoce de Hale. Amerikaan uit Ohio. Rond 1850. Rietsema De Perzik, p. 10; Mas Le Verger. Gekl. pl. Bloem groot; bladklireren rond. Flinker bloe op bleekgelen grond. Steen los. Rijpt in koude serre ± 26 Juni-13 Juli. Zeer vruchtbaar. Smaak goed; grootte matig. Stook, koud glas, buiten.

### E

**J. H. Hale**. Oranjeperzik (falso). Gewonnen door J. H. Hale te Glastonbury. Connecticut U.S.A. en in 1912 in den handel gebracht door Stark Louisiana, Hedrick Cyclopedia p. 176. Bloem klein. Klir langwerpig. Vrucht oranje met matigen bloe. Vleesch oranje. Medio September; koude serre goed half Augustus. Smaak goed. Steen los. Sommigen willen van dit soort perziken niet weten. De handel neemt de kleur echter goed op.

### A

- 27 **Kernechter vom Vorgebirge**. Schaal Stein- und Beerenobst p. 14. Deze perzik is in Duitschland door selectie ontstaan in de streek tusschen Bonn en Keulen. Geldt als zaadvast wat de vruchtkenmerken betreft. De kenmerken van bloem en blad zijn vrij zeker meer veranderlijk. Flink gekleurde, middelmatig groote, goed tot zeer goed smakende Septemberperzik met loslatenden steen voor buiten. De zaailing-boomen verkeerden eerst een paar jaar in jeugdtoestand, d.w.z. hebben klein blad, fijn hout en bloeien niet. Later goed vruchtbaar. Vrucht eerste jaren wat klein.

### A

- 41 **Kestrel**. Door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth gewonnen en in den handel gebrachte perzik. Bunyard Handbook.

Zeer vruchtbaar.

Rijpt in koude serre ongeveer van 20 Juli tot 5 Augustus. Vrucht groengeel met flinker bloe. Steen los, smaak goed. Bloemen groot, klir rond.

### E

**Königin Carola von Sachsen**. In 1899 door E. Werner te Niederlössnitz in den handel gebracht. Rudolph Freilandzucht des Pfirsichbaumes p. 62. Bloem groot. Bladklir rond. Veel bloe op bleekgelen grond. Zeer groot. Steen los. Smaak zeer goed. Vruchtbaar. Augustus. Koude serre Juli. Buiten en koud glas.

### A

- 1 **Mayflower**. Early Wonder. Amerikaan van onbekende herkomst en ouderdom. Zie Hedrick Cyclopedie of Hardy Fruits p. 178. Schaal Stein- und Beerenobst. Gekl. pl. Bloem groot, bladklir rond. Fraaie bloe op groengeelachtigen grond. Grootte tamelijk. Steen vaak openvallend, hechtend. Buiten rijp vóór half Juli, in koude serre rond 10—30 Juni. Zeer vruchtbaar. Stook, koud, buiten. De vroegste onzer perziken en zeer verkoopbaar.

### C

- 33 **Mevrouw Ide**. Aanwinst van den heer Ide te Wageningen, verm. tusschen '05 en '15. In 1926 door G. A. van Rossem in den handel gebracht. Bloem klein. Weinig bloe. Vleesch wit. Smaak

### A

- 13 **Montagne**. Montauban. Vroege Montagne. Dubbele Montagne. De naam Madeleine blanche durf ik nog steeds niet met volle zekerheid als synoniem opgeven. Is er verschil tusschen deze en Montagne, dan is het echter zeer gering. Reeds meer dan 200 jaren hier te lande bekend. Rietsema, De Perzik. Ned. Boomgaard gekl. pl. Bloem groot; bladklir afwezig. Weinig bloe op groenwitten grond. Vleesch niet rood bij den steen. Steen los. Smakelijke, behoorlijk groote perzik, die buiten rond 1 September, in koude serre een maand eerder, d.w.z. 30 Juli—10 Aug., komt. De perzik heeft nog al last van meeldauw en vereischt daarom wat zorg. Overigens niet bijzonder vatbaar voor ziekte.

### A

- 15 **Noire de Montreuil**. Galande, Bellegarde. 18e eeuwse, stellig Fransche

## Perzik

perzik. Rietsema De Perzik, p. 20. Bloem klein; bladklief rond. Flinker bloos op bleek groengelen grond. Buiten veel bloos. Steen los of hechtend. Buiten 1e week September, in koude serre 1 tot 20 Augustus. Smaak zeer goed.

## A

- 11 **Peregrine**. Engelsche perzik in 1906 door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth in den handel gebracht. Rietsema, De Perzik, p. 17. Bloem groot. Bladkliefen rond. Flinker bloos op bleekgroenen grond. Steen los. Laatste week Augustus buiten, 20 Juli tot 5 Aug. serre. Smaak goed. Groot. Zeer vruchtbaar. Koud glas of buiten.

## A

- 14 **President Griepenkerl**. Noordduitsche perzik. Bloem groot. Bladklief langwerpig. Bleek groengeel met veel bloos. Steen los. Smaak tamelijk goed. In koude serre 30 Juli-12 Aug.

## C

- 39 **President Luizet**. Recente variëteit, gewonnen door Gaillard te Brignais (Rhône) en voortgekweekt door Girerd Rietsema, De Perzik. Bloem groot. Klief langwerpig. Bleek geelgroen met matigen bloos. Steen los. Smaak goed tot zeer goed. In koude serre  $\pm$  20 tot 31 Juli. Duurzame vrucht. Koude serre.

## C

- 25 **Prince of Wales**. Door Rivers te Sawbridgeworth in Engeland vóór 1875 gewonnen. Niet te verwarren met de nectarine van dien naam en niet te verwarren met de perzik Princess of Wales. Rietsema, De Perzik, p. 14. Bloem klein; bladklief langwerpig. Matige bloos op bleekgelen grond. Steen los. Smaak goed. Buiten einde September, onder glas 17 Aug.—3 Sept. De boom is vruchtbaar. Oogt te weinig. Koud.

## C

- 36 **Professor Rudolph**. Oude Duitsche soort, beneden Dresden in het Elbedal lang verbouwd en in 1909 onder dezen naam verspreid. Rudolph Freilandzucht Pfirsichbaum p. 66. Bloem groot. Bladklief langwerpig. Veel bloos. Steen los. Goed van smaak. Vruchtbaar. In koude serre 30 Juli tot 10 Augustus. Deze vruchtbare en groote perzik slechts voor koude serre.

## A

- 20 **Reine des Vergers**. Monstrueuse de Doué. Königin der Obstgärten: In 1843 gewonnen te Louresse Rocheménier arr. Saumur Frankrijk. Rietsema, De Perzik p. 21. Bloem klein. Bladklief lang. Flink blozende vrucht. Steen los. Smaak goed, buiten middelmatig. Kloeke vrucht. Vruchtbaar. Koud, buiten. Zaadvast. Rijpt buiten eind September. In koude serre 15—31 Augustus.

## A

- 16 **Royal George**. Engelsche Zwolsche. Ongeveer 200 jaar oude vermoedelijk Engelsche perzik. Rietsema, De Perzik, p. 18. Bloem klein. Bladklief afwezig. Flinker bloos op bleekgelen grond. Steen los. Tamelijk groot. Zeer goed van smaak. Rijp September (koude serre 31 Juli—15 Augustus. Koude serre.

## A

- 21 **Schoone uit het Westland**. Octoberperzik. Late Montagne. Afkomst onbekend. In het Westland reeds voor 1868 een oude bekende. Rietsema, De Perzik p. 30. Ned. Boomgaard. Gekl. pl. Bloem klein. Bladklief rond. Geringe bloos op groengelen grond. Flink groot. Begin October (koude serre 15 Aug. tot 31 Aug.) Vruchtbare late perzik. Koud. Wordt in ons land wel verkocht onder den naam van Bon Ouvrier, 't geen onjuist is.

## E

- Der Schützenleutnant Rudolph**. Enthymbride rond 1910 door Prof. Dr. F Rudolph gewonnen. Chimere van Hale Early en Reine des Vergers. Rijpt 1e helft van Augustus. Vrucht groot, bleek geelgroen met weinig bloos. Vleesch groenwit; rood bij den steen; steen los; smaak redelijk goed; rinsch. Klief langwerpig. Bloem groot.

## A

- 22 **Sea Eagle**. In 1881 door Rivers te Sawbridgeworth in den handel gebracht. Rietsema De Perzik p. 15. Bloem groot. Bladklief rond. Behoorlijke tot matige bloos op bleekgeelgroenen grond. Steen los. Vrucht zeer groot. Smaak onder glas goed. Buiten September-October. Onder koud glas 19-31 Augustus. Koude serre. Vruchtbaar.

## A

- 12 **Théophile Sueur**. Hort. Holl. Herkomst en ware naam onbekend. Bloem klein,



## Perzik

bladklir rond. Bleekgroengeel met weinig bos. Steen los. Smaak goed tot zeer goed. In koude serre  $\pm 20$  Juli-3 Augustus rijp.

### A

- 2 **Victor.** Le Vainqueur. Sieger. Amerikaan, gewonnen door J. B. Bass in Texas eenige jaren voor de laatste eeuwwisseling. Rietsema De Perzik p. 7. Bloem groot. Bladklir lang. Eenige bos op melkwitten grond. Tamelijk klein. Steen hechtend. Matig goed van smaak. Zeer vruchtbaar. Buiten rijp

### Perziken voor buiten.

|                                               | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------------------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 3 Amsden vroeg . . . . .                    | x | o  | o   | o  | x | x  |
| C 27 Kernechter vom Vorgebirge laat . . . . . | x | o  | x   | o  | x | x  |

## PERZIKEN VOOR STOOKKAST.

### A

- 1 Mayflower.  
2 Victor.  
3 Amsden June.  
4 Hale Early

### PERZIKEN voor koude kast

Voor de verschillende districten wordt geen onderscheid gemaakt.

x = goed.  
xx = zeer goed

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| A 1 Mayflower . . . . .               | x  |
| 2 Victor . . . . .                    | x  |
| 3 Amsden June . . . . .               | xx |
| 4 Hale Early . . . . .                | x  |
| 5 Duke of York . . . . .              | xx |
| 6 Dymond . . . . .                    | xx |
| 7 La France . . . . .                 | xx |
| 8 Duchess of Cornwall . . . . .       | x  |
| 11 Peregrine . . . . .                | xx |
| 12 Theophile Sœur Hort. Holl. . . . . | x  |
| 13 Montagne . . . . .                 | xx |
| 14 President Griepenkerl . . . . .    | x  |
| 15 Noire de Montreuil . . . . .       | xx |
| 16 Royal George . . . . .             | xx |
| 17 Alexis Lepère . . . . .            | x  |
| 19 Elberta . . . . .                  | x  |
| 20 Reine des Vergers . . . . .        | x  |
| 21 Schoone uit het Westland . . . . . | xx |
| 22 Sea Eagle . . . . .                | xx |
| 23 Belle Impériale . . . . .          | xx |
| 24 Vilmorin . . . . .                 | x  |
| 28 Grosse Mignonne . . . . .          | x  |
| 40 Belle de Doué . . . . .            | xx |
| 41 Kestrel . . . . .                  | xx |

## Pruim

half Juli. In koude serre half Juni. Stook, koude serre.

### A

- 24 **Vilmorin.** Een aanwinst van A. Lepère te Montreuil. In 1880 door A. Chatenay in den handel gebracht. Rietsema De Perzik p. 27; Catalogue descriptif 1927. Bloem klein. Klier rond. Flinker bos op bleekgelen grond. Vleesch witachtig. Steen los. Kloeke vrucht. Rijp, buiten ver in October, in koude serre half September. Voor koude serre.

### C

- 25 Prince of Wales.  
31 Belle de Beausse.  
32 Greta Jonker.  
33 Mevrouw Ide.  
36 Professor Rudolph.  
39 President Luizet.

### E

Frau Marie Rudolph.  
Königin Carola von Sachsen.  
Der Schützenleutnant Rudolph.  
Blondeau.  
Dido van Bijweg.

## PRUIM.

### A

- 6 **Czar.** In den handel gebracht rond 1875 door het kweekershuis Rivers te Sawbridgeworth, Engeland. Bunyard Handboek p. 76. Schaaf Stein- und Beerenoest p. 53. Gekl. pl. Boom flink. Steile groei. Draagt na 3 tot 5 jaar. Dan zeer vruchtbaar. Stutten. Kan worden geënt op Myrabolan B. Wellicht ook Tonneboer. Bloeit middel vroeg tot tamelijk laat. Pollen goed. Zelffertil. Vrucht blauw, tamelijk rond, matig tot tam. klein, vleesch geelgroen en niet al te week, smaak matig, rijp 1e helft Augustus. Tafelpruim van sobere qualiteit. Keuken. Sterk vatbaar voor loodglans. Overigens weinig ziekte. Stutten en dunnen.

### E

**Denniston's Superb.** Denniston's Red. Rouge de D. Vermoedelijk tusschen 1835 en 1840 door Isaac Denniston te Albany N.Y. gewonnen. Mas Le Verger

**hul. Timmermans** kwekerijen Sevenum  
tel. 28

*Levering uitsluitend onder  
contrôle van den Nederl.  
Algemeenen Keuringsdienst.*

*Vraagt vrijblijvende offerte*



**N. EVERSDIJK Mz.**

**BOOMKWEKER**

**KAPELLE-BIEZELINGE**

TELEFOON 46

**BIEDT AAN:**

**VRUCHTBOOMEN**

**IN UITGEBREID SORTIMENT EN OP DOOR DE  
N.A.K. GEKEURDE ONDERSTAMMEN**

**ZWARTE-, ROODE- EN  
KRUISBESSENSTRUIKEN IN SOORTEN**

## Pruim

VI p. 121 en Mas Pom. générale XII p. 79. Pollen vermoedelijk goed. Boom flink. Twijgen zwak behaard. Zeer vruchtbaar. Volgens Engelsche opgaven zelffertil. Vruucht middelmatig groot, rond, groen met kleineren tot grooteren bloes, geelachtig van vleesch, los van steen, zeer goed van smaak, eind Augustus rijp. Zeer goede tafelpruim, iets weekser echter dan No. 7.

## A

- 4 **Doyenné.** Dojené, Donjumer. Draagt in veel streken bezuiden den Rijn den naam Dubbele Boerenwitte (zie No. 5). Beide zijn, ondanks de overeenkomst, goed te onderscheiden. Beschrijving vruchtsoorten 2e Reeks p. 108. Zeer oude pruim van onbekende herkomst. Wordt reeds 200 jaar geleden genoemd. Bloeit laat. Heeft geen stuifmeel. Eischt derhalve bestuiving van andere late bloeiers. Daartoe kunnen dienen Hauszwetsche No. 10 en 15 en soms No. 2.

Boom flink en bij goede bestuiving op bevredigende wijze vruchtbaar. Blad groot, donker groen, met diepe randinsnijdingen (meer diep dan de tanden breed zijn) en zeer ruigen bladsteel en hoofdnerf. Twijgen ruig. Vruucht middelmatig groot, langwerpig, geelwit, vleesch week en witachtig. Steen los. Smaak goed tot zeer goed. Goede tafelpruim voor 2e helft Augustus. Gezond. Weinig last van de pruimenzaagwesp. Vatbaar voor spint. Vruucht wat teer bij verzending.

## A

- 5 **Dubbele Boerenwitte.** Prune virginale, Altesse blanche, Jungfernpflaume. Hvit jungfruplomme. Dubbele Witte Wijnpruim. Zeer oud, wellicht Nederlandsch. Droeg 200 jaar geleden in Scandinavië een Nederlandschen naam. Nederl. Boomgaard No. 13. Gekl. pl. Vergelijk No. 4. Boom matig groot en bij goede bestuiving reeds zeer vroeg en goed dragend. Bloeit laat. Heeft geen stuifmeel. Zou soms slecht ontwikkelde stamper hebben en daardoor wel eens minder goed dragen. Zelfde bestuivingsmogelijkheden als No. 4 volgens Johanssen l.c. soms ook No. 7. Is van Doyenné onderscheiden door het blad, dat meestal matig groot is, vaak geelwit geaderd alsof het mozaiekachtige verschijnselen vertoont. Randinsnijding diep. Tanden meer breed dan insnijdingen

gen diep zijn. Bladsteel en hoofdnerf onduidelijk behaard. Twijgen ruig. Vruucht middelmatig groot, rond, geelwit matig week vleesch, steen los, smaak goed tot zeer goed. Goede tafelpruim voor midden tot eind Augustus. Weinig zaagwesp. Overigens geen gegevens. Vruucht beter houdbaar dan No. 4.

## A

- 24 **Early Laxton.** Nieuwe aanwinst van het kweekershuis Laxton. Een, volgens Johanssen l.c. matig zelffertil, voor Victoriapollen dankbare, zeer vroege pruim, met pollen van matige hoedanigheid, die Early Rivers zou moeten vervangen. Vruuchtbaar. De vruucht is klein tot matig groot, bleek, roodachtig en redelijk van smaak. Rijpt buiten rond begin Augustus, in de koude serre een maand eerder.

De vroege rijping maakt deze pruim geschikt, zoowel voor boomgaard als voor koude of warme serre; of zij de concurrentie tegen de veel grootere en ook zeer vroege June Blood zal volhouden, is bij glascultuur onzeker. Spint.

## B

- 9 **Early Rivers'.** Rivers' Early Prolific. Eldensche Blauwe. Gewonnen door het Engelsche kweekershuis Rivers rond 1830. Bunyard Handbook p. 82. Bloei middentijds. Overwegend zelfsteriel. Pollen tamelijk slecht. Kan worden bestoven door No. 1 en 2 en 22. Volgens Johanssen l.c. ook door 6. Vroeg en rijkdragend. Boom matig groot. Vruucht klein, iets langwerpig, blauw, vleesch goudgeel, tamelijk stevig, smaak matig, rijp rond 1 Augustus. Door het vroege rijpen bruikbaar als tafelpruim. Overigens keukenpruim. Deze verscheidenheid is zeer vatbaar voor spint, die men dan ook moet bestrijden. Overigens gezond. Stutten. Goede pruim, die door de slecht toegepaste ziektebestrijding impopulair is geworden.

## C

- 31 **Golden Japan.** Onder deze twijfelachtige benaming wordt een pruim verspreid, die kennelijk behoort tot de trifloragroep. De boom is in de serre geplant bij goede bestuiving vruchtbaar. De vruucht is groot, geelwit en zeer oogelijk.

## C

- 22 **Jefferson.** Rond 1825 gewonnen door den rechter Buel te Albany N. Y. en in 1829 uitgekomen. Deutschlands Obst-

## Pruim

sorten. Gekl. pl. Boom flink, twijgen kaal. Draagt  $\pm$  4 jaar na het planten. Bloei tamelijk vroeg tot middentijds. Zelfsteriel. Intersteriel met Coe's Golden Drop. Bestuiver van Jeff. is volgens Zweedsche gegevens 1, 2 of 3. Vrucht eirond, tamelijk groot, groengeel, goudgeel van vleesch, steen hechtend, smaak goed tot zeer goed. Goede tafelpruim. Ook voor de keuken bruikbaar en begin September rijp. Gezond. Behoudens vitrose en spint.

## B

- 3 **Kirke's.** Engelsche pruim (Brompton, Kensington), in 1830 door Kirke in den handel gebracht. John Lindley Pomologia britannica III p. 111, Schaal Stein-und Beerenobst p. 48, Ned. Boomgaard No. 4, alle gekl. pl. Boom matig groot. Twijgen kaal. Bloeit met 1 en 7. Zelfsteriel. Kan worden bestoven door No. 7 en volgens Zweedsche gegevens door No. 1, 2, 8, 22 of Bleue de Belgique. Draagt eerst na 4—6 jaar en dan *bij goede bestuiving* vruchtbaar. Vrucht tamelijk groot tot groot, ongeveer rond, blauw met veel dauw, matig vast groengeel van vleesch, steen los, smaak zeer goed. Beste tafelpruim voor de eerste helft van September. Gezond. Boomgaard. Kan in serre worden beproefd; dan echter aan bestuiving te denken.

## B

- 15 **Mirabelle de Metz.** Metzer Mir. Gelbe Mir. Mir. petite, Mir. abricotée, Mir. précoce. Zeer oude pruim van onbekende herkomst. Pollen tamelijk goed. Boom matig groot. Twijgen ruig. Vruchtbaar. Bloei laat. Zelfsteriel. Bestuift No. 4 en 5 alsmede No. 10. Vrucht klein, iets langwerpig, goudgeel, tamelijk stevig, steen los, smaak zeer goed. Rijp 2e gedeelte Augustus. Wat te klein, doch overigens zeer goed voor de tafel en bijzonder in trek voor de fabrieken, waar men er een zeer aantrekkelijke compôte van bereidt. Gezond. Kan wortelecht worden gekweekt.

## E

**President.** Zou gewonnen zijn en in 1901 in den handel gebracht door het Engelse kweekershuis Rivers te Sawbridge-worth. Bunyard-Handboek p. 97. Boom matig groot. Twijgen kaal. Bloei-gegevens geen. Vrucht zeer groot, eirond, blauw, groengeel van vleesch, matig van smaak, rijp in October. De vruchtbaarheid schijnt onvoldoende.

## E

**Prince Engelbert.** Rond 1842 door Scheidweiler te Gent gewonnen. A. Bivort Album de Pomologie III p. 143. Pollen goed. Boom flink, twijgen kaal, vruchtbaar. Bloeigegevens geen. Vrucht groot, langwerpig, blauw, groengeel van vleesch. Steen los, smaak goed. Keuken of tafelpruim voor September van behoorlijke kwaliteit.

## C

- 29 **Reine Claude de Conducta.** Herkomst onbekend. Uit België naar hier gebracht, vermoedelijk nog jonge variëteit, waarmee ook de Belgische pomologen verlegen bleken te zitten. Zeer goede pruim voor begin Sept., gelijkt iets op R. Cl. d'Althann.

## A

- 8 **Reine Claude d'Althann.** R. Cl. comte d'A., Count A. Gage. Graf A. Renecode. Gewonnen in het huidige Tsechoslowakije door Prochaska, tuinman bij Michael Joseph Graaf Althann te Swoyschitz en in 1867 voor het eerst beschreven. Deutschlands Obstsorten. Gekl. pl. Boom flink, reeds zeer vroeg en rijk dragend. Twijgen kaal en blauwachtig. Zelfsteriel. Bestuivers voor deze pruim die middentijds bloeit, zijn volgens Zweedsche gegevens No. 1, 2, 7, 22 en Nectarine pruim. Vrucht tamelijk groot, rond, rood, geel of groengeel gevlekt, vleesch goudgeel, niet te week, zeer smakelijk, steen los, rijp rond 31 Augustus. Zeer goede tafelpruim. Gezond.

## C

- 20 **Reine Claude de Bavay.** In 1843 door den beroemden Belgischen winnaar, Majoor d'Esperen, genoemd naar den pomoloog de Bavay. Twijgen kaal of bijna kaal. Vruchtbaar. Vroegdragend. Vrucht matig groot, rond, groen tot groengeel. Smaak zeer goed. Steen los. Zeer goede tafelpruim. De variëteit heet zelffertil. Rijpt laat, vaak te laat, nl. einde September en alsdan is eenzijdig het weer onzeker, anderzijds is het feitelijk te koud om zoo sappig fruit te verlangen. Gezond.

## C

- 18 **Reine Claude de Boddaerts.** Bodd. Green gage. Tegen 1867 door Debeil te Deinze in België gewonnen. Twijgen wollig. Bloeigegevens geen. Vrucht rond, groot, geel, smaak zeer goed, steen los. Rijp

## Pruim

2e helft Augustus. Tafel. Pollen goed. Zelffertil.

## E

**Reine Claude de Brahy.** Brahy's Green Gage. Gewonnen door den heer Brahy Ekenholm te Herstal bij Luik. Voor het eerst vermeld in 1850. Jahn Lucas, Oberdieck III. Handbuch VII, N 270. Twijgen kaal. Bloeigegevens geen. Vruucht groot, rond, groengeel met roode spikkels. Steen los, zeer goed van smaak. Tafelpruim. Pollen goed. Zelffertil.

## A

- 2 **Reine Claude d'Oullins.** Massot. Oullins Gage. Washington (falso). Als zaailing gevonden te Coligny in Frankrijk en 1860 in den handel gekomen. Catalogue descriptif 1927 p. 469.

Bloei middentijds, wellicht iets vroeger dan No. 1. Zelffertil. Goed pollen. Bestuift No. 7, 16 en (volgens Johanssen l.c.) Nectarinepruim. Boom flink. Hout kaal. Draagt eerst na 4 tot 6 jaar, dan echter goed. Vruucht rond, middelmatig tot groot, bleek groengeel tot geel, matig vast en bleekgeel van vleesch, steen los, smaak meestal goed, bij overmatig behang in natte, weinig zonnige zomers flauw, half Augustus. Goede tafelpruim. Men geve den boom ook bij matig behang stutten. Vitrose. Overigens een gezonde boom. Zelden voor serre aanbevolen, tenzij als groote boom.

## A

- 7 **Reine Claude verte.** R. Cl. dorée, R. Cl., Abricot vert, Dauphine, Grosse Grüne R. Cl., Green Gage, Ringelot, R. Cl. ancienne. Groote groene R. Cl., Almindelig grön R. Cl., Vanlig grön R. Cl.

Vroeg 16e eeuwse, misschien nog oudere pruim, genaamd naar Claude, gemalin van Frans I van Frankrijk.

Boom middelmatig tot flink. Twijgen kaal. Bloei middentijds. Zelfsteriel. Pollen goed. Bestuift Kirke's, soms, volgens Johannsen l.c. No. 5 en 8, vraagt zelf als bestuivers 2, 3, Hauszwetsche of Tonneboer en volgens Zweedsche gegevens No. 1, 2, 8 of 24. Draagt bevestigend bij goede bestuiving.

Vruucht matig groot, rond, groen met enkele roode spikkeltjes, vleesch matig week, geelgroen, voortreffelijk van smaak, steen los. Rijp eind Augustus. Edelste van alle pruimen. Voor ieder doel bijna onovertroffen. Tafel, jam, compôte, brandewijn. Gezonde boom. Volgens sommigen dragen wortelechte

boomen bij beteren groei meer dan geënte.

## B

- 10 **Rode Eierpruim.** Cataloniepruim. Catalogne. Impériale, Red Magnum Bonum. Of de Duitsche Rote Eierpflaume deze is, is niet geheel zeker. In Noord-Brabant kent men ook een Rode Eierpr., welke van deze verschilt. Zeer oud, reeds een paar eeuwen lang in verschillende landen bekend. Herkomst onzeker. Nederl. Boomgaard No. 19. Bloei laat. Is waarschijnlijk slechts in geringe mate zelfsteriel. Bestuiving desgewenscht met Mirabelle de Metz. Niet met No. 4 of 5, die wel door de R. E. kunnen worden bestoven doch zelf geen stuifmeel maken. Bij goede bestuiving vruchtbaar. Boom matig. Twijgen kaal. Vruucht groot, rood, langwerpig eirond, vleesch geelgroen, smaak middelmatig. Steen los. Bruikbare tafelpruim voor September. Gezond.

## C

- 30 **Ruth Gerstetter.** Recente Duitsche pruim, die wij betrokken van het vermaarde Berlijnsche kweekershuis L. Späth. Onze ervaringen zijn nog slechts kortstondig. De boom is gezond, groeit redelijk goed, draagt zeer vroeg, doch tot heden nog slechts weinig vruchten. Deze zijn middelmatig groot tot groot, blauw en — het is de voornaamste deugd dezer verscheidenheid — reeds half Juli buiten rijp.

## E

**Santa Rosa.** Amerikaansche aanwinst van Burbank; in 1907 in den handel gebracht. Groot, rood; aan den steen hechtend vleesch. Tafelpruim van matige hoedanigheid. Kan onder glas worden beproefd.

## E

**Utility.** Engelsche pruim van het kweekershuis Laxton van betrekkelijk jonge datum. Bunyard Handbook Hardy Fruits p. 103. Half Augustus rijp. Rood, groot, goed van smaak; tafelpruim. Kan in serre worden beproefd. Tuschenstam in de Engelsche kwekerij.

## A

- 1 **Victoria.** Victoriablomme, Dronning Victoria, Reine Victoire. Engelsche pruim uit Sussex. Rond 1840 in den handel gekomen. Schaal Stein- und Beerenobst p. 47. Gekl. pl.

# Fruittelers!

Bij eventueele aanplant van  
vruchtboomen is ook een  
best adres voor prima waar  
en niet te duur

## JOS. JONKERS & ZONEN

Boom- en Rozenkwekerijen, Ligustrum enz.  
te BROEKHUIZENVORST, Telef. 7 v.h. Lottum

N.B. Door verplaatsing der kwekerijen hebben we  
nieuwe grond, wat aan de gezondheid der boomen  
ten goede komt.

## N.A.K. CONTRÔLE

## GEBR. OP HET VELD TEGELEN



### VRUCHTBOOMEN

in prima kwaliteit op onder-  
stamtypen en andere onder-  
stammen gekeurd door de N.A.K.  
Tot een bezoek uitnoodigend

## Pruim, Vijg

Bloei middentijds. Zelffertil. Goed pollen. Bestuift verscheiden andere pruimen. Volgens Zweedsche gegevens No. 3, 7, 8, 9, 17, 22 en Nectarinepruim. Boom klein. Hout wollig. Vroeg en rijkdragend. Vrucht langwerpig, groot, rood, vast en geel van vleesch, steen los, smaak goed, tweede helft Augustus rijp. Goede tafelprium. Fabriek. Dikwijls zal dunnen der vruchten noodzakelijk zijn. Vatbaar voor loodglans, vitrose en monilia. Boomgaard en serre. Goed voor het koelhuis.

## B

13 Zoete Kwets. Waarschijnlijk oude

|                              | I | II | III | IV | V | VI |
|------------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Victoria . . . . .       | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 2 Oullins . . . . .          | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 4 Doyenné . . . . .          | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 5 Boerenwit . . . . .        | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 6 Czar . . . . .             | x | o  | x   | x  | x | x  |
| 7 Verte . . . . .            | — | o  | —   | —  | x | x  |
| 8 Althann . . . . .          | x | o  | x   | —  | x | x  |
| 24 Early Laxton . . . . .    | x | —  | x   | —  | x | —  |
| B 3 Kirkes . . . . .         | x | o  | x   | x  | o | o  |
| 9 Early Rivers . . . . .     | o | o  | x   | x  | o | o  |
| 10 Roode Eier . . . . .      | o | o  | —   | —  | x | —  |
| 13 Zoete Kwets . . . . .     | — | x  | —   | —  | x | —  |
| 15 Metz . . . . .            | — | o  | —   | —  | x | x  |
| C 18 Boddaerts . . . . .     | — | o  | —   | —  | — | —  |
| 20 Bavay . . . . .           | — | o  | —   | —  | x | —  |
| 22 Jefferson . . . . .       | x | o  | —   | —  | x | —  |
| 29 Rcl. Conducta . . . . .   | — | —  | —   | —  | — | —  |
| 30 Ruth Gerstetter . . . . . | — | —  | —   | —  | x | —  |
| 31 Golden Japan . . . . .    | — | —  | x   | —  | x | —  |
| E 19 Brahy . . . . .         | — | o  | —   | —  | — | —  |
| 23 Denniston . . . . .       | — | o  | —   | —  | — | —  |
| 25 President . . . . .       | o | —  | —   | —  | — | —  |
| 26 Englebert . . . . .       | — | —  | —   | —  | — | —  |
| 27 Utility . . . . .         | — | —  | —   | —  | — | —  |
| 28 Santa Rosa . . . . .      | — | —  | —   | —  | — | —  |

## VIJG.

Van zeer weinig beteekenis. De varieteit Brown Turkey schijnt goed te zijn. Dit is, althans, naar de schrijver meent, de naam voor een onzer meest geteelde vijgen, die zich door vruchtbaarheid kenmerkt. Onder glas, stook of koud.

## ZWARTE BES.

## C

4 Baldwin. Oorsprong onbekend. Buny-

## Zwarze Bes

pruimsoort. Herkomst onbekend. Of-schoon deze kwets in het buitenland waarschijnlijk wel voorkomt, durf ik het niet aan om namen als Grosse Zuckerzweitsche, Stora Sockersvikon en dergelijke als synoniemen op te geven. Boom flink. Twijgen kaal. Bloei tamelijk laat. Zelffertil. Vrucht langwerpig, middelmatig groot, blauw, vast, zoet, steen los. Een der weinige echte kwetsen, die als tafelprium bruikbaar is. September. Barst niet bij regen. Ook in de keuken een goede kwets. Gezond en vruchtbaar.

ard Handbook p. 145. Struik klein, zeer vruchtbaar. Bladschijf ongeveer vlak. Knoppen opstaand en bruinachtig. Geen fasciatie. Bloeit vroeg. Vruchtzetting zonder insecten zeer goed, doch veel nachtvorstschade. Tros matig lang, bes middelmatig groot, week, rijpt even na Goliath. Vatbaarheid voor ziekten vermoedelijk middelmatig. Is bijzonder lastig in het plukken. In Engeland spreekt men van een sterker groeienden stam. Wellicht is die bruikbaar.

## Zwarte Bes

### B

- 3 **Boskoop Giant.** Géant de Boskoop. Hoogdijck's Black, H's Seedling, Schwarze Traube. Langtraubige Schwarze. In het laatst der vorige eeuw door Hoogdijck te Boskoop gewonnen en in 1895 door George Bunyard & Co. te Maidstone, Engeland, in den handel gebracht. Struik middelmatig, doorgaans iets kleiner dan No. 1; vruchtbaarheid verschillend, doch vooral in Noord-Brabant onvoldoende. Bladschijf ongeveer vlak, zeer groot; geen fasciatie, knoppen rood, twijgen lang en kegelvormig. Bloei vroeg. Draagt zonder insecten slecht. Tros lang, bes groot, week, gelijktijdig en vroeg rijpend. Sterk vatbaar voor rondknop, weinig voor brandnetelblad. De weeke bes laat zich niet verzenden. Vaak nachtvorstschade.

### E

- 6 **Davison Eight.** Eenige jaren geleden gewonnen en in den handel gebracht in 1927 door Colonel B. J. Petre te Norwich. Tros als Goliath. Bloeit vroeg. Rijpt even vóór of gelijktijdig met Goliath. Groei tamelijk zwak. Voldeed te Breda slecht, mede door de aanmerkelijke vatbaarheid voor ziekte en vorstschade. Heet aan den zeekant plaatselijk (Zee-land, Groningerland) goed, plaatselijk (Zuid-Holland) slecht te voldoen. Het is echter onzeker of deze gegevens wel alle de juiste variëteit betreffen.

### A

- 1 **Goliath.** De naam is nog niet lang in gebruik, wellicht 30—40 jaar. In het buitenland houdt men G. wel voor Nederlandsch. Zeker is, dat hier struiken voorkomen van 60—70 jaar (Lage Zwaluwe, Bavel). Uit Schotland ingevoerde Edina hebben we van G. niet kunnen onderscheiden. Rietsema Zwarte en Roode bessen. Struik flink. Zeer vruchtbaar. Knoppen meestal groengeel, zelden rood. Bloeit laat. Blad teruggebogen. Vouwt bij pletten den top zijwaarts. Vertoont vaak een lichte fasciatie der takken. Zet goed vrucht zonder insecten-

tenbezoek. Tros kort. Bes groot, stevig. Rijpt in het algemeen wat laat en zeer ongelijkmatig. Sterk vatbaar voor brandnetelblad. Eischt flinken snoei. Gevoelig voor sterke Californische pap. In Groningerland niet aan te bevelen.

### B

- 2 **Hollandsche Zwarte.** Teunissen bes. Vrij zeker dezelfde bes als die Bunyard Handbook p. 146 beschrijft als French Black en die in Frankrijk Merveille de la Gironde heet. Rietsema Zwarte en Roode Bessen. Struik zeer groot. Matig vruchtbaar. Bladschijf ongeveer vlak. Steel aan de einden licht paars getint. Geen fasciatie. Knoppen rood. Twijgen lang en spits uitlopend. Bloeit laat. Vruchtzetting zonder insecten niet nagegaan. Tros middelmatig lang. Bes middelmatig groot, stevig, rijpt gelijktijdig en middelmatig vroeg, even vóór Goliath. Weinig vatbaar voor brandnetelblad en rondknop. Verdraagt een aanmerkelijke verwaarloozing. Tusschen H. Zw. niet zelden minderwaardige struiken gemengd.

### C

- 5 **\*Roodknop.** Roodknop Goliath. Geselecteerd door Ir. J. Heemstra in den tuin van den Heer K. Maring te Leermens in 1921 en in Groningen en Drenthe beter bevonden dan alle andere zwarte bessen. Groote struik, iets kleiner dan No. 2. Zeer vruchtbaar. Knoppen rood, bij het uitloopen opvallend roodbruin. Bloei laat. Zet gemakkelijk vrucht. Insecteninvloed niet nagegaan. Tros middelmatig lang, bes matig groot, stevig, rijp tusschen No. 4 en 1. Plukt beter dan No. 1. Weinig vatbaar voor rondknop. De kleur der bessen is soms bruinzwart, hetgeen misschien een nadeel blijken zal.

### E

- \*Silvergieters zwarte.** Rond 10 jaar geleden gewonnen op den proeftuin te Leeuwarden. Vruchtbaar. Dikke stevige bes. Lange tros. Weinig plukbaarheid. Steile, gedrongen groei. Wordt in 1936 in den handel gebracht.



# Zwarte bes

## ZWARTE BES.

District:

|                            | I | II | III | IV | V | VI |
|----------------------------|---|----|-----|----|---|----|
| A 1 Goliath . . . . .      | x | —  | x   | x  | x | x  |
| B 2 Holl. Zwarte . . . . . | o | o  | x   | —  | o | o  |
| 3 Boskoop Giant . . . . .  | o | o  | x   | o  | o | o  |
| C 4 Baldwin . . . . .      | — | —  | x   | o  | o | —  |
| 5 Roodknop . . . . .       | — | —  | x   | —  | — | —  |
| E 6 Davison . . . . .      | — | —  | x   | o  | o | o  |
| 7 Silvergieters . . . . .  | — | —  | x   | —  | — | —  |

## REGISTER

|                                                   |    |                                          |    |
|---------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----|
| <b>Aalbessen</b> . . . . .                        | 11 | <b>Madame Lefebor</b> . . . . .          | 12 |
| <b>Bes, Roode (zie Aalbes).</b>                   |    | <b>Madame Moutot</b> . . . . .           | 14 |
| <b>Bes, Witte (zie Aalbes).</b>                   |    | <b>Mof. Late</b> . . . . .               | 12 |
| <b>Bes, Zwarte (zie Zwarte bessen).</b>           |    | <b>Mof. Vroege</b> . . . . .             | 12 |
| <i>Albert. Prince</i> . . . . .                   | 11 | <b>Moulin rouge</b> . . . . .            | 14 |
| <i>Correction</i> . . . . .                       | 11 | <b>Moutot, Madame</b> . . . . .          | 14 |
| <b>Dikkop</b> . . . . .                           | 11 | <b>Nassauwer</b> . . . . .               | 14 |
| <b>Duitsche Zure</b> . . . . .                    | 11 | <b>Oberschlesien</b> . . . . .           | 14 |
| <i>Erstling aus Vierlanden</i> . . . . .          | 11 | <b>President Roosevelt</b> . . . . .     | 12 |
| <b>Fay's Fruchtbare</b> . . . . .                 | 11 | <b>Prinjes Juliana</b> . . . . .         | 14 |
| <b>Fay's New Prolific</b> . . . . .               | 11 | <b>Roosevelt, President</b> . . . . .    | 12 |
| <i>Fay's Prolific</i> . . . . .                   | 11 | <b>Rouge, Moulin</b> . . . . .           | 14 |
| <b>Fruchtbare, Fay's</b> . . . . .                | 11 | <b>Scarlet.</b> . . . . .                | 14 |
| <b>Holländische Rote</b> . . . . .                | 11 | <b>Scarlet, Schotsche</b> . . . . .      | 14 |
| <i>Laxton's Perfection</i> . . . . .              | D  | <b>Schotsche Scarlet</b> . . . . .       | 14 |
| <b>Nederlandsche Roode bessen, Oude</b> . . . . . | 12 | <b>Skarlakans Smultron</b> . . . . .     | 14 |
| <b>Oude Nederlandsche Roode bessen</b> . . . . .  | 12 | <b>Smultron, Skarlakans</b> . . . . .    | 14 |
| <b>Perfection, Laxton's</b> . . . . .             | D  | <b>Tomate, Fraisier</b> . . . . .        | 14 |
| <i>Prince Albert</i> . . . . .                    | 11 | <b>Volltragende</b> . . . . .            | 12 |
| <i>Prolific, Fay's</i> . . . . .                  | 11 | <b>Vroege Mof</b> . . . . .              | 12 |
| <b>Rheinland</b> . . . . .                        | 11 | <b>Wallof</b> . . . . .                  | 12 |
| <b>Rote Holländische</b> . . . . .                | 11 | <b>Wüdericher</b> . . . . .              | 12 |
| <b>Rouge de Hollande</b> . . . . .                | 11 | <b>Abrikoos</b> . . . . .                | 32 |
| <b>Verrière rouge</b> . . . . .                   | 11 | <b>Appelonderstammen</b> . . . . .       | 8  |
| <i>Vierlanden, Erstling aus</i> . . . . .         | 11 | <b>Appels</b> . . . . .                  | 14 |
| <b>Zure Duitsche</b> . . . . .                    | 11 | <i>Åkerö</i> . . . . .                   | 14 |
| <b>Aardbeien.</b> . . . . .                       | 12 | <i>Åkerö Glasäpple</i> . . . . .         | 14 |
| <b>Amazone</b> . . . . .                          | 12 | <b>Alantapfel</b> . . . . .              | 23 |
| <b>Breda'sche</b> . . . . .                       | 14 | <i>Albert, Lane's Prince</i> . . . . .   | 18 |
| <b>Breda'sche, Kleine</b> . . . . .               | 14 | <i>Allington Pippin</i> . . . . .        | 16 |
| <i>Deutsch Evern</i> . . . . .                    | 12 | <i>Anna Boelens.</i> . . . . .           | 14 |
| <b>Elers Fruchtbare</b> . . . . .                 | 12 | <i>Apple, B. G.</i> . . . . .            | 16 |
| <i>Evern, Deutsch</i> . . . . .                   | 12 | <b>Aunée, Pomme d'</b> . . . . .         | 23 |
| <b>Fraisier tomate</b> . . . . .                  | 14 | <i>Bath, Beauty of</i> . . . . .         | 16 |
| <b>Fruchtbare, Elers</b> . . . . .                | 12 | <i>Beauty of Bath</i> . . . . .          | 16 |
| <i>Jucunda</i> . . . . .                          | 12 | <i>Belle de Boskoop</i> . . . . .        | 26 |
| <b>Juliana, Princes</b> . . . . .                 | 14 | <i>Bellefleur, Brabantsche</i> . . . . . | 16 |
| <b>Kleine Breda'sche</b> . . . . .                | 14 | <i>Bellefleur, Drentsche</i> . . . . .   | 17 |
| <b>Late Mof</b> . . . . .                         | 12 | <i>Bellefleur, Engelsche</i> . . . . .   | 18 |
| <b>Kooy, Madame</b> . . . . .                     | 14 | <i>Bellefleur, Roter</i> . . . . .       | 16 |
| <i>Lefebor, Madame</i> . . . . .                  | 12 | <i>B. G. Apple</i> . . . . .             | 16 |
| <b>Madame Kooy</b> . . . . .                      | 14 | <b>Bles.</b> . . . . .                   | 23 |
|                                                   |    | <i>Bloemeezoet</i> . . . . .             | 16 |

# Appels

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <i>Boelens. Anna</i> . . . . .              | 14 |
| <i>Bosappel</i> . . . . .                   | 16 |
| <i>Boskoop. Belle de</i> . . . . .          | 26 |
| <i>Boskoop. Schöner von</i> . . . . .       | 26 |
| <i>Boskoop. Schoone van</i> . . . . .       | 26 |
| <i>Brabantsche Bellefleur</i> . . . . .     | 16 |
| <i>Bramley's Seedling</i> . . . . .         | 16 |
| <i>Calville de Londres</i> . . . . .        | 20 |
| <i>Calville. Vogels</i> . . . . .           | 26 |
| <i>Campagner. Zoete</i> . . . . .           | D  |
| <i>Campagnezoet</i> . . . . .               | D  |
| <i>Cecilia. St.</i> . . . . .               | 26 |
| <i>Codlin. Keswick.</i> . . . . .           | 18 |
| <i>Codlin. Manks</i> . . . . .              | 20 |
| <i>Coeur. Pomme de</i> . . . . .            | 26 |
| <i>Cox's Orange</i> . . . . .               | 16 |
| <i>Cox's Orange Pippin</i> . . . . .        | 16 |
| <i>Cox's Orangen Renette</i> . . . . .      | 16 |
| <i>Croncels. Transparente de</i> . . . . .  | 26 |
| <i>Dekkers Glorie</i> . . . . .             | 17 |
| <i>Descardre Reinette</i> . . . . .         | D  |
| <i>Drentsche Bellefleur</i> . . . . .       | 17 |
| <i>Dr. Seeligs Orangepepping</i> . . . . .  | 17 |
| <i>Early. Emneth.</i> . . . . .             | 17 |
| <i>Early Victoria</i> . . . . .             | 17 |
| <i>Eckenstijn. Reinette van</i> . . . . .   | 24 |
| <i>Eethensche Wijnappel</i> . . . . .       | 17 |
| <i>Eisdener Klumpke</i> . . . . .           | 17 |
| <i>Ekenstein. Reinette van</i> . . . . .    | 17 |
| <i>Ellisons orange</i> . . . . .            | 17 |
| <i>Elsen. Pater van den</i> . . . . .       | 22 |
| <i>Emneth Early</i> . . . . .               | 17 |
| <i>Engeland. Present van</i> . . . . .      | 23 |
| <i>Engelsche Bellefleur</i> . . . . .       | 18 |
| <i>Engelse Kroon</i> . . . . .              | 18 |
| <i>Ermgaard. Zoete</i> . . . . .            | 28 |
| <i>Fransche. Oude</i> . . . . .             | 22 |
| <i>Fransche zure</i> . . . . .              | 17 |
| <i>Friesland. Present van</i> . . . . .     | D  |
| <i>Gelber Richard</i> . . . . .             | D  |
| <i>Glorie. Dekkers</i> . . . . .            | 17 |
| <i>Glorie van Holland</i> . . . . .         | 17 |
| <i>Goudreinette</i> . . . . .               | 26 |
| <i>Grand Richard</i> . . . . .              | D  |
| <i>Grieve. James</i> . . . . .              | 18 |
| <i>Groninger Kroon</i> . . . . .            | 18 |
| <i>Grosser Edler Prinzenapfel</i> . . . . . | 23 |
| <i>Gul Richard</i> . . . . .                | D  |
| <i>Heerappel</i> . . . . .                  | 23 |
| <i>Holland. Glorie van</i> . . . . .        | 17 |
| <i>Holland. Present van</i> . . . . .       | 23 |
| <i>Jaime Richard</i> . . . . .              | D  |
| <i>James Grieve</i> . . . . .               | 18 |
| <i>Jonathan</i> . . . . .                   | 18 |
| <i>Jubilee Royal</i> . . . . .              | 24 |
| <i>Junkeraepfel. Schmidts</i> . . . . .     | 14 |
| <i>Kesterens Wijnzuur</i> . . . . .         | 18 |
| <i>Keswick Codlin</i> . . . . .             | 18 |
| <i>Kiel. Triomphe de</i> . . . . .          | 16 |
| <i>Klaraeble</i> . . . . .                  | 28 |

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| <i>Klarapfel Weisser</i> . . . . .           | 28     |
| <i>Klaräpple Vitt</i> . . . . .              | 28     |
| <i>Klumpke. Eisdener</i> . . . . .           | 17     |
| <i>Koningszuur</i> . . . . .                 | 18     |
| <i>Körckoven</i> . . . . .                   | D      |
| <i>Kroon</i> . . . . .                       | 18, 23 |
| <i>Kroonappel</i> . . . . .                  | 23, 18 |
| <i>Kroon. Engelse</i> . . . . .              | 18     |
| <i>Kroon. Groninger</i> . . . . .            | 18     |
| <i>Kroon. Zoete</i> . . . . .                | 28     |
| <i>Kroon. Zure</i> . . . . .                 | 18     |
| <i>Landsberger Renette</i> . . . . .         | 18     |
| <i>Lane's Prince Albert</i> . . . . .        | 18     |
| <i>Laxton's Superb</i> . . . . .             | 20     |
| <i>Lemoenappel</i> . . . . .                 | 20     |
| <i>London Peppin</i> . . . . .               | 20     |
| <i>London Pepping</i> . . . . .              | 20     |
| <i>London Pippin</i> . . . . .               | 20     |
| <i>Londres. Calville de</i> . . . . .        | 20     |
| <i>Londres. Pepin de</i> . . . . .           | 20     |
| <i>Luntersche Pippeling</i> . . . . .        | 20     |
| <i>Madeleine</i> . . . . .                   | 28     |
| <i>Manks appel</i> . . . . .                 | 20     |
| <i>Manks Codlin</i> . . . . .                | 20     |
| <i>May Queen</i> . . . . .                   | 20     |
| <i>Monstrueuse. Reinette</i> . . . . .       | 26     |
| <i>Montfort. Reinette von</i> . . . . .      | 26     |
| <i>Noble. Princesse</i> . . . . .            | 29     |
| <i>Noblesse</i> . . . . .                    | 29     |
| <i>Nordhausen. Schöner von</i> . . . . .     | 24     |
| <i>Notarisappel</i> . . . . .                | 22     |
| <i>Orange. Cox's</i> . . . . .               | 16     |
| <i>Orange de Cox</i> . . . . .               | 16     |
| <i>Orange. Ellisons</i> . . . . .            | 17     |
| <i>Orangen Renette. Cox's</i> . . . . .      | 16     |
| <i>Orange pepping. Dr. Seeligs</i> . . . . . | 17     |
| <i>Orange Pippin. Cox's</i> . . . . .        | 16     |
| <i>Orange. Prince d'</i> . . . . .           | 23     |
| <i>Ossenkop.</i> . . . . .                   | 22     |
| <i>Oude Fransche</i> . . . . .               | 22     |
| <i>Pater van den Elsen</i> . . . . .         | 22     |
| <i>Pepin de Londres</i> . . . . .            | 20     |
| <i>Pepping. London</i> . . . . .             | 20     |
| <i>Pfirsichroter Sommerapfel</i> . . . . .   | 22     |
| <i>Pippeling. Luntersche</i> . . . . .       | 20     |
| <i>Pippin. Allington</i> . . . . .           | 16     |
| <i>Pippin. London</i> . . . . .              | 20     |
| <i>Pomme d'Aunée</i> . . . . .               | 23     |
| <i>Pomme de Coeur</i> . . . . .              | 26     |
| <i>Present van Engeland</i> . . . . .        | 23     |
| <i>Present van Friesland</i> . . . . .       | D      |
| <i>Present van Holland</i> . . . . .         | 23     |
| <i>Prince Albert. Lane's</i> . . . . .       | 18     |
| <i>Prince d'Orange</i> . . . . .             | 23     |
| <i>Prinsesäpple</i> . . . . .                | 23     |
| <i>Princessenobel</i> . . . . .              | 23     |
| <i>Prinzessinapfel. Gr. E.</i> . . . . .     | 23     |
| <i>Queen Mary</i> . . . . .                  | 20     |
| <i>Reinette Descardre</i> . . . . .          | D      |
| <i>Reinette. Monstrueuse</i> . . . . .       | 26     |

## Appels

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Reinette rouge étoilée . . . . .     | 26 |
| Reinette van Eckenstijn . . . . .    | 24 |
| Reinette van Ekenstein . . . . .     | 24 |
| Reinette van Montfort . . . . .      | 26 |
| Renette. Landsberger . . . . .       | 18 |
| Renette von Zuccamaglio . . . . .    | 24 |
| Richard. Gelber . . . . .            | D  |
| Richard. Grand . . . . .             | D  |
| Richard Gul . . . . .                | D  |
| Roode Tulpappel . . . . .            | 24 |
| Roter Bellefleur . . . . .           | 16 |
| Royal Jubilee . . . . .              | 24 |
| Sabot . . . . .                      | 17 |
| Säfstaholm . . . . .                 | D  |
| Schellingerhout . . . . .            | 24 |
| Schmidts Junkerapfel . . . . .       | 14 |
| Schöner von Boskoop . . . . .        | 26 |
| Schöner von Nordhausen . . . . .     | 24 |
| Schoone van Boskoop . . . . .        | 26 |
| Seedling. Bramley's . . . . .        | 16 |
| Seeligs Orange Pepping. Dr. . . . .  | 17 |
| Signe Tillisch . . . . .             | 26 |
| Sommerapfel. Pfirsichroter . . . . . | 22 |
| St. Cecilia . . . . .                | 26 |
| Starappel . . . . .                  | 26 |
| Sterappel . . . . .                  | 26 |
| Sternrenette . . . . .               | 26 |
| Sterrenette . . . . .                | 26 |
| Superb Laxton's . . . . .            | 20 |
| Tillisch. Signe . . . . .            | 26 |
| Transparente de Croncels . . . . .   | 26 |
| Transparente jaune . . . . .         | 28 |
| Transparent. White . . . . .         | 28 |
| Transparent. Yellow . . . . .        | 28 |
| Triomphe de Kiel . . . . .           | 16 |
| Tulpappel. Roode . . . . .           | 24 |
| Uil . . . . .                        | 18 |
| Victoria Early . . . . .             | 17 |
| Vitt Klaräpple . . . . .             | 28 |
| Vogelcalville . . . . .              | 26 |
| Wealthy . . . . .                    | 26 |
| Weisser Klarapfel . . . . .          | 28 |
| White Transparent . . . . .          | 28 |
| Wijnappel. Eethensche . . . . .      | 17 |
| Wijnzuur. Kesterens . . . . .        | 18 |
| Yellow Transparent . . . . .         | 28 |
| Zigeunerin . . . . .                 | 28 |
| Zoete Campagner . . . . .            | D  |
| Zoete Ermgaard . . . . .             | 28 |
| Zoete Kroon . . . . .                | 28 |
| Zoete Winterkroon . . . . .          | 28 |
| Zuccamaglio. Renette von . . . . .   | 24 |
| Zuccamaglio renett. von . . . . .    | 24 |
| Zure Franche . . . . .               | 17 |
| Zure Kroon . . . . .                 | 18 |

**Bessen** (zie Aalbessen, Kruisbessen en Zwarte bessen).

**Bramen** . . . . . 32

**Districten**, zie kaart van Nederland 7

**Districten**. Indeeling van het land . 5

**Druiven** . . . . . 32

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Alexandrië. Muscat d' . . . . .           | 34 |
| Alexandrië. Muskaat van . . . . .         | 34 |
| Alexandrien. Weisser Muskat von . . . . . | 34 |
| Alicante. Black . . . . .                 | 32 |
| Alicante. Blaue . . . . .                 | 32 |
| Alicantische . . . . .                    | 32 |
| Appley Towers . . . . .                   | 32 |
| Black Alicante . . . . .                  | 32 |
| Black Hamburg . . . . .                   | 32 |
| Blaue Alicante . . . . .                  | 32 |
| Blauer Trollinger . . . . .               | 32 |
| Blaues Oeksenauge . . . . .               | 32 |
| Blauwe Kampioen . . . . .                 | D  |
| Blauwe Muskaat . . . . .                  | D  |
| Champion. Golden . . . . .                | 32 |
| Colman. Gros . . . . .                    | 32 |
| Colmar. Gros . . . . .                    | 32 |
| Dodrelabi . . . . .                       | 32 |
| Emile. Royal . . . . .                    | D  |
| Frankendaler . . . . .                    | 32 |
| Frankdaler. Witte . . . . .               | 34 |
| Frankendaler blå . . . . .                | 32 |
| Frankenthal . . . . .                     | 32 |
| Frankenthaler . . . . .                   | 32 |
| Golden Champion . . . . .                 | 32 |
| Granacke . . . . .                        | 32 |
| Granaxa . . . . .                         | 32 |
| Gros Colman . . . . .                     | 32 |
| Gros Colmar . . . . .                     | 32 |
| Gros Maroc . . . . .                      | 34 |
| Hamburg Black . . . . .                   | 32 |
| Kampioen. Blauwe . . . . .                | D  |
| Koning der Witten . . . . .               | 34 |
| Maroc. Gros . . . . .                     | 34 |
| Muscat d'Alexandrie . . . . .             | 34 |
| Muskaat van Alexandrië . . . . .          | 34 |
| Muskaat. Blauwe . . . . .                 | D  |
| Muskat von Alexandrien. Weisser . . . . . | 34 |
| Oeksenauge. Blaues . . . . .              | 32 |
| Royal Emile . . . . .                     | D  |
| Spaansche . . . . .                       | 32 |
| Towers. Appley . . . . .                  | 32 |
| Trollinger Blauer . . . . .               | 32 |
| Victoria . . . . .                        | 34 |
| Witte Frankendaler . . . . .              | 34 |
| Witten. Koning der . . . . .              | 34 |

**Frambozen** . . . . . 35

|                         |    |
|-------------------------|----|
| George. Lloyd . . . . . | 35 |
| Lloyd George . . . . .  | 35 |
| Preussen . . . . .      | 35 |
| St. Walfried . . . . .  | 35 |
| Walfried. St. . . . .   | 35 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Groepen. Indeeling van het fruit in . . .   | 6  |
| Hazelenoten . . . . .                       | 35 |
| Indeeling van het fruit in groepen . . .    | 6  |
| Districten. Indeeling van het land in . .   | 5  |
| Kersen . . . . .                            | 35 |
| <i>Abbesse de Moulant</i> . . . . .         | 35 |
| Arch Duke . . . . .                         | 39 |
| Bastaarddikke . . . . .                     | 35 |
| <i>Beeksche Late</i> . . . . .              | 35 |
| Beierlander . . . . .                       | 36 |
| Beierlandsche Kriek . . . . .               | 36 |
| <i>Bigarreau. Elton</i> . . . . .           | 36 |
| <i>Bigarreau. Napoleon</i> . . . . .        | D  |
| Bruine Blansje . . . . .                    | 38 |
| Bruintje . . . . .                          | 38 |
| Citroenkers . . . . .                       | 36 |
| Dikke Loen . . . . .                        | 36 |
| <i>Drogans Gelbe Knorpelkirsche</i> . . . . | 36 |
| (Dubbele )Eierkriek . . . . .               | 36 |
| <i>Dubbele Meikers</i> . . . . .            | 38 |
| <i>Dubbele Morelkers</i> . . . . .          | 39 |
| Duitsche Meikers . . . . .                  | 36 |
| Duitsche Vroege . . . . .                   | 36 |
| Duke Arch . . . . .                         | 39 |
| Duke. Dutch . . . . .                       | 38 |
| Dutch Duke . . . . .                        | 38 |
| Early Kentish Virginian May . . . .         | 39 |
| <i>Early Rivers</i> . . . . .               | 36 |
| Eierkriek (Dubbele) . . . . .               | 36 |
| Eisdensche Kers . . . . .                   | 35 |
| Elton . . . . .                             | 36 |
| <i>Elton, Bigarreau</i> . . . . .           | 36 |
| Elton Heart . . . . .                       | 36 |
| Father van Mansfeld . . . . .               | 38 |
| Fransche Meikers . . . . .                  | 36 |
| <i>Gelbe Knorpelkirsche. Drogans</i> . . .  | 36 |
| Geldersche kers . . . . .                   | 36 |
| Geldersche Meikers . . . . .                | 38 |
| Griaine . . . . .                           | 39 |
| Grienne . . . . .                           | 39 |
| Griotte de Portugal . . . . .               | 39 |
| Griotte du Nord . . . . .                   | 39 |
| Groote Variksche Zwarte . . . . .           | 38 |
| Groote Zwarte . . . . .                     | 38 |
| Grosse Lange Lothkirsche . . . . .          | 39 |
| Heart. Elton . . . . .                      | 36 |
| Hedelfinger Riesen . . . . .                | 36 |
| Hollander . . . . .                         | 36 |
| Holländische Süßweichsel . . . . .          | 38 |
| <i>Inspecteur Löhmis</i> . . . . .          | 36 |
| <i>Kentish</i> . . . . .                    | 39 |
| Kentish Virginian May. Early . . .          | 39 |
| Kers. Eisdensche . . . . .                  | 35 |
| Kers. Geldersche . . . . .                  | 36 |
| Klerk . . . . .                             | 36 |
| Klerkekriek . . . . .                       | 36 |
| <i>Knolkers</i> . . . . .                   | 39 |

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <i>Knorpelkirsche. Drogans Gelbe</i> . . . | 36 |
| <i>Koningskers</i> . . . . .               | 36 |
| <i>Krieken</i> . . . . .                   | 35 |
| Kriek. Beierlandsche . . . . .             | 36 |
| Kriek. Mierlo'sche . . . . .               | 36 |
| Kriek. Udensche . . . . .                  | 36 |
| <i>Kriek. Westerlee'sche</i> . . . . .     | 39 |
| Lange Lothkirsche. Grosse . . . . .        | 39 |
| <i>Late. Beeksche</i> . . . . .            | 35 |
| Loen. Dikke . . . . .                      | 36 |
| <i>Löhmis. Inspecteur</i> . . . . .        | 36 |
| Lothkirsche. Grosse Lange . . . . .        | 39 |
| Maikirsche. Rothe . . . . .                | 39 |
| Mansfeld. Father van . . . . .             | 38 |
| <i>Mansfeld. Pater van</i> . . . . .       | 38 |
| Mansfeld. Père de . . . . .                | 38 |
| Mansfeld. Vater van . . . . .              | 38 |
| Markies . . . . .                          | 38 |
| May. Early Kentish Virginian . . . .       | 39 |
| Meikers . . . . .                          | 38 |
| <i>Meikers. Dubbele</i> . . . . .          | 38 |
| Meikers. Duitsche . . . . .                | 36 |
| Meikers. Fransche . . . . .                | 36 |
| Mierlo'sche Kriek . . . . .                | 36 |
| <i>Mierlo'sche Zwarte</i> . . . . .        | 36 |
| <i>Molenkers</i> . . . . .                 | 38 |
| Morel . . . . .                            | 39 |
| <i>Morelkers. Dubbele</i> . . . . .        | 39 |
| <i>Morel. Zoete Zeeuwsche</i> . . . . .    | 38 |
| Morel. Zure . . . . .                      | 39 |
| <i>Moulant. Abbesse de</i> . . . . .       | 35 |
| Noordkriek . . . . .                       | 39 |
| Nord. Griotte du . . . . .                 | 39 |
| <i>Peter van Mansfeld</i> . . . . .        | 38 |
| Père de Mansfeld . . . . .                 | 38 |
| Portugal. Griotte de . . . . .             | 39 |
| Riesenkirsche Hedelf. . . . .              | 36 |
| Rivers. Early . . . . .                    | 36 |
| <i>Rojalen</i> . . . . .                   | 38 |
| Roode Waalsche . . . . .                   | 39 |
| Rothe Maikirsche . . . . .                 | 39 |
| Schattenmorelle . . . . .                  | 39 |
| <i>Spaansche. Udensche</i> . . . . .       | 38 |
| Spaansche Zwarte . . . . .                 | 38 |
| Stroopkers . . . . .                       | 36 |
| Suikerkriek . . . . .                      | 36 |
| Süssweichsel. Holländische . . . . .       | 38 |
| Tôt et Tard . . . . .                      | 38 |
| Udensche Kriek . . . . .                   | 36 |
| <i>Udensche Spaansche</i> . . . . .        | 38 |
| <i>Variksche Zwarte</i> . . . . .          | 38 |
| Vater van Mansfeld . . . . .               | 38 |
| Virginian . . . . .                        | 39 |
| Virginian May. Early Kentish . . . .       | 39 |
| Vroege Meikers . . . . .                   | 36 |
| Waalsche. Roode . . . . .                  | 39 |
| <i>Walen</i> . . . . .                     | 39 |
| <i>Westerleesche Kriek</i> . . . . .       | 39 |
| <i>Wilhelmina</i> . . . . .                | 38 |
| Witte Wijnkers . . . . .                   | 36 |

**Kersen**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <i>Zeeuwsche Zoete Morel</i> . . . . .     | 38 |
| <i>Zoete Morel. Zeeuwsche</i> . . . . .    | 38 |
| <i>Zwarte. Grootte</i> . . . . .           | 38 |
| <i>Zwarte. Grootte Variksche</i> . . . . . | 38 |
| <i>Zwarte. Mierlo'sche</i> . . . . .       | 36 |
| <i>Zwarte. Spaansche</i> . . . . .         | 38 |
| <i>Zwarte. Udensche</i> . . . . .          | 36 |
| <i>Zwarte. Variksche</i> . . . . .         | 38 |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Kersonderstammen</b> . . . . . | 8 |
|-----------------------------------|---|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| <b>Kruisbessen</b> . . . . . | 40 |
|------------------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <i>Blonde. Lentsche</i> . . . . .                | 40 |
| <i>Crownbob</i> . . . . .                        | 40 |
| <i>Crownprince</i> . . . . .                     | D  |
| <i>Drop. Golden</i> . . . . .                    | 40 |
| <i>Early Sulphur</i> . . . . .                   | 40 |
| <i>Engelsche Witte</i> . . . . .                 | 40 |
| <i>Engelsche Witte. Grootvruchtige</i> . . . . . | 40 |
| <i>Früheste Gelbe</i> . . . . .                  | 40 |
| <i>Gelbe. Früheste</i> . . . . .                 | 40 |
| <i>Gelbe Riesenbeere</i> . . . . .               | D  |
| <i>Gele. Ruige</i> . . . . .                     | 40 |
| <i>Golden Drop</i> . . . . .                     | 40 |
| <i>Gule. Tidlige</i> . . . . .                   | 40 |
| <i>Industry</i> . . . . .                        | 40 |
| <i>Industry. Whinham's</i> . . . . .             | 40 |
| <i>Lad. Lancashire</i> . . . . .                 | D  |
| <i>Lancashire. Lad.</i> . . . . .                | D  |
| <i>Lancer</i> . . . . .                          | D  |
| <i>Lentsche Blonde</i> . . . . .                 | 40 |
| <i>Leveller</i> . . . . .                        | D  |
| <i>Lion. Yellow</i> . . . . .                    | 40 |
| <i>Rote Triumphbeere</i> . . . . .               | 40 |
| <i>Ruige Gele</i> . . . . .                      | 40 |
| <i>Sulphur. Early</i> . . . . .                  | 40 |
| <i>Tidlige Gule</i> . . . . .                    | 40 |
| <i>Triumphbeere. Rote</i> . . . . .              | 40 |
| <i>Triumphbeere. Weisse</i> . . . . .            | 40 |
| <i>Weisse Triumphbeere</i> . . . . .             | 40 |
| <i>Whinham's Industry</i> . . . . .              | 40 |
| <i>Witte. Engelsche</i> . . . . .                | 40 |
| <i>Witte. Grootvruchtige Engelsche</i> . . . . . | 40 |
| <i>Whitesmith</i> . . . . .                      | 40 |
| <i>Yellow Lion</i> . . . . .                     | 40 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Litteratuur</b> . . . . . | 4 |
|------------------------------|---|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| <b>Mispel</b> . . . . . | 40 |
|-------------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Moerbeien</b> . . . . . | 42 |
|----------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| <b>Noot</b> . . . . . | 42 |
|-----------------------|----|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Okkernoot</b> . . . . . | 42 |
|----------------------------|----|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Onderstammen</b> . . . . . | 8 |
|-------------------------------|---|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Peeronderstammen</b> . . . . . | 8 |
|-----------------------------------|---|

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Peren</b> . . . . . | 42 |
|------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| <i>Alençon. Doyenné d'</i> . . . . .          | 44 |
| <i>Alexandre Lucas. Beurré</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Amanlis. Beurré d'</i> . . . . .           | 42 |
| <i>Andenken an den Kongress</i> . . . . .     | 48 |
| <i>Angoulême. Pitmaston Duchess</i> . . . . . | 48 |
| <i>Anjou. Beurré d'</i> . . . . .             | 47 |
| <i>Arenberg. Die</i> . . . . .                | 48 |
| <i>Avranches. Bonne Louise d'</i> . . . . .   | 43 |
| <i>Baltet. Eva</i> . . . . .                  | 46 |
| <i>Bartlett</i> . . . . .                     | 50 |
| <i>Belle Lucrative</i> . . . . .              | 42 |
| <i>Bellissime d'hiver</i> . . . . .           | 48 |
| <i>Bergamote Lucrative</i> . . . . .          | 42 |
| <i>Beuckes Butterbirne</i> . . . . .          | 42 |
| <i>Beurré Alexandre Lucas</i> . . . . .       | 42 |
| <i>Beurré Beucke</i> . . . . .                | 42 |
| <i>Beurré Clairgeau</i> . . . . .             | 42 |
| <i>Beurré d' Amanlis</i> . . . . .            | 42 |
| <i>Beurré d' Anjou</i> . . . . .              | 47 |
| <i>Beurré de Mérode</i> . . . . .             | 44 |
| <i>Beurré Gellert</i> . . . . .               | 42 |
| <i>Beurré Hardy</i> . . . . .                 | 42 |
| <i>Beurré Lebrun</i> . . . . .                | 43 |
| <i>Beurré Superfin</i> . . . . .              | 43 |
| <i>Blumenback's Butterbirne</i> . . . . .     | 48 |
| <i>Bon Chrétien Williams</i> . . . . .        | 50 |
| <i>Bonne d'Ezée</i> . . . . .                 | 43 |
| <i>Bonne Louise d' Avranches</i> . . . . .    | 43 |
| <i>Boussoch. Doyenné</i> . . . . .            | 44 |
| <i>Brederode</i> . . . . .                    | 43 |
| <i>Brederode. Zoete</i> . . . . .             | 43 |
| <i>Brederode. Zure</i> . . . . .              | 43 |
| <i>Brittenpeer</i> . . . . .                  | 47 |
| <i>Butterbirne. Beuckes</i> . . . . .         | 42 |
| <i>Butterbirne. Blumenbacks</i> . . . . .     | 48 |
| <i>Butterbirne. Clairgeau's</i> . . . . .     | 42 |
| <i>Butterbirne. Gellerts</i> . . . . .        | 42 |
| <i>Calebasse de Tirlemont</i> . . . . .       | 43 |
| <i>Charneux. Fondante de</i> . . . . .        | 46 |
| <i>Charneux. Köstliche von</i> . . . . .      | 46 |
| <i>Charneux. Merveille de</i> . . . . .       | 46 |
| <i>Chrétien Williams. Bon</i> . . . . .       | 50 |
| <i>Christbirne Williams</i> . . . . .         | 50 |
| <i>Clairgeau. Beurré</i> . . . . .            | 42 |
| <i>Clairgeau's Butterbirne</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Clapp. Favorite de</i> . . . . .           | 43 |
| <i>Clapp's Favorite</i> . . . . .             | 43 |
| <i>Clapp's Favourite</i> . . . . .            | 43 |
| <i>Clapp's Liebling</i> . . . . .             | 43 |
| <i>Comice. Doyenné du</i> . . . . .           | 44 |
| <i>Comtesse de Paris</i> . . . . .            | 44 |
| <i>Conférence</i> . . . . .                   | 44 |
| <i>Congres. Souvenir du</i> . . . . .         | 48 |
| <i>Cornélis. Désiré</i> . . . . .             | 44 |
| <i>Cornelis. Dr.</i> . . . . .                | 44 |
| <i>Dechantsbirne. Vereins</i> . . . . .       | 44 |
| <i>Désiré Cornelis</i> . . . . .              | 44 |
| <i>Doppelte Philipsbirn</i> . . . . .         | 44 |
| <i>Doppelt Philip</i> . . . . .               | 44 |

# Peren

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <i>Double de Guerre</i> . . . . .          | D  |
| <i>Doyenné Boussoch</i> . . . . .          | 44 |
| <i>Double Philippe</i> . . . . .           | 44 |
| <i>Doyenné d'Alençon</i> . . . . .         | 44 |
| <i>Doyenné du Comice</i> . . . . .         | 44 |
| <i>Dr. Cornélis</i> . . . . .              | 44 |
| <i>Dubbele Jut</i> . . . . .               | 46 |
| <i>Dubbele Flip</i> . . . . .              | 44 |
| <i>Duchesse d'Angoulême Pitm.</i> . . . .  | 48 |
| <i>Duchess. Pitmaston</i> . . . . .        | 48 |
| <i>Emile d'Heyst</i> . . . . .             | 46 |
| <i>Esperen. Seigneur d'</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Esperens Herrenbirne</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Esperens Herrepäron</i> . . . . .       | 42 |
| <i>Esperen Soldat</i> . . . . .            | 48 |
| <i>Eva Baltet</i> . . . . .                | 46 |
| <i>Ezée Bonne d'</i> . . . . .             | 43 |
| <i>Favorite. Clapp's</i> . . . . .         | 43 |
| <i>Favorite de Clapp</i> . . . . .         | 43 |
| <i>Favourite. Clapp's</i> . . . . .        | 43 |
| <i>Filip</i> . . . . .                     | 44 |
| <i>Flip. Dubbele</i> . . . . .             | 44 |
| <i>Fondante de Charneux</i> . . . . .      | 46 |
| <i>Forellenbirne</i> . . . . .             | 46 |
| <i>Frühe von Trévoux</i> . . . . .         | 48 |
| <i>Gellert. Beurré</i> . . . . .           | 42 |
| <i>Gellerts Butterbirne</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Gieser Wildemanspeer</i> . . . . .      | 46 |
| <i>Gräfin von Paris</i> . . . . .          | 44 |
| <i>Gräpäron</i> . . . . .                  | 46 |
| <i>Gratioli of Jersey</i> . . . . .        | 46 |
| <i>Graue. Gute</i> . . . . .               | 46 |
| <i>Gute Graue</i> . . . . .                | 46 |
| <i>Gute Luise von Avranches</i> . . . . .  | 43 |
| <i>Hardy. Beurré</i> . . . . .             | 42 |
| <i>Hardy. Poire</i> . . . . .              | 42 |
| <i>Herrenbirne. Esperens</i> . . . . .     | 42 |
| <i>Herrepäron. Esperens</i> . . . . .      | 42 |
| <i>Hiver. Bellissime d'</i> . . . . .      | 48 |
| <i>Heyst. Emile d'</i> . . . . .           | 46 |
| <i>Jan Groospeer</i> . . . . .             | 47 |
| <i>Jersey. Gratioli of</i> . . . . .       | 46 |
| <i>Jersey. Louise bonne of</i> . . . . .   | 43 |
| <i>Joséphine de Malines</i> . . . . .      | D  |
| <i>Jut</i> . . . . .                       | 46 |
| <i>Jut. Dubbele</i> . . . . .              | 46 |
| <i>Jut. Konings</i> . . . . .              | 46 |
| <i>Kievitspeer</i> . . . . .               | 47 |
| <i>Kleipeer</i> . . . . .                  | 47 |
| <i>Kongress. Andenken an den</i> . . . . . | D  |
| <i>Koningsjut</i> . . . . .                | 46 |
| <i>Köstliche von Charneux</i> . . . . .    | 46 |
| <i>Kreeftspeer</i> . . . . .               | D  |
| <i>Kriegspeer</i> . . . . .                | D  |
| <i>Kruidenierspeer</i> . . . . .           | 48 |
| <i>Laboureur. Soldat</i> . . . . .         | 48 |
| <i>Lebrun. Beurré</i> . . . . .            | 43 |
| <i>Legipont</i> . . . . .                  | 46 |
| <i>Leon Ponçaint</i> . . . . .             | 47 |
| <i>Leopold</i> . . . . .                   | 46 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| <i>Liebling. Clapps</i> . . . . .                | 43 |
| <i>Louise bonne d'Avranches</i> . . . . .        | 43 |
| <i>Louise bonne of Jersey</i> . . . . .          | 43 |
| <i>Louise d'Avranches. Bonne</i> . . . . .       | 43 |
| <i>Luise von Avranches. Gute</i> . . . . .       | 43 |
| <i>Lucas. Beurré Alexandre</i> . . . . .         | 42 |
| <i>Lucrative. Belle</i> . . . . .                | 42 |
| <i>Lucrative. Bergamote</i> . . . . .            | 42 |
| <i>Luise von Avranches. Gute</i> . . . . .       | 43 |
| <i>Maagdenpeer</i> . . . . .                     | 47 |
| <i>Madame Freyve</i> . . . . .                   | 47 |
| <i>Madame Freyve. Souvenir de</i> . . . . .      | 47 |
| <i>Malines. Joséphine de</i> . . . . .           | D  |
| <i>Mandjespeer</i> . . . . .                     | 47 |
| <i>Marguerite Marillat</i> . . . . .             | 47 |
| <i>Marillat. Marguerite</i> . . . . .            | 47 |
| <i>Mérode. Beurré de</i> . . . . .               | 44 |
| <i>Merodespäron</i> . . . . .                    | 44 |
| <i>Merveille de Charneux</i> . . . . .           | 46 |
| <i>Montluçon. Sucrée de</i> . . . . .            | 50 |
| <i>Nec Plus Meuris</i> . . . . .                 | 47 |
| <i>Neue Poiteau</i> . . . . .                    | 47 |
| <i>Nouveau Poiteau</i> . . . . .                 | 47 |
| <i>Oomskinderpeer</i> . . . . .                  | 48 |
| <i>Paris. Comtesse de</i> . . . . .              | 44 |
| <i>Paris. Gräfin von</i> . . . . .               | 44 |
| <i>Philip. Doppelt</i> . . . . .                 | 44 |
| <i>Philippe. Double</i> . . . . .                | 44 |
| <i>Pitmaston. Duchess</i> . . . . .              | 48 |
| <i>Pitmaston. Duchesse d'Angoulême</i> . . . . . | 48 |
| <i>Poire Hardy</i> . . . . .                     | 42 |
| <i>Poiteau Neue</i> . . . . .                    | 47 |
| <i>Poiteau Nouveau</i> . . . . .                 | 47 |
| <i>Ponçaint. Léon</i> . . . . .                  | 47 |
| <i>Précoce de Trévoux</i> . . . . .              | 48 |
| <i>Provisiepeer</i> . . . . .                    | 48 |
| <i>Rémy. Saint</i> . . . . .                     | 48 |
| <i>Saint Rémy</i> . . . . .                      | 48 |
| <i>Seigneur d'Espéren</i> . . . . .              | 42 |
| <i>Sint Walfried</i> . . . . .                   | 48 |
| <i>Soldat d'Espéren</i> . . . . .                | 48 |
| <i>Soldat Laboureur</i> . . . . .                | 48 |
| <i>Souvenir de Madame Treyve</i> . . . . .       | 47 |
| <i>Souvenir du Congrès</i> . . . . .             | 48 |
| <i>Spekpeer</i> . . . . .                        | 47 |
| <i>Steenjut</i> . . . . .                        | 47 |
| <i>St. Rémy</i> . . . . .                        | 48 |
| <i>Sucrée de Montluçon</i> . . . . .             | 50 |
| <i>Super fin. Beurré</i> . . . . .               | 43 |
| <i>Sijjespeer</i> . . . . .                      | D  |
| <i>Tirlemont. Calebasse de</i> . . . . .         | 43 |
| <i>Freyve. Madame</i> . . . . .                  | 47 |
| <i>Freyve. Souvenir de Madame</i> . . . . .      | 47 |
| <i>Trévoux. Frühe von</i> . . . . .              | 48 |
| <i>Trévoux. Précocce de</i> . . . . .            | 48 |
| <i>Triomphe de Vienne</i> . . . . .              | 50 |
| <i>Vereins Dechantsbirne</i> . . . . .           | 44 |
| <i>Vienne. Triomphe de</i> . . . . .             | 50 |
| <i>Walfried. Sint</i> . . . . .                  | 48 |
| <i>Weldrager</i> . . . . .                       | 47 |

## Peren

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| <i>Wildemanspeer. Gieser</i> . . . . .       | 46 |
| <i>Williams. Bon Chrétien</i> . . . . .      | 50 |
| <i>Williams Christbirne</i> . . . . .        | 50 |
| <i>Winterjan</i> . . . . .                   | 47 |
| <i>Winterlouwte</i> . . . . .                | 50 |
| <i>Wintersuikerpeer</i> . . . . .            | 47 |
| <i>Wijnpeer. Zwijndrechtsche</i> . . . . .   | 50 |
| <i>Yat</i> . . . . .                         | 46 |
| <i>Zoete Brederode</i> . . . . .             | 43 |
| <i>Zure Brederode</i> . . . . .              | 43 |
| <i>Zwijndrechtsche Wijnpeer</i> . . . . .    | 50 |
| <b>Perziken</b> . . . . .                    | 51 |
| <i>Alexis Lepère</i> . . . . .               | 51 |
| <i>Amsden</i> . . . . .                      | 51 |
| <i>Amsden June</i> . . . . .                 | 51 |
| <i>Barrington</i> . . . . .                  | D  |
| <i>Beauce. Belle de</i> . . . . .            | 51 |
| <i>Beauce. Schöne von</i> . . . . .          | 51 |
| <i>Beausse. Belle de</i> . . . . .           | 51 |
| <i>Belle de Beauce</i> . . . . .             | 51 |
| <i>Belle de Beausse</i> . . . . .            | 51 |
| <i>Belle de Doué</i> . . . . .               | 52 |
| <i>Bellegarde</i> . . . . .                  | 54 |
| <i>Belle Impériale</i> . . . . .             | 52 |
| <i>Blanche. Madeleine</i> . . . . .          | 54 |
| <i>Blondeau</i> . . . . .                    | 52 |
| <i>Bijweg. Dido van</i> . . . . .            | 52 |
| <i>Carman</i> . . . . .                      | D  |
| <i>Carola von Sachsen. Königin</i> . . . . . | 54 |
| <i>Chancelière</i> . . . . .                 | D  |
| <i>Cornwall. Duchess of</i> . . . . .        | 52 |
| <i>Dido van Bijweg</i> . . . . .             | 52 |
| <i>Doué. Monstrueuse de</i> . . . . .        | 55 |
| <i>Doué. Belle de</i> . . . . .              | 52 |
| <i>Doué. Schöne von</i> . . . . .            | 52 |
| <i>Dubbele Montagne</i> . . . . .            | 54 |
| <i>Duchess of Cornwall</i> . . . . .         | 52 |
| <i>Duke of York</i> . . . . .                | 52 |
| <i>Dymond</i> . . . . .                      | 52 |
| <i>Eagle Sea</i> . . . . .                   | 55 |
| <i>Early. Hale</i> . . . . .                 | 54 |
| <i>Early. Wonder</i> . . . . .               | 54 |
| <i>Elberta</i> . . . . .                     | 52 |
| <i>Engelsche Zwolsche</i> . . . . .          | 55 |
| <i>France. La</i> . . . . .                  | 52 |
| <i>Frau Marie Rudolph</i> . . . . .          | 52 |
| <i>Galande</i> . . . . .                     | 54 |
| <i>George Royal</i> . . . . .                | 55 |
| <i>Greta Jonker</i> . . . . .                | 52 |
| <i>Griepenkerl. President</i> . . . . .      | 55 |
| <i>Grosse Lieblingpfirsich</i> . . . . .     | 54 |
| <i>Grosse Mignon</i> . . . . .               | 54 |
| <i>Grosse Mignonne</i> . . . . .             | 54 |
| <i>Hale Early</i> . . . . .                  | 54 |
| <i>Hale. Précoc de</i> . . . . .             | 54 |
| <i>Ide. Mevrouw</i> . . . . .                | 54 |
| <i>Impériale. Belle</i> . . . . .            | 52 |
| <i>J. H. Hale</i> . . . . .                  | 54 |
| <i>Jonker. Greta</i> . . . . .               | 52 |

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <i>June. Amsden</i> . . . . .                  | 51 |
| <i>Kernechter vom Vorgebirge</i> . . . . .     | 54 |
| <i>Kestrel</i> . . . . .                       | 54 |
| <i>Königin Carola van Sachsen</i> . . . . .    | 54 |
| <i>Königin der Obstgärten</i> . . . . .        | 55 |
| <i>Late Montagne</i> . . . . .                 | 55 |
| <i>Lepère. Alexis</i> . . . . .                | 51 |
| <i>Lieblingspfirsich. Grosse</i> . . . . .     | 54 |
| <i>Luitet. President</i> . . . . .             | 55 |
| <i>Madeleine Blanche</i> . . . . .             | 54 |
| <i>Marie Rudolph. Frau</i> . . . . .           | 52 |
| <i>Mayflower</i> . . . . .                     | 54 |
| <i>Mevrouw Ide</i> . . . . .                   | 54 |
| <i>Mignon. Grosse</i> . . . . .                | 54 |
| <i>Mignonne. Grosse</i> . . . . .              | 54 |
| <i>Monstrueuse de Doué</i> . . . . .           | 55 |
| <i>Montagne</i> . . . . .                      | 54 |
| <i>Montagne. Dubbele</i> . . . . .             | 54 |
| <i>Montagne. Late</i> . . . . .                | 55 |
| <i>Montagne. Vroege</i> . . . . .              | 54 |
| <i>Montauban</i> . . . . .                     | 54 |
| <i>Montreuil. Noire de</i> . . . . .           | 54 |
| <i>Noire de Montreuil</i> . . . . .            | 54 |
| <i>Obstgärten. Königin der</i> . . . . .       | 55 |
| <i>Octoberperzik</i> . . . . .                 | 55 |
| <i>Oranjeperzik</i> . . . . .                  | 54 |
| <i>Peregrine</i> . . . . .                     | 55 |
| <i>Précoc de Hale</i> . . . . .                | 54 |
| <i>President Griepenkerl</i> . . . . .         | 55 |
| <i>President Luitet</i> . . . . .              | 55 |
| <i>Prince of Wales</i> . . . . .               | 55 |
| <i>Professor Rudolph</i> . . . . .             | 55 |
| <i>Reine des Vergers</i> . . . . .             | 55 |
| <i>Royal George</i> . . . . .                  | 55 |
| <i>Rudolph. Der Schützenleutnant</i> . . . . . | 55 |
| <i>Rudolph. Frau Marie</i> . . . . .           | 52 |
| <i>Rudolph. Professor</i> . . . . .            | 55 |
| <i>Sachsen. Königin Carola von</i> . . . . .   | 54 |
| <i>Schöne von Beauce</i> . . . . .             | 51 |
| <i>Schöne van Doué</i> . . . . .               | 52 |
| <i>Schoone uit het Westland</i> . . . . .      | 55 |
| <i>Schützenleutnant Rudolph. Der</i> . . . . . | 55 |
| <i>Sea Eagle</i> . . . . .                     | 55 |
| <i>Sieger</i> . . . . .                        | 56 |
| <i>Sueur. Théophile</i> . . . . .              | 55 |
| <i>Théophile Sueur</i> . . . . .               | 55 |
| <i>Vainqueur. Le</i> . . . . .                 | 56 |
| <i>Vergers. Reine des</i> . . . . .            | 55 |
| <i>Victor</i> . . . . .                        | 56 |
| <i>Vilmorin</i> . . . . .                      | 56 |
| <i>Vorgebirge. Kernechter vom</i> . . . . .    | 54 |
| <i>Vroege Montagne</i> . . . . .               | 54 |
| <i>Wales. Prince of</i> . . . . .              | 55 |
| <i>Westland. Schoone uit het</i> . . . . .     | 55 |
| <i>Wonder Early</i> . . . . .                  | 54 |
| <i>York. Duke of</i> . . . . .                 | 52 |
| <i>Zwolsche. Engelsche</i> . . . . .           | 55 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| <b>Perzikonderstammen</b> . . . . . | 10 |
|-------------------------------------|----|

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Pruimen</b> . . . . .                   | 56 |
| Abricotée. Mirabelle. . . . .              | 59 |
| Abricot vert. Reine Claude . . . . .       | 60 |
| Almindelig Grön Reine Claude . . . . .     | 60 |
| Altesse blanche . . . . .                  | 58 |
| Althann. Reine Claude Comte d' . . . . .   | 59 |
| <i>Althann. Reine Claude d'</i> . . . . .  | 59 |
| Althann's Gage. Count . . . . .            | 59 |
| Althann's Renecode. Graf . . . . .         | 59 |
| Ancienne. Reine Claude . . . . .           | 60 |
| <i>Bavay. Reine Claude de</i> . . . . .    | 59 |
| Blauwe. Eldensche . . . . .                | 58 |
| Boddaerts Green Gage . . . . .             | 59 |
| <i>Boddaerts. Reine Claude</i> . . . . .   | 59 |
| <i>Boerenwitte. Dubbele</i> . . . . .      | 58 |
| Boerenwitte. Dubbele . . . . .             | 58 |
| Boerenwitte. Enkele . . . . .              | 32 |
| <i>Brahy. Reine Claude de</i> . . . . .    | 60 |
| Brahy's Green Gage . . . . .               | 60 |
| Catalogne . . . . .                        | 60 |
| Cataloniepruim . . . . .                   | 60 |
| <i>Conducte. Reine Claude de</i> . . . . . | 59 |
| Count Althann's Gage . . . . .             | 59 |
| <i>Czar</i> . . . . .                      | 56 |
| Dauphiné . . . . .                         | 60 |
| Denniston. Rouge de . . . . .              | 56 |
| Denniston's Red . . . . .                  | 56 |
| <i>Denniston's Superb</i> . . . . .        | 56 |
| Donjumer . . . . .                         | 58 |
| Dorée. Reine Claude . . . . .              | 60 |
| <i>Doyenné</i> . . . . .                   | 58 |
| Dojené . . . . .                           | 58 |
| <i>Dubbele Boerenwitte</i> . . . . .       | 58 |
| Dubbele Boerenwitte . . . . .              | 58 |
| Dubbele Witte Wijnpruim . . . . .          | 58 |
| <i>Early Laxton</i> . . . . .              | 58 |
| <i>Early Prolific. Rivers</i> . . . . .    | 58 |
| Early Rivers . . . . .                     | 58 |
| Eierpflaume. Rote . . . . .                | 60 |
| <i>Eierpruim. Roode</i> . . . . .          | 60 |
| Eldensche Blauwe . . . . .                 | 58 |
| <i>Engelbert. Prince</i> . . . . .         | 59 |
| Gage. Boddaerts Green . . . . .            | 59 |
| Gage. Brahy's Green . . . . .              | 60 |
| Gage. Count Althann's . . . . .            | 59 |
| Gage. Green . . . . .                      | 60 |
| Gage. Oullins . . . . .                    | 60 |
| Gelbe Mirabelle . . . . .                  | 59 |
| <i>Gerstetter. Ruth</i> . . . . .          | 60 |
| <i>Golden Japan</i> . . . . .              | 58 |
| Graf Althann's Renecode . . . . .          | 59 |
| Green Gage . . . . .                       | 60 |
| Green Gage. Boddaerts . . . . .            | 59 |
| Green Gage. Brahy's . . . . .              | 60 |
| Groene Reine Claude. Grootte . . . . .     | 60 |
| Grön Reine Claude. Almindelig . . . . .    | 60 |
| Grön Reine Claude. Vanlig . . . . .        | 60 |
| Grootte Groene Reineclaude . . . . .       | 60 |
| Grosse Grüne Renecode . . . . .            | 60 |
| Hvit Jungfruplommon . . . . .              | 58 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Impériale . . . . .                               | 60 |
| <i>Japan. Golden</i> . . . . .                    | 58 |
| <i>Jefferson</i> . . . . .                        | 58 |
| Jungfernpflaume . . . . .                         | 58 |
| Jungfruplommon. Hvit . . . . .                    | 58 |
| <i>Kirke's</i> . . . . .                          | 59 |
| <i>Kwets. Zoete</i> . . . . .                     | 62 |
| <i>Laxton. Early</i> . . . . .                    | 58 |
| Magnum bonum. Red . . . . .                       | 60 |
| Massot . . . . .                                  | 60 |
| Metzer Mirabelle . . . . .                        | 59 |
| <i>Metz. Mirabelle de</i> . . . . .               | 59 |
| Mirabelle abricotée . . . . .                     | 59 |
| <i>Mirabelle de Metz</i> . . . . .                | 59 |
| Mirabelle. Gelbe . . . . .                        | 59 |
| Mirabelle. Metzzer . . . . .                      | 59 |
| Mirabelle petite . . . . .                        | 59 |
| Mirabelle précoce . . . . .                       | 59 |
| Oullins Gage . . . . .                            | 60 |
| <i>Oullins. Reine Claude d'</i> . . . . .         | 60 |
| Petite. Mirabelle . . . . .                       | 59 |
| Précoce. Mirabelle . . . . .                      | 59 |
| <i>President</i> . . . . .                        | 59 |
| <i>Prince Englebert</i> . . . . .                 | 59 |
| Prolific. Rivers' Early . . . . .                 | 58 |
| Prune virginale . . . . .                         | 58 |
| Red. Denniston's . . . . .                        | 56 |
| Red Magnum bonum . . . . .                        | 60 |
| Reine Claude Abricot vert. . . . .                | 60 |
| Reine Claude Almindelig Grön . . . . .            | 60 |
| Reine Claude Ancienne . . . . .                   | 60 |
| Reine Claude Comte d'Althann . . . . .            | 59 |
| <i>Reine Claude d' Althann</i> . . . . .          | 59 |
| <i>Reine Claude de Bavay</i> . . . . .            | 59 |
| <i>Reine Claude de Boddaerts</i> . . . . .        | 59 |
| <i>Reine Claude de Brahy</i> . . . . .            | 60 |
| <i>Reine Claude de Conducta</i> . . . . .         | 59 |
| Reine Claude dorée . . . . .                      | 60 |
| <i>Reine Claude d'Oullins</i> . . . . .           | 60 |
| Reine Claude. Grootte Groene . . . . .            | 60 |
| Reine Claude. Vanlig Grön . . . . .               | 60 |
| <i>Reine Claude verte</i> . . . . .               | 60 |
| Renecode. Graf Althanns . . . . .                 | 59 |
| Ringelot . . . . .                                | 60 |
| Rivers' Early . . . . .                           | 58 |
| <i>Rivers' Supérieur Early Prolific</i> . . . . . | 58 |
| <i>Roode Eierpruim</i> . . . . .                  | 60 |
| <i>Rosa. Santa</i> . . . . .                      | 60 |
| Rothe Eierpflaume . . . . .                       | 60 |
| Rouge de Denniston . . . . .                      | 56 |
| <i>Ruth Gerstetter</i> . . . . .                  | 60 |
| <i>Santa Rosa</i> . . . . .                       | 60 |
| <i>Superb. Denniston's</i> . . . . .              | 56 |
| <i>Utility</i> . . . . .                          | 60 |
| Vanlig Grön. Reine Claude . . . . .               | 60 |
| <i>Verte. Reine Claude</i> . . . . .              | 60 |
| Victoire. Reine . . . . .                         | 60 |
| <i>Victoria</i> . . . . .                         | 60 |
| Victoria blomme . . . . .                         | 60 |
| Victoria Dronning . . . . .                       | 60 |



## Pruimen

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Virginal. Prune . . . . .          | 58 |
| Washington falso . . . . .         | 60 |
| Wijnpruim. Dubbele Witte . . . . . | 58 |
| Witte Wijnpruim. Dubbele . . . . . | 58 |
| Zoete Kwets . . . . .              | 62 |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Pruimonderstammen . . . . .</b> | <b>10</b> |
|------------------------------------|-----------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Vijgen . . . . .</b> | <b>62</b> |
|-------------------------|-----------|

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Zwarte bessen . . . . .</b> | <b>62</b> |
|--------------------------------|-----------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <i>Baldwin</i> . . . . .        | 62 |
| Black. Hoogendijks . . . . .    | 63 |
| Boskoop. Géant de . . . . .     | 63 |
| Boskoop Giant . . . . .         | 63 |
| <i>Davison Eight</i> . . . . .  | 63 |
| Edina (zie Goliath) . . . . .   | 63 |
| <i>Eight. Davison</i> . . . . . | 63 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Géant de Boskoop . . . . .             | 63 |
| Giant. Boskoop . . . . .               | 63 |
| <i>Goliath</i> . . . . .               | 63 |
| <i>Goliath. Roodknop</i> . . . . .     | 63 |
| <i>Hollandsche Zwarte</i> . . . . .    | 63 |
| Hoogendijks Black . . . . .            | 63 |
| <i>Hoogendijks Seedling</i> . . . . .  | 63 |
| Langtraubige Schwarze . . . . .        | 63 |
| Naples. Noir de . . . . .              | D  |
| Noir de Naples . . . . .               | D  |
| Roodknop . . . . .                     | 63 |
| Schwarze. Langtraubige . . . . .       | 63 |
| Schwarze Traube . . . . .              | 63 |
| <i>Seedling. Hoogendijks</i> . . . . . | 63 |
| <i>Silvergieters Zwarte</i> . . . . .  | 63 |
| Teunissen . . . . .                    | 63 |
| Traube. Schwarze . . . . .             | 63 |
| Zwarte. Hollandsche . . . . .          | 63 |
| Zwarte. Silvergieters . . . . .        | 63 |

De hierin geannonceerde kweekers en kweekerijen laten hun gewassen keuren door de bij den Nederlandschen Algemeenen Keuringsdienst aangesloten Keuringsdiensten en geven dus de bekende garanties voor rasechtheid en gezondheid.