

AANVOER VAN MEST IS ÓÓK AANVOER VAN ZIEKTEVERWEKKERS

Aanvoer van mest van andere bedrijven kan uw ruwvoerproductie optimaliseren. Maar, aanvoer van mest is ook aanvoer van de ziekteverwekkers die in de mest zitten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan salmonella, paratuberculose-bacteriën en de varkensspoolworm *Ascaris suum*.

Het was al bekend dat de aanvoer van varkensmest samengaat met een hogere kans op uitbraken door *Salmonella* Typhimurium. Recent onderzoek laat nu ook zien dat Nederlandse melkveebedrijven die herkauwermest aanvoeren vaker een ongunstige paratuberculosestatus hebben dan bedrijven die geen mest aanvoeren. Ook is er een trend dat aanvoer van herkauwersmest op bedrijven met een gunstige paratuberculosestatus vaker tot verlies van die status leidt.

Advies

GD adviseert u om géén mest aan te voeren vanwege de risico's voor de diergezondheid. Als het ondanks deze risico's toch nodig is om mest aan te voeren, voer dan alleen mest aan van bedrijven met een gunstige status voor paratuberculose en salmonellose. Bovendien kunt u vóór aanvoer mestputmonsters van het herkomstbedrijf laten onderzoeken op salmonella- en paratuberculosebacteriën.

Gebruik de aangevoerde mest alleen op bouwland om het risico op verspreiding van ziektekiemen uit de mest te verkleinen. Als u toch grasland bemest met aangevoerde mest, dan kunt u het risico op besmetting met salmonella verminderen door na het uitrijden minimaal zes weken te wachten met het beweiden van runderen op dat perceel én tussen het uitrijden en beweiden ten minste één kuil- of hooisnede te plannen. Voer in deze periode ook geen vers gras afkomstig van dit land. Als u de mogelijkheid heeft, dan kunt u het risico nog verder verminderen door de mest voor uitrijden ten minste vier maanden apart op te slaan.

Paratuberculosebacteriën blijven op grasland langer dan twaalf maanden besmettelijk en overleven het inkuielen. Aangevoerde runder- of geitenmest van een bedrijf met een paratuberculosebesmetting is daarom niet veilig te gebruiken op grasland dat bestemd is voor ruwvoerwinning of beweiding. Als u dergelijke mest op grasland heeft gebracht, verstrek dan geen ruwvoer van dit grasland aan uw jongvee. Jongvee is gevoeliger voor de infectie dan volwassen runderen.



Foto van het verzamelen van een mestputmonster met een twee meter lange ¾-inch PVC-buis