
Natuur Ambitie Grote Wateren
Factsheet Amerongse Bovenpolder

Fabrice Ottburg, Dennis Lammertsma, Gilbert Maas, John Janssen en Alex Schotman



Aanleiding

In het kader van ruimte voor de rivier is in het verleden het kwelmoeras gerealiseerd in de Amerongse Bovenpolder. Destijds zijn hier geen concrete ecologische doelen aan verbonden. Binnen NAGW is in 2018 en 2019 gekeken wat de ecologische effectiviteit van de maatregel is ofwel welke natuurwaarden zijn in het kwelmoeras e.o. aangetroffen?







Vissen

in totaal zijn 20.196 vissen gevangen en in het kwelmoeras is de meest voorkomende vis de exotische blauwband (n 13.345), die verspreidt door het hele gebied in hoge dichtheden voorkomt. Daarnaast zijn het voornamelijk giebels, witvingrondels en karpers. En 929 bittervoorns. Typische soorten voor kwelmoeras zoals grote modderkruiper, zeelt en rietvoorn ontbreken in het kwelmoeras.

ALTERRA
WAGENINGEN UR

Contactpersoon: Fabrice Ottburg
Telefoon/mail 0317-486115 of fabrice.ottburg@wur.nl

Natuur Ambitie Grote Wateren
Factsheet Amerongse Bovenpolder

Bever & Otter

Er zijn minimaal drie beverburchten aanwezig en de bever heeft hier vaste voet aan wal gekregen. Rondom het kwelmoeras is voldoende voedsel, voornamelijk in de vorm van wilg, aanwezig om jaarrond hier te verblijven. De otter is niet in de Amerongse Bovenpolder aangetoond.







Vegetatie

In de onderzone van de Utrechts Heuvelrug/stuwwal wordt een strook grasland gemaaid om kwel beïnvloedend grasland te ontwikkelen (dotterbloem hooilanden) met soorten als echte koekoeksbloem en scherpe zegge. Heel lokaal begint dit type te ontstaan, maar er is een lange adem nodig om via hooilandbeheer een soortenrijke vegetatie te ontwikkelen.



Iets hoger in de zonering bevindt zich een strook hardhout ooibos die op dit moment van goede kwaliteit is met soorten als gewone vogelmelk en slangenlook. Voor dit habitattype 91F0 is het belangrijk om langdurig de ontwikkelingen te volgen om te weten of er positieve of negatieve ontwikkelingen plaats vinden. De ontwikkeling van het kwelmoeras in de uiterwaard zelf komt qua typische kwelvegetatie niet opgang, waarschijnlijk door de voedselrijke en dynamische omstandigheden (invloed van de rivier). De enige kwelindicatoren die zijn aangetroffen bij de waterplanten groeien in de aanwezige kleine poelen. Het gaat hier voornamelijk om waterviolier.

Natuur Ambitie Grote Wateren
Factsheet Amerongse Bovenpolder



Amfibieën

Voor de Amerongse Bovenpolder geldt dat hier een grote paddentrek (gewone pad) van enkele tienduizenden dieren aanwezig is en zich voortplanten in de poelen rondom en in het kwelmoeras. Daarnaast zijn vooral in het oosten en meer richting de rivier rugstreeppadden aangetroffen, evenals groene- en bruine kikkers.






Inrichting i.r.t. tot droogte en intensiteit van begrazing


In de Amerongse Bovenpolder is een hoge begrazingsdruk van Konikpaarden en Galloways. Dit viel vooral op rondom de Put van Schoonhoven waar nauwelijks oevergebonden flora aanwezig is. Aanbevolen wordt om hier dynamisch uit rasteren toe te passen. Ondanks de hoge veedichtheid in het gebied zorgt de schaal van het gebied ervoor dat grote delen van de Amerongse Bovenpolder minder te leiden hebben van de grazers.

Vogels

Het kwelmoeras in de Amerongse Bovenpolder is eigenlijk meer een rietmoeras met grotere waarden voor moerasvogels, dan voor kwelgebonden vegetaties en vogelsoorten. Kenmerkend is de grote kolonie lepelaars (n 90) die vanuit de Blauwe kamer komen foerageren in de Amerongse Bovenpolder. Meer richting de rivier in het natte begraasde grasland broeden weidevogels, graspiepers en pleisteren veel watersnippen. In de rietkragen zitten zowel broedende als overwinterende waterrallen. (n 5).







ALTERRA
WAGENINGEN UR