









## Bestrijding van grassen

In boontjes moet je bijna altijd rekening houden met hanenpoot. Op sommige percelen is straatgras of raaigras vaak nog een extra aandachtspunt.

Wacht niet te lang met ingrijpen, want vaak zien we hanenpoot uitgroeien tot een 'struisvogelpoot'.

Fusilade Max, Select Prim, Centurion en Focus Plus zijn toegelaten (zie tabel 3). Select Prim en Centurion bestrijden zowel straatgras als hanenpoot.

Fusilade Max en Focus Plus hebben geen werking tegen straatgras. Fusilade Max en Focus Plus pas je het best apart toe. Select Prim en Centurion daarentegen kan je mengen met Basagran SG, Bentazon of Corum.

## Geen tolerantie voor zwarte nachtschade en doornappel

### Zwarte nachtschade en doornappel in opmars

Op veel percelen zien we een groot aandeel van zwarte nachtschade en doornappel. Door de warme zomers kunnen deze thermofiele onkruiden vroeger en ook langer kiemen. Ook door het wegvallen van Linuron in de teelt van wortelen en knolselderij zijn de bestrijdingsmogelijkheden met het huidige middelenpakket onvoldoende. Als gevolg daarvan blijven er meer planten over die kiemkrachtige zaden kunnen produceren.

In de teelt van boontjes zijn Basagran SG of Corum onze enige troef om kiemplanten van zwarte nachtschade of doornappel te bestrijden. Hou er ook rekening mee dat een extra behandeling nodig is wanneer na een succesvolle bestrijding toch nieuwe plantjes tevoorschijn komen. In bonen mag je in

**Eén zaaddoosje van een doornappel bevat heel veel zaden en op één plant groeien vaak tot tien van deze 'verpakkingen'. Van één overgebleven plant krijg je veel nakomelingen.**

totaal slechts 1,1 kg Basagran SG fractie oneren. Bovendien is de wachttijd 4 dagen ... in een teelt die vaak maar 60 groeidagen kent.

### Doornappel verwijderen

Sommige doornappelcultivars zijn zeer mooie en imposante kuipplanten, die mooi staan in woonkamers en veranda's. In binnens zijn de grote klokkenbloemen, ook wel engelentrompetten genoemd, een ware streling voor het oog. De doornappels die we nu steeds vaker opmerken in het veld zijn eigenlijk 'verwilderde' cultivars van deze kuipplanten.

Doornappel behoort tot dezelfde plantenfamilie als zwarte nachtschade en is giftig, net als zijn 'kleine broertje'. Niet alleen de plant is giftig, maar ook de zaden blijken zeer giftig te zijn. Wanneer je deze giftige onkruiden uittrekt en op het veld laat liggen, kunnen ze nog met de oogstmachine meegenomen worden. Dat moet je absoluut vermijden, want voedselveiligheid staat vandaag boven alle wetten. Er zit dus niets anders op dan deze planten van het veld te verwijderen, want ze vormen een gevaar in de voedselketen én je mag de rijpe zaden niet op je percelen achterlaten. Draag handschoenen! ■



Kiemplantjes van zwarte nachtschade en doornappel



Overgebleven planten van doornappel worden niet geoogst.



De bessen van zwarte nachtschade zijn dodelijk en mogen niet geoogst worden.