









uit. Safari wordt vaak nog laat toegepast om haagwinde te onderdrukken. Wanneer je inderdaad lang genoeg wacht, tot kort voor het sluiten van de rijen, dan kan de hoogste dosering van Safari de groei van haagwinde wat afremmen. Van een bestrijding is echter geen sprake. Akkerwinde (roze bloem) is daarentegen ongevoelig voor Safari. Matrigon is dan wel een heel goede keuze om distel of melkdistel te bestrijden. Wacht lang genoeg tot de distels groot genoeg zijn en pas Matrigon toe bij warm weer en ook liefst op een vochtige bodem, dan is de sapstroom van distel optimaal. Toch is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan, want distel en melkdistel kent een heel heterogene opkomst en vaak zien we distels met een bloemknop en terzelfdertijd distels die nog maar net tevoorschijn komen. Je moet dus een compromis maken ...

**In aardappelen.** Aardappeltelers hebben alsmar meer last van haagwinde. Wanneer je niet ingrijpt, dan heb je aan het einde van het groeiseizoen een volledige vegetatie van haagwinde op je gewas. In deze teelt krijgt haagwinde

ook veel meer kansen om zich verder te verspreiden in het perceel omdat tijdens de oogst vele gebroken wortelstukken op andere plekken in perceel terechtkomen en daar een nieuw leven kunnen beginnen. In aardappelen is Titus onze enige troef om haagwinde aan te pakken. Titus onderdrukt eveneens akkerdistel, melkdistel en opslag van cichorei (niet ALS-resistente rassen). Akkerwinde en veenwortel zijn daarentegen niet gevoelig. Titus kan je veilig toepassen in combinatie met een fungicide, maar kies dan wel best voor een poedervormig plaagmiddel. Enkele plaagmiddelen zoals bijvoorbeeld Ranman Top kunnen dankzij hun specifieke adjuvant de werking verbeteren. Gebruik 40 g Titus en voeg daar 20 g 300 ml Trend (100 ml per 100 l spuitvolume) aan toe. Een tweede behandeling is vaak noodzakelijk.

**In mais.** Hier is het toemen van Callam, Kart, Casper, Starane Forte of Banvel in de meeste herbicide schema's ingeburgerd of zelfs standaard geworden. Ook thien-carbazone (een component van Caspero of Monsoon Activ)

heeft een werking. Haagwinde wordt daardoor dus afgeremd, maar enkele weken na een behandeling verschijnen er weer planten die gegroeid zijn vanuit andere wortelstukjes. Na het 10 bladstadium van mais zijn de vernoemde herbiciden niet meer veilig. Primus daarentegen heeft het voordeel dat het op iets grotere mais kan gebruikt worden aan een dosering van 50 ml/ha, best nog eens aangevuld met Peak. Dat is het veiligste middel in een laat maisstadium en kan dus ook eventueel nog gebruikt worden als late correctie tegen haagwinde. Tegen veenwortel is Banvel de beste keuze en tegen distel en melkdistel kan je Matrigon veilig gebruiken tot een gewashoogte van ongeveer 50 cm (10 bladstadium).

**In vollegroondsgroenten.** Matrigon is het enige groeistofherbicide dat veilig kan gebruikt worden in enkele koolsoorten en dus ook de enige troef voor de bestrijding van doorlevende onkruiden. Maar met Matrigon kan je enkel distel bestrijden, haagwinde en veenwortel zijn niet gevoelig. In uien is Starane Forte een troef tegen haagwinde. ■

Tabel 1. Behandelingsmogelijkheden op diverse gewassen

	Distel/melkdistel	Veenwortel	Haagwinde	Akkerwinde
Aardappelen	Tijdens de teelt Titus + Trend	Tijdens de teelt Geen bestrijding	Tijdens de teelt Titus + Trend	Tijdens de teelt Geen bestrijding
Bieten	Tijdens de teelt Matrigon + Oxi	Tijdens de teelt Geen bestrijding	Tijdens de teelt Safari	Tijdens de teelt Geen bestrijding
Granen	Tijdens de teelt Trevistar, Allie, Bofix Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Bofix + Allie Na de oogst Glyfosaat (+ groeistof)	Tijdens de teelt o.a. Starane, Primstar, Trevistar Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt o.a. Starane, Primstar, Trevistar Na de oogst Glyfosaat + groeistof
Mais	Tijdens de teelt Matrigon Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Banvel Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Callam, Casper, Kart Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Callam, Casper, Kart Na de oogst Glyfosaat + groeistof
Wortelen	Verbranden met een driedelige combinatie	Verbranden met een driedelige combinatie	Toki	Toki ?
Erwten	Butizyl	Geen bestrijding	Butizyl	Butizyl
Kolen	Matrigon	Geen bestrijding	Geen bestrijding	Geen bestrijding
Uien	Geen bestrijding	Verbranden met Xinca	Starane Forte	Starane Forte
Bonen	Gezien de late zaaidatum kan je eventueel voor de teelt nog glyfosaat toepassen. Gebruik nooit groeistoffen, want die hebben een schadelijke nawerking tijdens de opkomst van bonen.			

In granen is een vooroogsttoepassing met glyfosaat niet meer toegelaten