


Vernevelapparaat via opening in buitendeur.

ning laten boren in de poort. Wanneer er een grote schuifpoort aanwezig is, dan kan een isolatieplaat geklemd worden tussen de schuifpoorten.

Wanneer starten en keuze van middelen

We merken dat de eerst ingeschuurde partijen al tekenen van kieming verto-

nen: witte puntjes tot kiemen van enkele millimeter. Controleer je partijen en stem de kiemremming hierop af. 1,4 Sight is een kiemrustverlenger (toepassen wanneer nog geen kiemen of puntjes zichtbaar zijn), de etherische oliën (Biox-M en Argos) zijn erop gericht de kieming stop te zetten. Met deze middelen kan er ook iets later curatiever worden gestart.



Tab. 13. Keuze van kiemremmer naargelang de kieming van de aardappelen

	Geen kiemen 1	Witte punten 2	Kiem 1 mm 3	Kiem 2 mm 3	Kiem > 3 mm 4
1,4 Sight	ideaal	ideaal	mogelijk	Af te raden	Af te raden
Biox-M	Af te raden	ideaal	ideaal	ideaal	mogelijk
Argos	Af te raden	ideaal	ideaal	ideaal	mogelijk

■ ideaal
 ■ mogelijk
 ■ Af te raden

De toepassing

Controleer vooral of ...

- je voldoende stroom hebt: 380 V en 32 A voor Synofog en 18 A voor Electrog;
- het middel (1,4Sight, Argos of Biox-M) op kamertemperatuur is;
- de aardappelen in de hoop droog zijn;
- minstens 40% van het volume van loods gevuld is met aardappelen.

Het toestel opstellen in besterende opening afdichten met een doek.

Schaalvolume aardappelen om middel juist kunnen doseren.

Kijk voor de behandeling extern ventilatoren in aanwezige CO₂ af te voeren.

Start toepassing vijf minuten na inschakelen van de interne ventilatie en sluiten van externe luiken.

Tijdens toepassing de ventilatoren op 80 à 100% capaciteit laten draaien. Wanneer de behandeling is afgelopen, nog een uur ventileren tot mist deels is opgetrokken.

Na de toepassing de loods minimaal 48 uur gesloten houden. Het middel wordt dan goed opgenomen door de knollen. Het is wel belangrijk om op regelmatige tijdstippen de ventilatoren te laten draaien zodat het gas nogmaals doorheen de aardappelen kan worden gestuurd.

Na 48 uur mag je opnieuw loods betreden en kan gewone bewaarregime verder worden gezet. Voorkom dat er na de toepassing overmatig extern geventileerd wordt. Aardappelen die langdurig en veel (extern) geventileerd worden vanwege rot, zijn minder geschikt om met deze middelen te behandelen.

Regelmatig de knollen controleren op (nieuwe) kieming. 1,4Sight, Biox-M en Argos hebben een kenmerkende geur. Als de geur verdwenen is, dan wil dit zeggen dat binnenkort een nieuwe behandeling noodzakelijk is. Interval tussen de behandelingen variëren tussen vier en zes weken.