



Terugwerking of curatief. Wanneer een spore op het blad kiemt, dan groeien korte tijd nadien de schimmeldraden in het blad zelf. Wanneer dit nog maar pas gebeurd is, kunnen enkele middelen deze binnengedrongen plaagspore 'terugroepen'. De werkzame stof cymoxanil werkt maximaal 48 uur terug. Deze werkzame stof is beschikbaar in vele handelsmiddelen (tabel 2). Vergeet niet dat cymoxanil maar een drietal dagen nawerkt, de andere component of mengpartner zorgt voor de beschermende werking en nawerking. Enkele andere spelers hebben een heel beperkte terugwerkende kracht: Acrobat, Orvego Star (+ Dash), Banjo Forte, Valbon, Valis, Infinito en Zorvec Enicade.

Nawerking en bescherming van nieuwe groei. Kort na de opkomst groeit een aardappelgewas zeer snel, 'soms zelfs twee dagen per dag'. Met

een bespuiting moeten niet alleen reeds aanwezige bladeren, maar ook nog te ontluiken bladeren beschermd worden. Sommige middelen die worden toegepast op een bladknop of op een pas ontloken blaadje kunnen nog een beetje meegroeiën. Deze eigenschap is zéér belangrijk in het begin van de gewasontwikkeling. Volgende



Middelen die hoog scoren bij de nieuwe groei zijn de beste spelers voor de vroege behandelingen wanneer in het begin het loof twee dagen per dag groeit.

middelen doen dit zeer goed: Ranman, Revus, Infinito en Zorvec Enicade.

Nu curatief starten. Al vanaf de eerste behandeling moet je starten met cymoxanil, omdat deze werkzame stof een goede terugwerking heeft en dus nog meer zekerheid biedt. Op perceel en waar de aardappelen al snel beginnen te groeien, moet je kiezen voor een combinatie van cymoxanil met een middel dat de nieuwe groei beschermt. Op zeer grote aardappelen die neigen tot sluiten van de rijen worden de twee bovenstaande eigenschappen best gecombineerd met een antisporende werking die eventuele sporenvorming stopst. Volgende middelen hebben deze eigenschap: Zorvec Enicade, Acrobat, Orvego Star (+ Dash), Valbon, Valis, Banjo Forte, Proxanil, Infinito. Tabel 2 geeft een voorbeeld van mogelijke combinaties of middelen in functie van de gewasgrootte. ■

Tabel 2. Voorbeeld van enkele goed gekozen combinaties naargelang de situatie

Aardappelen die beginnen opkomen	Aardappelen die al een bloempot groot zijn	Aardappelen die neigen op te sluiten
<p>Best starten met Combinatie Cymoxanil + Mancozeb* 2 à 2,5 kg Kunshi 0,5 à 0,5 kg Afenato SC 0,6 l Cymopur/cymbal + revus 0,6 l Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0,6 kg</p>	<p>Wanneer nog geen behandeling Revus 0,6 l + Cymopur / cymbal Ranman Top 0,5 l + Cymopur / cymbal Infinito 1,6 l + Cymopur / Cymbal Zorvec Enicade Pack Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0,6 kg</p>	<p>Wanneer nog geen behandeling Proxanil 2 l + Ranman Top 0,5 l / Revus 0,6 l Infinito 1,6 l + Cymopur / Cymbal Zorvec Enicade Pack</p>
<p>Nawerking Zorvec Enicade Pack Revus 0,6 l (+ Cymopur / Cymbal) Infinito 1,6 (+ Cymopur / Cymbal) Pergovi flex / Amphore flex / Regulance Flex 0,6 kg Kunshi 0,5 Afenato SC 0,6 Valbon 1,6 / Acrobat 2 / Valis M 2,5 / Orvego Extra 2,5 + Cymopur / Cymbal Banjo Forte 1 (+ Cymopur / Cymbal) Orvego Star 0,8 (+ Cymopur / Cymbal)</p>		

*vele handelsnamen
 Cymopur 35%: 0,26 à 0,32 kg – Cymbal 45%: 0,2 à 0,25 kg



© FOTO'S: TWAN WIERMANS