









Vroege invasie van de coloradokever op een jonge aardappelplant.

waarna de cyclus opnieuw begint. In het kader van IPM is het daarom ook zeer belangrijk dat opslagplanten uit afvalhopen en andere teelten verwijderd worden. Voorkomen is immers beter dan genezen.

De kevers moeten worden bestreden indien er zichtbare vraatschade is of al er larven worden waargenomen. Het zijn immers vooral de larven die op korte tijd veel blad kunnen wegvreten. De bestrijding moet gebeuren met een selectief insecticide en niet met pyre-

troïden, zodat de natuurlijke vijanden kunnen worden gespaard. Controleer het gewas zeker ook steeds op de eventuele aanwezigheid van perzikluis en vuilboommuis, zodat het juiste middel kan worden gekozen. De erkende insecticiden vind je in tabel 3. Hou er rekening mee dat Antilop SG en Gazelle SG niet erkend zijn voor gebruik in Wallonië. Tepeki en Movento hebben enkel een werking tegen luizen. Bovendien mag Movento pas worden ingezet na de bloei.

Tabel 3. Erkende insecticiden tegen luizen en kevers

Product	Dosis	Aantal toepassingen	Wachttijd	Perzikluis	Vuilboommuis	Colorado-kever
Mospik	0,3 l	1	14 dagen	**	**	niet erkend
Tepeki	0,16 kg	2	14 dagen	***	***	-
Tracer	50 ml	1	14 dagen	-	-	***
Coragen	50 ml	1	14 dagen	-	-	***
Movento	0,75 l	4	14 dagen	***	***	-
Boravi WG	1 kg	1	-	-	-	***
Antilop/ Gazelle*	0,25 kg	2	14 dagen	***	***	niet erkend

\*Enkel in Vlaanderen erkend

## Doorlevende onkruiden in tarwe

Met het verschijnen van de aren in de tarwe zien we op sommige percelen nu ook doorlevende onkruiden zoals distels, veenwortel, haagwinde en akkerwinde boven het gewas uit komen (zie onderstaande foto). In dit stadium van de tarwe en na de bloei zijn vroege toepassingen erkend om doorlevende onkruiden te bestrijden. In vroeger tijden was een herfstbespuiting met glyfosaat een vaak voorkomende toepassing. Maar ook dit is niet meer toegelaten. Wie deze onkruiden nog wilt bestrijden kan dit na de oogst op de velden doen met een combinatie van glyfosaat en groeistoffen. Hou er rekening mee om de verhouding glyfosaat-groeistof steeds 3/1 of 2,5/1 te houden, om problemen in de tank te vermijden. Vermits groeistoffen een nawerking hebben, wacht je best enkele weken na de toepassing om breedbladige groenbesters (zoals gele mosterd) in te zaaien. ■



Haagwinde kruipt omhoog in het gewas.