

Uit de praktijk

Zo hoort het niet

Toen één der gemeentelijke rattenbestrijders in zijn rayon een opgegeven adres bezocht, waar last van bruine ratten werd ondervonden, trof hij in een vertrek een gevulde open vuilnisemmer aan.

Op zijn vraag aan de bewoonster of ze uit liefhebberij ratten fokte, kreeg hij nuchter ten antwoord: „die beesten moeten toch óók leven”.

En zo ook niet

Iemand, bij wie een respectabele bruine rat-familie op genoeglijke wijze met de varkens samenhokte, besloot aan dit euvel radicaal een einde te maken.

Hij kocht enkele bussen (strooipoeder) en deponeerde de inhoud daarvan in de varkenshokken.

Daar speciaal varkens voor cumarine-middelen (waartoe ook behoort) zeer gevoelig zijn, moet in zo'n geval toch in alle ernst de vraag worden gesteld of men met de ratten ook de varkens wil opruimen.

Maar zó

Eén onzer ambtenaren bezocht iemand die had geklaagd over schade door bruine ratten bij kippen en varkens.

De gedupeerde had in de varkensstal strooipoeder gebruikt.

De volgende dag vond hij bij de controle in de voerbakken der varkens afgedruken van rattenpoten.

Uit vrees voor vergiftiging van de varkens heeft hij toen het poeder uit de varkenshokken verwijderd.

Dit was een verstandige boer. Het gevaar is nl. zeer reeël dat varkens, vooral jongere dieren, die gedurende langere tijd sporen van cumarine binnen krijgen, hieraan sterven.

Wij kunnen hieraan nog eens de ernstige waarschuwing vastknopen:

1. gebruik geen strooipoeder, als er kans bestaat dat dit door de ratten in de varkenshokken wordt gelopen.
2. Verwijder, bij gebruik van een cumarine-middel, onverwijld dode ratten!

Te laat!

In het voorjaar 1953 had een boer in Noord-Brabant bij het uitdorsen van het laatste graan, in zijn kleine boerderij 197 ratten doodgeslagen.

De laatste haver was bijna geheel door de ratten opgevreten. De schade bedroeg ruim f 200.

Steeds weer kuikenroof

Uit verscheidene delen van het land bereikten ons de laatste maanden weer klachten over het brutale optreden van bruine ratten in kuikenfokkerijen.

De verliezen in één nacht aan jonge hennen en kuikens varieerden van 70 tot 160 stuks.