

Bruin rat

Cliche 183



Cliche 184



CUMARINE IN SLOOT- EN GRACHTWALLEN

De heer J. IJsinga, gemeentelijke rattenbestrijder in Ulrum (Gr.) schrijft ons het volgende.

Meermalen gebeurt het, vooral in de omgeving van boerderijen, dat ratten zich verschansen in de wallen van sloten en grachten. Ongeveer ter hoogte van de normale waterstand bevinden zich dan de toegangswegen tot de hollen (fig. 1).

Het is moeilijk in dergelijke gevallen een afdoende bestrijding toe te passen, althans zo was aanvankelijk mijn ervaring.

In deze gaten had ik scilla-blokjes gelegd in de hoop, dat op deze wijze de ratten zouden worden vergiftigd. Het resultaat was evenwel niet bevredigend.

Na overleg met Wageningen werd een andere werkwijze toegepast. Op zichzelf heel eenvoudig, doch men moet op het idee komen. Er is als volgt te werk gegaan.

In de gracht werden voor de toegangen naar de hollen enkele brede planken gelegd. Een paar paaltjes werden aan de buitenkant geslagen om te voorkomen, dat de planken zouden gaan afdrijven.

Een soort vlot dus. Op dit vlot werd vervolgens haver met cumarine uitgestrooid en afgedekt met een leeg poot aardappelkistje om te voorkomen, dat andere dieren zich te goed zouden doen aan deze maaltijd.

Op fig. 2 ziet U het verrassende en ook bevredigende resultaat. De afgebeelde rat werd op korte afstand in de wal gevonden, kennelijk vergiftigd met cumarine.

Ik meende goed te doen deze methode even mede te delen; wellicht dat dit andere collega's van nut kan zijn.

J. IJsinga,
gem. rattenbestrijder Ulrum (Gr.)