

Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022

Een dunne gewasstand (rechts) door het bietenkevertje als gevolg van biet-op-biet. Tot 30 meter over de perceelsgrens van het voorgaande jaar kan dit effect hebben.

Terwijl telers volop bezig zijn met oogstwerkzaamheden, is het goed om al na te denken over de perceelskeuze voor suikerbieten in 2022. Hierdoor is er nog tijd om maatregelen te treffen mocht blijken dat het perceel niet geschikt is.

Over het algemeen kennen telers hun eigen percelen ontzettend goed. Dit is niet altijd het geval voor huurpercelen. Door vooraf voldoende informatie over een huurperceel te verzamelen, komt men geen ongewenste verrassingen tegen.

Gewasrotatie

Als de laatste bietenteelt op het perceel minder dan drie jaar geleden is, is het af te raden om suikerbieten te telen vanwege de grote kans op hoge dichtheden van ziekten en plagen. Dit is na te gaan op www.boerenbunder.nl. Wanneer het langer dan drie jaar geleden is dat er bieten stonden is het goed om onderstaande punten na te gaan.

Ziekten en plagen

Op percelen kunnen diverse ziekten en plagen aanwezig zijn. Een aaltjesmonster geeft inzicht in de hoeveelheid schade die door onder andere trichodoriden en wortelknobbelaaltjes te verwachten is. Percelen biet-naast-biet vormen een risico voor bladschimmels en op kleigronden ook voor bietenkevers. Ook voor de beheersing van andere ziekten en plagen is perceelskennis belangrijk. Via het bodemplagenschema, bodemschimmelschema en aaltjeswaardplantschema is te achterhalen welke ziekten en plagen men nog meer kan verwachten bij bepaalde voorvruchten.

Herbicidenschade

Door na te gaan welke herbiciden in 2021 zijn toegepast, kan worden nagekeken of herbicidenschade te verwachten is. In veel gevallen is dit te voorkomen door een kerende grondbewerking (ploegen) uit te voeren. Op www.ctgb.nl is de informatie per middel terug te vinden.

Bemesting

Het is belangrijk dat de pH voor de bietenteelt voldoende hoog is. Bij najaarsbekalking heeft de kalkmeststof genoeg tijd om voor de gewenste pH-verhoging te zorgen. Daarom is het advies reeds nu een grondmonster te laten analyseren. In het voorjaar geeft een grondmonster inzicht in de bemestingstoestand en kunnen telers de bemesting in het voorjaar hier op afstemmen.

Elma Raaijmakers, André van Valen en Linda Frijters
Specialisten ziekten, plagen en bemesting

Herbicideschade door een herbicide toegepast in de voorvrucht. Schade is te beperken door het perceel te ploegen voorafgaand aan de bietenteelt.

