

Cursusboeken S.V.O.

**NIEUW HANDBOEK
MET AFBEELDINGEN IN KLEUR**

De bezitters van cursusboeken van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.), dus alle (ex-)cursisten en bovendien niet-cursisten, die syllabi hebben aange-schaft, werd door het secretariaat van de S.V.O. bericht gezonden dat de gelegenheid

bestaat zich te verzekeren van toezending van gewijzigde en/of aanvullende tekstbladen. Daarbij worden de herziene syllabi van het cursusjaar 1982-1983 als uitgangspunt genomen. Indien men zich wil abonneren op de wijzigingsbladen, dient men derhalve wél de in september 1982 verschijnende nieuwe syllabi aan te schaffen. Het Bestuur besloot bovendien tot uitgave van een „**Handboek S.V.O.**” naast de A- en B-syllabi. In dit losbladige handboek worden ca. 50 veel voorkomende diersoorten in kleur afgebeeld met op de daartegenoverliggende pagina's praktijkgerichte gegevens o.m. betreffende be-strijdings- en weringsmaatregelen.

De teksten zijn een verkorte weergave van de cursusstof uit de A-syllabus, afgedrukt op half formaat (A-5), waardoor een zeer nuttig en handzaam naslagwerk is ontstaan.

De kosten verbonden aan één en ander zijn momenteel:



A-syllabus 1982: f 75,— + verzendkosten;

B-syllabus 1982: f 50,— + verzendkosten;

Handboek S.V.O.: f 50,— + verzendkosten.

Wijzigings- en aanvullingsbladen vanaf september 1983: f 0,50 per pagina + verzend-kosten. Bestellingen schriftelijk in te dienen bij: Secretariaat S.V.O., Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg.

Door onze afdeling zeer aanbevolen.

<p>DE BEDWANTS (<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus)</p> 	<p>S.V.O. - 6.4.5.1.</p> <p>DE BEDWANTS (<i>Cimex lectularius</i> Linnaeus)</p> <p>Uiterlijk :</p> <ul style="list-style-type: none"> — sterk afgeplat, ovaalvormig, roodbruin, na bloedmaaltijd donkerrood — wijfjes 4,5-8,5 mm lang, mannetjes iets kleiner. <p>Ontwikkeling en leefwijze :</p> <ul style="list-style-type: none"> — ei tot imago : 2 maanden bij 18-20°C — max. leeftijd imago bij 18-20°C : ¼-1½ jaar — wijfje legt 100-200 eitjes, 2-12 per dag, nymfen 5 vervellingen — komt vooral voor in slaapkamers, neemt bloedmaaltijden bij de mens — verbergt zich in naden en kieren, bij voorkeur nabij hoofdeinde van bedden. <p>Bestrijding :</p> <ul style="list-style-type: none"> — inventarisatie verspreiding, let op sporen — behandeling met een residueel werkend middel o.b.v. delta-methrin, permethrin, chloorpyrifos of propoxur — behandel alle naden en kieren, ook van het bed en matras — beddegoed dient gewassen te worden — inspectie na ca. 6 weken.
<p>STEEKMUGGEN (Culicidae)</p> 	<p>S.V.O. - 8.4.7.</p> <p>STEEKMUGGEN (Famille Culicidae)</p> <p>o.a. DE GEWONE STEEKMUG (<i>Culex pipiens</i> Linnaeus) de steekmuggesoort <i>Culiseta annulata</i> Schrank DE MALARIAMUG (<i>Anopheles maculipennis</i> Meigen)</p> <p>Uiterlijk :</p> <ul style="list-style-type: none"> — slank, minstens 6 mm lang, lange poten — wijfjes kunnen steken. <p>Ontwikkeling en leefwijze :</p> <ul style="list-style-type: none"> — larven leven in het water — wijfjes leggen 100 of meer eitjes, imago leeft 1-2 maanden — ei tot imago : 1-2 weken — vliegen vooral 's nachts, worden tegen de schemering actief — voornamelijk in waterrijke streken nabij stilstaand water. <p>Bestrijding</p> <ul style="list-style-type: none"> — zoveel mogelijk weringsmaatregelen treffen, b.v. horrengaas — evt. gebruik maken van muggenafweermiddelen (repellents) — muggen te bestrijden door tocht, vliegenmepper of aerosol o.b.v. pyrethrinen of synt. pyrethrinen — larven in water onder vloeren e.d. te doden door vloeibare paraffine op watervlak aan te brengen (b.v. 1 liter/40 m²).