

WESPEN

LAAT IN HET SEIZOEN

Eind november 1982 bereikte onze afdeling nog een klacht omtrent hinder door wespen (*Paravespula* sp.). Gedurende de maanden oktober en november hadden de leden van het desbetreffende gezin een 20-tal wespsteken opgelopen vooral onder de voeten. Per dag werden medio november in huis 50 tot 100 wespen doodgeslagen. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat wespen van boven het plafond zowel de woonkamer met keuken als de daarbovengelegen slaapkamer binnenkwamen via openingen voor c.v.-leidingen en lichtspotjes in het plafond. Omdat door het vergevorderde seizoen geen normale activiteit van werksters meer plaats vond kon niet meer worden vastgesteld waar zich aan de buitenzijde van het huis de door de wespen in de afgelopen zomer gebruikte invliegopening bevond. Ook in december werden binnenshuis nog wespen gesignaleerd, waarvan in verband met de grootte kan worden aangenomen dat het koninginnen waren.

Aan het eind van het seizoen kan een tweetal groepen wespen actief zijn.

— de werksters (ca. 10-15 mm lang), die nog actief doch aan het eind van hun krachten zijn en die gewoonlijk na invallen van de winter sterven.

— jonge bevruchte koninginnen (ca. 20 mm lang) die een overwinteringsplaats zoeken. Een trage wesp kan nog heel goed steken en ook indien men zich prikt aan de angel van een dode wesp, kan het gif nog in het wondje terechtkomen met het nare gevolg daarvan. Omlaag vallende wespen en traag over de grond kruipende exemplaren kunnen voor de bewoners dan ook problemen opleveren.

Over het algemeen komen de meeste klachten betreffende hinder door wespen voor in de maanden juli, augustus en in begin september, doch ook in oktober worden wel klachten ontvangen. In het najaar 1982 met uitzonderlijk hoge buitenluchttemperatuur werd door een viertal gemeenten gemeld dat zelfs in november klachten niet uitzonderlijk waren zoals uit de onderstaande tabel blijkt.

Gemeente	Totaal bestrijdingen in 1982	sept.	okt.	nov.	dec.
1.	281	18	21	24	10
2.	278	52	52	4	2
3.	379	—	34	9	0
4.	300	—	12	1	0

In het afgelopen zachte najaar vlogen tot eind november nog wespen buiten. Afhankelijk van de buitentemperatuur wordt het echter aan het eind van het seizoen aanzienlijk moeilijker om een bestrijding uit te voeren, mede omdat dan als eerder vermeld de invliegopening en dus ook de lokatie van het nest vaak niet meer vast te stellen is.



Paravespula sp.

Foto Rijksinstituut Natuurbeheer, Arnhem.

Het is wenselijk om bij een klacht aan het eind van het seizoen, waar sprake is van regelmatig voorkomende aantallen wespen ter plaatse een onderzoek in te stellen. Determinatie kan uitwijzen of men te maken heeft met werksters of met koninginnen. In sommige gevallen kan de lokatie van het nest nog worden vastgesteld.

De bewoners kan men aanraden overdag de ramen open te zetten, zodat wespen naar buiten kunnen; tevens schoeisel, kleding, bedden, e.d. zorgvuldig te controleren op de aanwezigheid van wespen, voordat men deze in gebruik neemt. Een enkele wesp kan men het beste met een vliegmepper te lijf.

Nadere gegevens uit de praktijk over in de winter optredende wespen met data over de aanwezigheid van (gedetermineerde) werksters of koninginnen worden door de Afdeling gaarne ingewacht.

P. C. Groebe.