


UIT DE BUITENDIENST

In een pluimveestal met legbatterijen van totaal 600 m² vloeroppervlak werd hinder ondervonden door huismuizen. Gedurende een jaar werd zeer veel knaagschade gesignaleerd aan de dakisolatie. De schade was zo groot dat besloten werd de isolatie geheel te vervangen. Gedurende 12 maanden werden bestrijdingen uitgevoerd waarbij diverse lokazen op een aantal plaatsen „los” werden uitgelegd.

Op advies van de voorlichtingsambtenaar van onze afdeling werd vervolgens overgegaan op het gebruik van aan de bovenzijde afsluitbare **muizenvoerkistjes of -doosjes**. Op 65 plaatsen werd een voerplaats ingericht voorzien van ca. 50 gram lokaas. In verband met de in ons land alom optredende resistentie bij huismuizen tegen warfarin („cumarine”) werd geadviseerd een bestrijdingsmiddel toe te passen met als werkzame stof bromadiolon, chloorfacinon of difenacoum. De voerplaatsen werden gemiddeld tweemaal per week gecontroleerd en waar nodig voorzien van vers lokaas. Na ongeveer twee weken konden meer dan 300 dode muizen worden geteld. Na een maand intensief bestrijden werd geen opname van het lokaas meer geconstateerd. Ook bij een controlebezoek vier maanden later werden in de stal geen muizen meer gezien en waren geen uitwerpselen van muizen meer te vinden.

Ook uit deze praktijkervaring blijkt weer dat het gebruik van voerkistjes of -doosjes bij de bestrijding van huismuizen niet alleen veiliger is, maar dat deze werkwijze ook de resultaten van de bestrijding aanzienlijk verbetert.

Schade aan tempex door huismuizen.



Huismuis.

Muizenvoerkist met openingen aan korte kant i.v.m. plaatsing indien nodig op balken.

