



Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderij. Toon Meesters, werkzaam bij Vee & Arts Veterinaire Diensten uit Roosendaal, Hans Van Loo, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke), en Annemiek Veenkamp van Dierenartspraktijk Flevoland wisselen elkaar af bij een beschrijving van ziekte tot behandeling.

Een pink met een asymmetrische buik



naam aandoening
ontsteking op de buikwand

verschijnselen
grote zwelling op de buikwand, fluctuerend

oorzaak
ontsteking door onbekende oorzaak, mogelijk een klein (steek)wondje gehad

behandeling
openleggen van het proces en plaatsen van een drain

Twee jaar geleden werd ik geroepen bij een pink met een gigantische zwelling op haar borstkas/buik aan de linkerkant. De veehoudster vertelde dat de zwelling eerst hard was en dat de pink ruim 40 graden koorts had. Ze had haar op de antibiotica en pijnstillers gezet. Nu, vijf dagen later, was de koorts weg en de zwelling zacht en fluctuerend. De meest waarschijnlijke diagnose was een ontsteking. Een bloeding of een breuk van de buikspieren zou echter ook een mogelijkheid zijn, maar dan verwacht je niet direct koorts. De zwelling was zo groot dat de pink helemaal asymmetrisch was en hierdoor moeite had stevig op haar poten te blijven staan. Tegen jonge collega's zeg ik altijd: laat je niet verleiden en open een abces enkel als het buigen of barsten is. Als je een abces namelijk te vroeg met een mes opent, heb je veel kans dat het abces nog niet rijp is en dat je snel weer een recidief krijgt of dat je een flinke bloeding krijgt die je bijna niet kunt stelpen. Mijn advies luidt dan: zet er geen mes in, maar zoek een zachte plek en probeer daar stomp met je vinger een gat in te maken. Lukt dat niet, wacht dan rustig af. Dit was echter zo'n geval waarvan ik dacht: ik moet wat doen, anders komt het met deze pink niet goed. Op een lage en zachte plaats stak ik een naald in het proces en kwam 'bessensap' uit. Het was dus inderdaad een ontste-

king. Het mes moest er in dit geval echt maar aan te pas komen. Op hetzelfde punt als waar ik de naald erin had gestoken, maakte ik een snede en al direct voelde ik de verlichting. Het duurde even, maar uiteindelijk en na masseren van het gigantische gezwel is er wel zo'n 40 liter 'bessensap' uitgelopen. Inwendig voelde ik allemaal ontstekingsmateriaal (fibrine). Het was belangrijk dat de wond nog een aantal dagen openbleef, totdat echt al het vocht was afgevoerd. Daarom heb ik er een drain in gehecht, waarlangs het vocht naar buiten kon. De pink was zichtbaar opgelucht en stond direct een stuk steviger op haar poten. Omdat ik iedere vier weken op dit bedrijf kom, ben ik de pink veel tegengekomen. Iedere keer werd ik blij van haar. Eerst werd haar hele linkerkant steeds dunner en gladder, vervolgens nam haar conditie weer toe en mocht ik haar voelen voor tocht en, ja hoor, ook drachtig verklaren. Toen ben ik haar een beetje uit het oog verloren. Laatst vroeg ik de veehoudster er weer eens naar. Het is een erg mooie vaars geworden met op haar linkerkant een paar extra rimpeltjes. Ze heeft iets ouder voor de eerste keer afgekalfd en is nu ruim 100 dagen aan de melk. Ze heeft een lactatiewaarde van 114 en een verwachte 305 dagenproductie van 10.700 kg. Dat is wat je noemt dankbaar werk.