



Regelgeving voor kwartels, struisvogels en slakken

In de nieuwe Europese verordeningen worden heel wat diersoorten wettelijk geregeld. Toch worden enkele diersoorten niet besproken in de bioverordening. Daarom hebben we in ons Vlaamse MB regels voorzien voor enkele specifieke soorten: struisvogels, kwartels en slakken.

In de verordening is voorzien dat de niet-geregelde diersoorten toch minimaal aan de bioregels voor dierlijke productie moeten voldoen. Zo moet een perceel dat gebruikt wordt om de dieren te laten foerageren altijd een omgeschakeld perceel zijn. Een aantal items zijn echter niet geregeld en vragen dus om eigen Vlaamse regels. Hierbij een overzicht van de belangrijkste zaken.

Kwartels en struisvogels

Voor kwartels en struisvogels is de voorziene minimale omschakelingspe-

riode gelijk aan de minimale slachtleef-tijd: 5 weken voor kwartels en 8 maanden voor struisvogels. Net zoals bij ander pluimvee is de maximale leeftijd waarop niet-biokuikens in het bioproductieproces worden binnengebracht gelijk aan 3 dagen. Indien er nood is aan het binnenbrengen van niet-biologische vrouwelijke dieren, dan mag dat maximaal 10% zijn van het aantal volwassen dieren in kwestie op het bedrijf met een minimum van één per jaar. Als exploitant moet je hiervan bewijzen bijhouden voor de biocontrole. Als de weersomstandigheden het toe-

laten, dan moeten kwartels toegang hebben tot de buitenuitloop vanaf de leeftijd van 15 dagen en struisvogels vanaf het moment dat het mogelijk is.

Slakken

Slakken moeten vanaf hun geboorte volgens de biologische regels worden gehouden. Er mogen enkel slakken worden gehouden van de volgende drie soorten: *Helix Aspersa aspersa*, *Helix Aspersa maxima* en *Helix pomatia*. De buitenparken voor de slakken kunnen omgeschakeld worden in twaalf maanden als de grond gedurende het voor-bije jaar niet behandeld werd met producten die niet voor gebruik in de biologische productie zijn toegestaan (zie ook de omschakeling van de uit-loop bij kippen en varkens). Voor de buitenruimte zijn er een aantal

	Leeftijd	Binnenruimte	Buitenruimte
Struisvogels	3 dagen tot 6 weken	Minimaal 0,75 m ² /dier	Niet van toepassing
	6 tot 12 weken	Minimaal 1,5 m ² /dier	Minimaal 10m ² /dier
	12 weken tot 12 maanden	Minimaal 2,5 m ² /dier	Minimaal 125m ² /dier
	Ouder dan 12 maanden	Minimaal 4 m ² /dier	Minimaal 200 m ² /dier
Slakken		Maximaal 660 dieren/m ²	Maximale bezetting 330 dieren/m ²
Kwartels	0-14 dagen	120 dieren/m ²	/
	15-35 dagen	80 dieren/m ²	0,4 m ² /dier
	Vanaf 36 dagen	50 dieren/m ²	0,4 m ² /dier

specifieke regels opgesteld. Zo kunnen slakken tijdens de winterslaaperperiode niet in de buitenruimte blijven. Daarna moeten ze wel terug in de buitenruimte worden gehouden, behalve voor de periode tot 16 mei. Voor 16 mei mogen ze maximaal 6 weken in een binnenruimte worden gehouden. Dit geldt ook voor de pasgeboren slakken. De buitenruimten moeten op het einde van iedere vetmestingcyclus gedurende minstens 4 weken leeg blijven. De buitenruimten kunnen aangerijkt worden

met de tijgerworm (*Esenia fetida*). Om vogelschade en ontsnappen te voorkomen kunnen de buitenparken afgedekt worden met gaas. De slakken kunnen ook worden bijgevoerd. Na het vetmesten worden de slakken gedurende minstens 4 dagen uitgevast waarna ze kunnen worden gebroeid met kokend water dat al dan niet gezouten is. Bij bereide slakken die voorverpakt zijn moet de wetenschappelijke naam van de soort slak op de verpakking worden vermeld. ■