



Bestrijding tussen de rijenbeplanting van een teelt levert onvoldoende resultaat op (foto mei 2022).

af waarbij winterharde knolletjes achterblijven die jarenlang actief zijn. Een verre verspreiding is mogelijk door besmet plant- en pootgoed, machines (pas zeker op bij loonwerk), aangevoerde grond, stalmest ... Bestrijding tussen de rijenbeplanting van een teelt levert onvoldoende resultaat.

Naalbaar versus hanenpoot. Naalbaar is een eenjarig en vorstgevoelig zaadonkruid dat later in de lente kiemt bij voldoende warmte. De onderkant van de bladeren is ruw door kleine tandjes. Het tongetje van het blad is gewimperd. In het kleine stadium van de plant lijkt deze sterk op hanenpoot, ook een eenjarig gras met rode basis die sterk vertakt vanaf de knoep. Echter heeft hanenpoot geen tongetje van het blad en is geen behaard gras.

Bestrijdingsmogelijkheden

In de tabel vermelden we enige behandelingsmogelijkheden van enkele onkruiden in diverse gewassen. In granen kunnen we tijdens de teelt gebruiken van groeistoffen (onder andere Bofix, MCPA, Starane, Trevistar) of sulfonylurea's (onder andere Primus, Allie) of een combinatie. Wil je haagwinde, distel of veenwortel onderdrukken, dan moet je kiezen voor een late behandeling in het tweedeknoopstadium met bijvoorbeeld Starane, Primus, Primstar of Trevistar.

In bieten kiezen we Safari tegen haagwinde en Matrigon tegen distels. Pas Matrigon toe bij warm weer en ook liefst op een vochtige bodem. Akkerwinde is daarentegen ongevoelig voor Safari. Veenwortel kan je met de AR-componenten enkel oppervlakkig te branden en groeit daarna snel terug uit.

Aardappeltelers hebben alsmaar vaker last van hardnekkige onkruiden. Titus onderdrukt hier in combinatie met Trend zowel haagwinde, akkerdistel, melkdistel als de opslag van cichorei (niet-ALS-resistente rassen). Akkerwinde en veenwortel zijn ongevoelig. In mais is het bijmengen van Callam, Kart, Casper, Starane of Banvel in de meeste herbiciden de beste keuze. Ook thiencaresome (een component van Capreno of Monsoon Activ) heeft een werking. Haagwinde wordt daardoor afgehandeld. Na het 10 bladstadium van de mais zijn vernoemde herbiciden niet meer veilig. Primus kan op grotere mais gebruikt worden aan 50 ml/ha, het is aangevuld met Peak. Tegen veenwortel kies je best voor Banvel, tegen akker- en melkdistel zet je best Matrigon in. ■



Naalbaar na uitvoeren van herbicidebehandeling. Foto genomen op proefperceel op 10 juni.



Hanenpoot met kaal blad, zonder tongetje en zonder haartjes. Foto genomen op 10 juni.

Tabel behandelingsmogelijkheden in diverse gewassen

	Distel/melkdistel	Veenwortel	Haagwinde	Akkerwinde
Aardappelen	Tijdens de teelt Titus + Trend	Tijdens de teelt Geen bestrijding	Tijdens de teelt Titus + Trend	Tijdens de teelt Geen bestrijding
Bieten	Tijdens de teelt Matrigon + Olie	Tijdens de teelt Geen bestrijding	Tijdens de teelt Safari	Tijdens de teelt Geen bestrijding
Granen	Tijdens de teelt Trevistar, Allie, Bofix Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Bofix + Allie Na de oogst Glyfosaat (+ groeistof)	Tijdens de teelt de meeste herbiciden Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Starane, Primstar, Trevistar Na de oogst Glyfosaat + groeistof
Mais	Tijdens de teelt Matrigon Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Banvel Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Callam, Casper, Kart Na de oogst Glyfosaat + groeistof	Tijdens de teelt Callam, Casper, Kart Na de oogst Glyfosaat + groeistof