



Baltsende oude haan.

Grijze pauwfazant of Chinquis pauwfazant

Als men over pauwfazanten spreekt, denkt men dikwijls het eerste aan de Grijze pauwfazant, *Polyplectron bicalcaratum*, meestal Chinquis genoemd. Toch kennen we van hetzelfde geslacht nog diverse andere zoals de Rothschild pauwfazant *Polyplectron inopinatum*, de Germain pauwfazant *Polyplectron germaini*, de Maleise pauwfazant *Polyplectron malacensis*, de Borneo pauwfazant *Polyplectron malacensis schleiermacheri*, de Palawan of Napoleon pauwfazant *Polyplectron emphanum*. Deze soorten behoren alle tot de zogenaamde spiegelpauwen.

Tekst: Toon Selten

Foto's: Nico van Wijk

Daarnaast zijn er nog enkele soorten van een ander geslacht

De zogenaamde echte pauwfazanten en de Rheinarts pauwfazanten. Doch ook de Chinquis pauwfazant bestaat op zijn beurt weer uit een vijftal soorten die over het algemeen door elkaar zijn gefokt. Er zijn maar enkele fazantariëen die deze soorten nog in de zuivere vorm hebben, maar of die helemaal zuiver zijn, valt ook nog te betwijfelen, omdat er in de gebieden waar ze voorkomen ook overlappingsen zijn. Het verschil tussen deze soorten is vooral de grootte. De namen verwijzen naar de gebieden waar ze voorkomen of naar de ontdekker. Deze vijf ondersoorten zijn de Himalaya-, Lowes-, Birmaanse-, Ghigi- en de Hainan pauwfazant. Naast de verschillen in grootte is er ook wat verschil in kleur, wat donkerder of wat lichter. De meeste hier voorkomende Grijze pauwfazanten zijn een kruising van de Himalaya- en Ghigi pauwfazant. Dit verklaart dikwijls het verschil in grootte en kleur die men bij deze pauwfazant aan kan treffen.



Haan in rust, met de normale stand van de staart.



Een hennetje, deze zijn kleiner en minder kleurrijk.

Het leefgebied

Het verspreidingsgebied loopt van de Himalaya tot Thailand en van Birma tot Vietnam. Ze komen voor vanaf zeeniveau, tot op hoogten van ongeveer 1.500 meter. Op de berghellingen van deze vochtige wouden die men daar aantreft, leven ze in kleine groepjes of paarsgewijs. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten, zaden en bessen, fruit wordt in mindere mate gegeten.

Het uiterlijk

Hoewel we spreken over Grijze pauwfazant doet dit onrecht aan hun fraaie uiterlijk. Ze zijn in principe van grondkleur bruin, maar door de vele vuilwitte spikkels in het gevederte lijken ze grijs. Door het verschil in grootte is het moeilijk de precieze afmetingen aan te geven. Meestal varieert deze tussen de 60 en 70 centimeter bij de haantjes, waarbij dan de

langste staartveren ongeveer 28 cm bedragen. De hennetjes zijn kleiner en hebben ook kortere staarten. Vooral de haantjes hebben prachtige staartveren. In totaal 20 tot 24 stuks. De middelste en langste zijn de breedste naar de zijkanten toe worden ze korter en smaller. De veer is aan het einde vrij recht met afgeronde hoeken. Elke veer heeft op het uiteinde op elke vaan een metaalachtig glanzend, blauwgroen, wat ovaal oog met een zwart randje en een iets crème bandje aan de bovenzijde. De breedste veren hebben de grootste ogen.

De verlengde staartdekveren hebben dezelfde ogen. Dit in tegenstelling tot de vleugeldekveren en vleugelboeg. Deze hebben een paarsblauwachtig oog welke omringd wordt met een zwarte en witte rand. Tevens hebben ze net als alle veren witte spikkels die echter helderder zijn op de staart



Close-up van de staartveren bij de haan.



Close-up van het vleugeldek bij de haan.



Fraaie hanenkop met een grote volle kuif.



Oude haan met een nog kleine kuif, de rui is hiervan de oorzaak.

en vleugeldekveren dan op de borstveren. De haan heeft op de ietwat ovale kop een grijze kuif welke hij in opgewonden toestand overeind kan zetten. Maar in tegenstelling tot de meeste kuiven, helemaal naar voren laat hangen tot over de snavel tijdens het baltsen. Deze kuif is grijs wit gemêleerd.

Onder het oog en de keel is grijsachtig wit, met een kleine naakte vlek achter het oog. De poten zijn leiblaauw, maar het bijzondere daaraan is dat ze zowel twee- of meersporig kunnen zijn, maar ook dat ze sporen kunnen missen. Tevens kan de ene poot meer sporen hebben dan de andere. Ook de hennen kunnen sporen hebben. De hen is opmerkelijk kleiner dan de haan, ook de staart is korter.



Oude haan aan het begin van zijn balts.

Over het geheel toont de hen ook bruiner dan de haan.

In onze volière

Chinois pauwfazantjes zijn zeer prettige vogels voor in een volière. Ze kunnen zeer vertrouwd worden met de verzorger, zeker als men ze af en toe verزند met wat meelwormen of krenten, ongebrande pinda's of klein fruit. Ze kunnen zelfs voor de verzorger baltsen als ze in een goede bui zijn. De volière hoeft niet groot te zijn, een paar vierkante meter is al voldoende, wel is het aan te bevelen om een afsluitbaar binnenhok te hebben. Hoewel ze lichte vorst goed aan kunnen is het aan te bevelen om ze bij matige vorst binnen te houden en bij strenge vorst dient men ze bij te verwarmen, afhankelijk van hoe het binnenhok geïsoleerd is. Zoals altijd dient men te zorgen dat het binnenhok droog en tochtvrij is. Als bodembedekking voldoen houtspaanders prima. De zitstok moet in het binnenhok gemaakt worden, zodat ze 's nachts binnen gaan zitten. Deze



Een eendagskuiken.



Dit hennetje laat duidelijk toch wat spiegelglans zien.

zitstok niet te smal maken, zodat de tenen er bovenop blijven liggen en ze deze kunnen bedekken met hun veren. Bij strenge vorst is het beter ze binnen te houden, zodat ze op de bevroren grond hun teentjes niet beschadigen. Deze zijn het meest vorstgevoelig. De volière kan men gerust met planten aanplanten, want deze zullen ze zeker met rust laten. Ze zijn meestal pas het tweede jaar vruchtbaar, alhoewel ze soms het eerste jaar al leggen. Het nadeel van de pauwfazantjes is dat ze telkens maar één legsel van maximaal twee eitjes leggen. Als men deze weghaalt zullen ze waarschijnlijk een vervollegsels leggen. Maar hier kan men niet op wachten, als men deze gezamenlijk uit wil broeden. Een compleet legsel bestaat uit twee eieren en die verliezen snel hun kiemkracht. De periode tussen twee legsels is daarvoor te lang. Wil men toch meerdere eieren tegelijk laten uitbroeden, dan zal men over meerdere hennen moeten beschikken. Dit kan bij dezelfde haan, maar dan moet men de hennetjes apart huisvesten en de haan er om de beurt bij plaatsen. Meerdere hennen bij een haan gaat meestal niet goed. Uitbroeden met een kloek of broedmachine levert geen problemen op. De natuur zijn eigen gang te laten gaan en ze zelf laten broeden en laten grootbrengen is ook mogelijk. Meestal kan men de haan erbij laten, dan is deze ook zorgzaam voor de kuikens. Hierbij wel zorgen dat ze bij slecht weer binnen gehouden kunnen worden. Afhankelijk van het weer beginnen ze in maart al met de leg. Als men het binnenhok voorziet van verlichting -zoals ook bij kippen-, dan kan de legperiode vervroegd worden. De broedduur is 21 dagen. Voorafgaande aan de legperiode laat de haan een prachtige balts zien. Hij richt daarbij zijn staart recht op en laat een vleugel zakken terwijl hij de andere vleugel opheft. Daarbij houdt hij het kopje met de kuif op de snavel tegen de opgerichte vleugel gedrukt. Samen vormt het een grote platte spiegel

van veren met pauwoogjes. Soms reikt hij het hennetje iets aan. Dit kan een graankorrel zijn of een steentje. Het hennetje loopt knikkend met het kopje voor de haan door. Als het in de stemming is, laat ze zich treden.

De verzorging

Deze hoeft niet moeilijker te zijn dan bij andere fazanten. Voor de ouderdieren volstaat normale fazantenkorrel aangevuld met wat graan. Groenvoer zullen ze vrijwel niet eten, stukjes appel en andere vruchten, insecten en bessen eten ze wel graag. Ook als men de kuikens machinaal uitbroedt, volstaan de hiervoor geëigende voeders. Wel dient men er rekening mee te houden dat de kuikens de eerste dagen gewend zijn dat het voer door de ouders aangereikt wordt. Het kan dus voorkomen dat de kuikens dan niet uit zichzelf willen pikken. Andere kuikens erbij plaatsen die het voorbeeld geven, kan dan een oplossing zijn. Als dat niet kan of niet lukt, dan kan men ze de eerste dagen met een pincet voeren. Bij de opfok met een kloek levert dit meestal geen probleem op, omdat de kloek wel voorpikt. Dat er altijd schoon drinkwater moet zijn is vanzelfsprekend. De jonge kuikens komen het eerste jaar op kleur, maar lijken dan vooral op het hennetje. Het is goed ook deze fazanten tweemaal per jaar te ontwormen. Meestal voor het broedseizoen en eenmaal als de kuikens ongeveer volwassen zijn.

Dit vriendelijk fazantje werd reeds in 1745 in Europa als siervogel ingevoerd. Het duurde echter tot 1866 voordat de eerste broedresultaten plaatsvonden. Gelukkig gaat het momenteel wat gemakkelijker met de fok en is het waarschijnlijk het populairste pauwfazantje van alle soorten. Als deze eenmaal in een collectie zit, zal men ze niet meer kwijt willen. <<

FEBRUARI KORTING!

ROPA POULTRY Complete

NU 10% korting!
met de code **kleindier2022**

RopaPoultry Complete is een aanvullend diervoeder, gebaseerd op etherische oliën en vitamines. Het is speciaal ontworpen voor hobbypluimvee, in samenwerking met dierenartsen.

www.ropastore.com
Voor meer informatie: info@ropastore.com
+31 (0)75-614 41 43

Scan de QR code en plaats een bestelling!



ideaal voor
fok- en show-
cavia's

1050 alfamix cavia is een gevarieerde mengeling met o.a. rozenbottels, peterselie, groente en fruit.

- ✓ voor cavia's van alle leeftijden
- ✓ ondersteunt de weerstand, vitaliteit, spijsvertering en een glanzende vacht

Persoonlijk advies? advies@garvo.nl

