

Lésions cutanées

Compétition 



©WUR

Qu'indiquent les lésions cutanées ?

- Les porcs préfèrent chercher de la nourriture, manger et dormir en même temps que leurs congénères.
- Les ressources et l'espace doivent être suffisants pour la synchronisation des comportements entre porcs du même groupe
- La rivalité entre les porcs pour des ressources (limitées) telles que l'espace, la nourriture, l'eau, le matériel d'enrichissement, etc. engendre des interactions physiques, entraînant des lésions cutanées.

Risques de morsure de queue

Lorsqu'une rivalité existe entre les porcs pour des ressources (limitées), cela constitue une source de stress, pouvant entraîner des morsures de queue du fait de la frustration des animaux. Les lésions cutanées sont dues à une rivalité pour accéder aux ressources (limitées), et constituent donc un indicateur permettant d'évaluer le risque de morsure de queue.

ÉVALUATION DES RISQUES

- ✓ Compétition pour accéder aux ressources

Exigences légales

La directive du Conseil **2008/120/CE** déclare : « Tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour. Lorsque les porcs sont nourris en groupes et ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système alimentant automatiquement les animaux individuellement, chaque porc doit avoir accès à la nourriture en même temps que les autres animaux du groupe » {Annexe I, Chapitre I, point 6}
« Tous les porcs âgés de plus de deux semaines doivent avoir un accès permanent à de l'eau fraîche en quantité suffisante. » {Annexe I, Chapitre I, point 7}
« Il convient de les élever dans des groupes et d'éviter de mélanger des porcs. Si des porcs qui ne se connaissent pas doivent être mélangés, il y a lieu de le faire dès leur plus

jeune âge, de préférence avant le sevrage ou au plus tard une semaine après le sevrage. Dans ce cas, il convient de leur ménager des possibilités suffisantes pour s'échapper et se cacher à l'abri des autres {Annexe I, Chapitre II, point D2}

Superficie minimale d'espace libre {Art.3, point 1a}

Poids vif (kg)	Espace individuel (m ²)
≤10	0,15
10 - 20	0,20
20 - 30	0,30
30 - 50	0,40
50 - 85	0,55
85 - 110	0,65
110 et +	1,00

Remarque : Les exigences listées ne sont pas exhaustives. Il peut aussi exister une législation nationale plus stricte en application..

Méthode d'inspection (recommandée)

- L'éleveur/se enregistre les lésions corporelles des animaux durant ses inspections quotidiennes. Cela doit être inscrit dans la documentation d'évaluation des risques de l'éleveur/euse relative à la coupe des queues.
- L'inspecteur/rice vétérinaire officiel/le vérifie les registres de l'éleveur/euse en comparant la documentation écrite/numérique avec les interventions réalisées par l'éleveur/euse dans l'élevage.
- De plus, l'inspecteur/rice vérifie la présence de lésions cutanées des porcs de différents groupes d'âge et dans différents cases/groupes.
- L'inspecteur/rice communique les résultats à l'éleveur/euse et en cas d'incohérence entre les exigences réglementaires et la situation en élevage, des mesures correctives doivent être prises.



L'évaluation des lésions cutanées n'est pas utile durant la première semaine suivant le regroupement de porcs inconnus. La surveillance des agressions due à la compétition se fait davantage dans un groupe où l'ordre hiérarchique est stable.

Les porcs sont évalués individuellement pour déterminer s'ils présentent des lésions cutanées. Le terme de lésion comprend : la peau abîmée, les plaies récentes (avec saignement) et ou les lésions en cours de guérison (croûte). Les cicatrices ne sont pas prises en compte. Placez-vous près de l'animal et évaluez uniquement un flanc. Divisez le corps du porc en deux moitiés et évaluez chaque moitié séparément :

- Moitié avant (= oreilles et tête, épaules, pattes avant)
- Moitié arrière (= flanc, arrière-train, pattes arrière)

Si la majorité des porcs présentent des lésions cutanées, identifiez la tendance apparente dans la case, c'est-à-dire si les lésions sont sur la moitié avant ou arrière des animaux. Les lésions cutanées sur la moitié avant traduisent une rivalité pour l'espace, en raison d'affrontements. Les lésions sur la moitié arrière peuvent être dues à une rivalité pour accéder aux ressources (limitées), par exemple la nourriture.

Peu ou pas risque d'atteinte au bien-être: Absence de lésion ou lésions bénignes

- Une lésion linéaire de ≥ 10 cm de longueur ;
- Ou 3 lésions ou plus de ≥ 3 cm de longueur, mais l'ensemble des lésions couvrent < 25 % de la surface corporelle ;
- Ou une zone circulaire de moins de 2,5 cm de diamètre.



Haut risque d'atteinte au bien-être: Lésions sévères

- Une lésion circulaire de $\geq 2,5$ cm de diamètre ;
- Ou une lésion qui s'étend dans les couches plus profondes de la peau ;
- Ou des lésions qui recouvrent ≥ 25 % de la surface corporelle, indépendamment de la longueur des lésions.



Méthode d'évaluation source: [protocole AssureWel](#)



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

En cas de question ou de suggestion relative à cette fiche, veuillez contacter le Centre info.pigs@eurcaw.eu