





Qu'indiquent les lésions corporelles ?

- La taille des truies peut être plus grande, en longueur et en largeur, que l'espace disponible prévue entre les barreaux des cages.
- Le manque d'espace les empêche d'adopter une position de repos, de s'allonger et de se relever, et entraîne des lésions corporelles.
- Les lésions corporelles, notamment les lésions à l'épaule, peuvent donc indiquer un manque d'espace dans les cages de maternité. 

Exigences légales

Directive du Conseil **2008/120/CE** :

« Le logement des porcs doit être construit de manière à permettre aux animaux : d'avoir accès à une aire de couchage confortable du point de vue physique et thermique (...) permettant à tous les animaux de se coucher en même temps, de se reposer et de se lever normalement. (...) »
{Annexe I, Chapitre I, point 3}

« Un espace libre doit être aménagé derrière la truie ou la cochette pour permettre une mise bas naturelle ou assistée. » {Annexe I, Chapitre II, point B4} 

Remarque : Il se peut qu'il existe une législation nationale plus stricte en application.

Méthode d'inspection (recommandée)

- L'éleveur/euse enregistre les lésions corporelles, y compris les lésions aux épaules, durant ses inspections quotidiennes.
- L'inspecteur/rice vétérinaire officiel/le vérifie les registres vétérinaires et la présence de lésions corporelles sur les truies en gestation.
- L'inspecteur/rice communique les résultats à l'éleveur/euse et en cas d'incohérence entre les exigences légales et la situation de l'élevage, des mesures correctives doivent être prises.



La formule suivante peut aider à évaluer l'espace nécessaire pour qu'une truie puisse s'allonger et se lever (« Disponibilité d'un espace dynamique »):

Longueur = $38,4 \times \text{poids [kg]}^{0.33}$; largeur = $12,6 \times \text{poids [kg]}^{0.34}$

Baxter, M. R. and Schwaller, C.E. (1983) : Space requirements for sows in confinement. In : Baxter, S.H., Baxter, M.R., MacCormack, J.A.C. (éd.): Farm Animal Housing and Welfare. Martinus Nijhoff Publishers, Bosten, The Hague, Dordrecht, Lancaster, 181-195

Espace confortable ? Pour évaluer si les cages sont adaptées aux truies, il faut les observer lorsqu'elles s'allongent et se relèvent. Quand les truies disposent d'un espace confortable pour se lever et s'allonger, la taille de la cage peut être considérée comme adaptée.



Lésions aux épaules

Les truies à évaluer doivent être debout. Examiner la présence de lésions sur les deux épaules. Évaluer le flanc présentant les lésions les plus graves.

Pas risque d'atteinte au bien être:

Pas de présence de lésion à l'épaule



Modérée risque atteinte au bien être:

Présence d'une blessure ancienne (tissu cicatriciel formé), ou d'une blessure qui est en cours de guérison, ou d'une rougeur sans pénétration du tissu



Haute risque atteinte au bien être:

Une blessure/lésion ouverte



Méthode d'évaluation source: Protocole Welfare Quality®



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

En cas de question ou de suggestion relative à cette fiche, veuillez contacter le Centre info.pigs@eurcaw.eu