


Lesiones en la cola



¿Qué indican las lesiones en la cola?

- Las lesiones en la cola son el resultado de la caudofagia, que es un comportamiento anormal en el que los cerdos muerden las colas de otros compañeros de corral.
- Es una respuesta al aburrimiento, a la estimulación insuficiente y a la frustración relacionada con varios estresores ambientales y de manejo.
- Por tanto, la caudofagia es un problema de origen multifactorial cuya causa sigue el modelo de "cubo que desborda". La suma de varios factores desbordan el cubo y, en un momento dado, comienza la caudofagia:

"CUBO DE RIESGO ACUMULADO"



Los (seis) factores de riesgo principales que llenan el cubo hacen referencia a insuficiencia en:

- Enriquecimiento ambiental
- Confort térmico y calidad del aire
- Estado de salud
- Comederos y bebederos
- Dieta
- Diseño e higiene del corral



Requisitos legales

La Directiva **2008/120/CE** del Consejo establece lo siguiente en el Anexo 1, capítulo I, punto 8: "El raboteo y la reducción de las puntas de los dientes no deberán ejecutarse por rutina sino únicamente cuando existan pruebas de que se han producido lesiones de las tetillas de las cerdas o las orejas o rabos de otros cerdos. Antes de su ejecución, se adoptarán medidas para prevenir la caudofagia y otros vicios teniendo en cuenta las condiciones ambientales y la carga ganadera. Por esta razón, las condiciones ambientales o los sistemas de gestión deberán modificarse si resultan inadecuados".

Nota: La lista de requisitos no es exhaustiva. Además, puede haber una legislación nacional más estricta.

Método de inspección (recomendado)

- El ganadero registra las lesiones en la unidad animal durante sus inspecciones diarias. Debe registrarse como parte de la documentación de la evaluación de riesgos del ganadero en relación con la sección de la cola.
- El veterinario oficial verifica los registros del ganadero comparando la documentación escrita/digital con las intervenciones realizadas por el ganadero en la explotación.
- Además, el veterinario oficial comprueba la existencia de heridas en la cola de los cerdos de diferentes grupos de edad y de diferentes corrales/grupos.
- El veterinario oficial informa de los resultados al ganadero y, en caso de discrepancias entre los requisitos legales y la situación en la granja, se adoptan medidas correctivas.



Los cerdos se puntúan individualmente según la proporción del daño en la cola.

Prevalencia de lesiones en la cola a nivel de explotación: porcentaje de cerdos que presentan heridas en la cola.

Sin riesgo para el bienestar: Colas intactas

No hay signos de daños: No está herida ni raboteada. La cola está enrollada y la punta de la cola es plana y tiene pelos



© WUR



© FLI, A. Schubert

Riesgo moderado para el bienestar: Herida leve

Daño en la piel de al menos 0,5 cm de diámetro pero no superior a 2,0 cm (tamaño inferior a una moneda de diez céntimos de euro). La herida debe tener sangre fresca (herida reciente), una costra (herida reciente pero en proceso de curación) o ambas. Todo lo que sea inferior a 0,5 cm se considera cola intacta



© FLI



© FLI

Riesgo severo para el bienestar: Herida grave

Daño en la piel de al menos 2,0 cm de diámetro (tamaño de una moneda de diez céntimos de euro) o más de una herida leve (véase la definición anterior). La herida debe tener sangre fresca (herida reciente), una costra (herida reciente pero en proceso de curación) o ambas



© LSZ Boxberg



© FLI

Fuente del método de evaluación: Plataforma de la UE sobre bienestar animal, subgrupo cerdos, 2019



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

Para cualquier pregunta o sugerencia sobre esta ficha técnica, póngase en contacto con info.pigs@eurcaw.eu