



©WUR

## ¿Qué indican las lesiones faciales y en la articulación del carpo?

- Los lechones establecen un orden de mama.
- La falta de espacio y el gran tamaño de las camadas, en las que el número de lechones supera al de las tetillas funcionales, impiden que los lechones establezcan un orden de mama estable.
- Las peleas por las tetillas pueden provocar lesiones en la cara y en la articulación del carpo.



## Requisitos legales



En el anexo a la Directiva 98/58/CE se indica lo siguiente: "No se deberán utilizar procedimientos de cría naturales o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos o heridas a cualquiera de los animales afectados. Esta disposición no excluirá el uso de determinados procedimientos que puedan causar sufrimiento o heridas de poca importancia o momentáneos o que puedan requerir intervención sin probabilidad de causar un daño duradero, siempre que estén permitidos por las disposiciones nacionales". {Anexo, punto 20} "No se mantendrá a ningún animal en una explotación ganadera salvo que existan fundamentos para esperar, sobre la base de su genotipo o fenotipo, que puede mantenerse en la explotación sin consecuencias perjudiciales para su salud o bienestar". {Anexo, punto 21}

La Directiva **2008/120/CE** del Consejo establece lo siguiente: "Los lechones no deberán ser destetados antes de tener 28 días de edad a no ser que el hecho de no destetarlos sea perjudicial para el bienestar o la salud de la madre o de los lechones. Sin embargo, los lechones podrán ser destetados hasta siete días antes, si son trasladados a instalaciones especializadas que se vaciarán, se limpiarán y desinfectarán meticulosamente antes de introducir un nuevo grupo y que estarán separadas de las instalaciones de las cerdas, para limitar la transmisión de enfermedades a los lechones". {Anexo I, capítulo II, punto C3}



*Nota: La lista de requisitos no es exhaustiva. Además, puede haber una legislación nacional más estricta.*

## Método de inspección (recomendado)

- El ganadero registra las lesiones faciales y de las articulaciones del carpo de los lechones durante sus inspecciones diarias.
- El veterinario oficial comprueba los registros veterinarios y evalúa posibles lesiones en los lechones.
- El veterinario oficial informa de los resultados al ganadero y, en caso de discrepancias entre los requisitos legales y la situación en la granja, se adoptan medidas correctivas.



## Lesiones faciales

Calcular la proporción de lechones con al menos 3 lesiones faciales

**Sin riesgo o con bajo riesgo para el bienestar: < 3 lesiones frescas/sangrantes o en fase de curación (costras)**



**Riesgo severo para el bienestar:  $\geq 3$  lesiones frescas/sangrantes o en fase de curación (costras)**



## Lesiones de la articulación del carpo

Calcular la proporción de lechones con lesiones en la articulación del carpo

**Sin riesgo para el bienestar: sin lesiones frescas/sangrantes o en fase de curación (costras)**



**Riesgo severo para el bienestar: lesiones frescas/sangrantes o en fase de curación (costras)**



Fuente del método de evaluación: KTBL Leitfaden



Co-funded by  
the European Union



WAGENINGEN  
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS  
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit  
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre  
for Animal Welfare *Pigs*

Para cualquier pregunta o sugerencia sobre esta ficha técnica, póngase en contacto con [info.pigs@eurcaw.eu](mailto:info.pigs@eurcaw.eu)