





## Worauf weisen Körperläsionen hin?

- Die Körpermaße der Sauen können sowohl länger als auch breiter sein als das zulässige Platzangebot in den Kastenständen. 
- Platzmangel beeinträchtigt die Einnahme von Ruhepositionen sowie das Abliegen und Aufstehen und führt zu Körperläsionen.
- Körper- inklusive Schulterläsionen können daher auf Platzbeschränkungen bei Sauen im Abferkelstall hinweisen.

## Gesetzliche Anforderungen

### Richtlinie 2008/120/EG:

"Schweine­ställe müssen so gebaut sein, dass die Tiere: Zugang zu einem grö­ßen- und tempera­turemähig angemessenen Liege­bereich haben, (...) der so viel Platz bietet, dass alle Tiere gleichzeitig liegen können; genügend ruhen und normal aufstehen können (...)" {Anhang I, Kapitel I, Punkt 3}

"Hinter der Sau oder Jungsau muss sich ein freier Bereich befinden, um ein selbständiges oder unterstütztes Abferkeln zu ermöglichen." {Anhang I, Kapitel II, Punkt B4} 

*Hinweis: Es kann strengere nationale Rechtsvorschriften geben.*

## Erhebungsmethode (empfohlen)

- Die Tierhalter\*innen erfassen bei den täglichen Routinekontrollen Körperläsionen, einschließlich Schulterläsionen.
- Die Amtstierärzt\*innen überprüfen tierärztliche Aufzeichnungen sowie Sauen im Abferkelstall auf Körperläsionen.
- Die Amtstierärzt\*innen informieren Tierhalter\*innen über die Feststellungen. Bei Abweichungen von den gesetzlichen Anforderungen werden Korrekturmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Situation in Zukunft den gesetzlichen Anforderungen entspricht.



Die folgende Formel kann helfen, den Platzbedarf einer Sau für das Abliegen und Aufstehen zu ermitteln ("dynamisches Platzangebot"):

$$\text{Länge} = 38.4 \times \text{Körpergewicht [kg]}^{0.33}; \text{Breite} = 12.6 \times \text{Körpergewicht [kg]}^{0.34}$$

*Baxter, M. R. and Schwaller, C. E. (1983): Space requirements for sows in confinement. In: Baxter, S. H., Baxter, M. R., MacCormack, J. A. C. (eds.): Farm Animal Housing and Welfare. Martinus Nijhoff Publishers, Bosten, The Hague, Dordrecht, Lancaster, 181-195*

**Ausreichend Platz?** Um zu beurteilen, ob die Kastenstände für eine bestimmte Sau geeignet sind, ist es hilfreich, die Sauen im Liegen und im Stehen zu beobachten. Wenn die Sauen sowohl im Stehen als auch im Liegen ausreichend Platz haben, kann die Kastenstandgröße als angemessen angesehen werden.



### Schulterläsionen

Die zu beurteilenden Sauen müssen aufrecht stehen. Beide Schultern werden auf Schulterwunden/Läsionen untersucht. Die Seite mit der schwereren Läsion wird bewertet.

#### Kein Risiko für das Tierwohl:

Keine Anzeichen einer Schulterläsion



#### Moderates Risiko für das Tierwohl:

Anzeichen einer alten Verletzung (Bildung von Narbengewebe) oder einer kürzlich erlittenen Verletzung, die gerade abheilt, oder Rötung des Bereichs ohne Durchbruch in das Gewebe



#### Hohes Risiko für das Tierwohl:

Eine offene Wunde/Läsion



Quelle der Erhebungsmethode Schulterläsionen: Welfare Quality® Protokoll



EU Reference Centre  
for Animal Welfare *Pigs*

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Factsheet haben, wenden Sie sich bitte an [info.pigs@eurcaw.eu](mailto:info.pigs@eurcaw.eu)