

Bevuiling



Wat geeft bevuiling aan?

- Varkens staan bekend als schone dieren, ze houden hun lig- en mestplaatsen gescheiden.
- Als varkens met mest en urine besmeurd zijn is dit een teken dat er wat mis is in de omgeving van de dieren, bijvoorbeeld overbezetting, ontwerpfouten in hok of vloer, hittestress of slechte ventilatie.

Risico's voor staartbijten

Bevuiling is een indicator van een verhoogd risico op staartbijten. Als varkens niet comfortabel en schoon kunnen liggen, raken ze gefrustreerd en beginnen ze mogelijk met staartbijten.

RISICOANALYSE



Bevuiling is vaak een multifactorieel probleem, waarbij vooral de volgende factoren een rol kunnen spelen en van belang zijn om te controleren:

- ✓ Temperatuur en luchtkwaliteit
- ✓ Toegang tot voer, water en een schone ligplek
- ✓ Hok ontwerp en hygiëne

Rang en bevuiling

- Bevuilde varkens hoog in rang zijn mogelijk een aanwijzing voor een te hoge omgevingstemperatuur.
- Bevuilde varkens laag in rang zijn mogelijk een aanwijzing voor te weinig ruimte.

Wettelijke vereisten



Richtlijn **2008/120/EC** zegt in Bijlage 1, Hoofdstuk I, punt 3: "De varkensstallen moeten zo zijn gebouwd dat de varkens: toegang hebben tot een schone ligruimte met een comfortabele afwerking en temperatuur en met een adequate waterafvoer, waar alle dieren tegelijk kunnen liggen..."

Opmerking: De genoemde vereisten zijn niet allesomvattend, er zijn mogelijk striktere nationale vereisten.

(aanbevolen) Inspectiemethode

- De veehouder noteert de bevuiling in de stallen tijdens zijn/haar dagelijkse inspectie. Deze waarnemingen horen bij de risicoanalyse voor staartbijten.
- De officiële inspecteur bekijkt de notities van de veehouder in het licht van de acties ondernomen door de veehouder op het bedrijf.
- Daarnaast controleert de inspecteur ook zelf de hygiëne in het hok en de bevuiling van de varkens in verschillende leeftijdsgroepen en in verschillende hokken.
- De inspecteur rapporteert de bevindingen aan de veehouder. Als de bedrijfssituatie achter blijft bij de wettelijke vereisten, moeten corrigerende maatregelen genomen worden.



Varkens worden individueel gescoord aan de hand van het percentage bevuiling van de huid. Selecteer hiertoe random een lichaamszijde van een varken en beoordeel deze. Er is sprake van bevuiling als de huid besmeurd is met verse of droge uitwerpselen. Verkleuring van de huid of borstelharen worden niet als bevuiling aangemerkt.

Bevuilingscore op bedrijfsniveau: percentage van het aantal varkens gescoord als vuil

'Schoon': 0-30% van het lichaamsoppervlak is bevuild.



'Vuil': meer dan 30% van het lichaamsoppervlak is bevuild.



Bron van de beoordelingsmethode: KTBL Leitfaden en Welfare Quality



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

Als u vragen of opmerkingen heeft
over deze factsheet kunt u contact
opnemen met EURCAW-Pigs via
info.pigs@eurcaw.eu