

Staartcouperen ja/nee



©WUR

Coupeer procedure

- Staartcouperen is een procedure uitgevoerd op biggen om de kans op aangebeten staarten later in het leven te verkleinen;
- Couperen, zelfs bij erg jonge biggen, veroorzaakt acute pijn en mogelijk ontstekingen.
- ALLEEN als managementmaatregelen niet werken en staartbijten doorgaat, is staartcouperen voor een korte termijn toegestaan.

Wettelijke vereisten



Richtlijn **2008/120/EC** benoemd in Bijlage 1, Hoofdstuk I, punt 8 " Het couperen van staarten en het verkleinen van de hoektanden mogen niet als routinemaatregel worden uitgevoerd, maar alleen wanneer bepaalde kwetsuren van spenen bij zeugen of van oren en staarten bij andere varkens zijn geconstateerd. Vóórdat tot deze ingrepen wordt besloten, moeten maatregelen worden getroffen om staartbijten en andere gedragsstoornissen te voorkomen, de omgeving en de varkensdichtheid in aanmerking genomen. Hiertoe moeten ontoereikende omgevingsfactoren of beheerssystemen worden aangepast.."

Een voorwaarde om het couperen tijdelijk te mogen blijven uitvoeren is het schriftelijk bijhouden van gegevens over staartbijten. Richtlijn **98/58/EC**: "Alle dieren die worden gehouden in veehouderijssystemen waar hun welzijn afhangt van frequente verzorging door de mens, moeten ten minste eenmaal per dag worden gecontroleerd. Dieren die in andere systemen worden gehouden, moeten zo vaak worden gecontroleerd dat lijden wordt voorkomen." {2. Bijlage}; "De eigenaar of houder van de dieren moet een register bijhouden van de verstrekte medische zorg en het bij iedere controle geconstateerde aantal sterfgevallen." {5. Bijlage}

Opmerking: De genoemde vereisten zijn niet allesomvattend, er zijn mogelijk striktere nationale vereisten.

Couperen: ja/nee

- De veehouder informeert de officiële inspecteur over zijn/haar bedrijfsstrategie t.a.v. couperen.
- De inspecteur vergelijkt de geschreven documentatie van de veehouder met waarnemingen aan de varkens.
- Het kan lastig zijn onderscheid te maken tussen gecoupeerde en aangebeten staarten. In beide gevallen bevat de huid op de staartpunt littekens, heeft een abnormale vorm of is dikker dan normaal. Als alle staarten verkort zijn tot min of meer dezelfde lengte, dan is dit een indicatie dat ze gecoupeerd zijn.

RISICOANALYSE

Als de staarten gecoupeerd zijn wordt de documentatie van de veehouder behorend bij de risicoanalyse voor staartbijten vergeleken met de ondernomen acties die betrekking hebben op de belangrijkste risicofactoren:

- ✓ Omgevingsverrijking
- ✓ Temperatuur en luchtkwaliteit
- ✓ Gezondheidsstatus
- ✓ Competitie
- ✓ Voeding
- ✓ Hokontwerp en hygiëne




Actieplannen

Een aantal lidstaten heeft een interventie niveau vastgelegd op 2% staartbijten. Zij hanteren dat als er <2% staartbijten voorkomt op een bedrijf, de veehouder het couperen kan gaan afbouwen met aanwijzingen uit het landelijke actieplan. Bij een hoger percentage wordt staartcouperen tijdelijk toegestaan MITS adequate management veranderingen worden geprobeerd bij een volgende groep om te zien of deze het staartbijten kunnen verhelpen. Dit betreft dan weer een nieuwe risicoanalyse.



Geen risico voor het welzijn: Intacte staarten

Geen verwondingen: de staart bevat geen wonden en is niet verkort. De staart is gekruld en de staartpunt is plat en heeft borstelharen.



©WUR



© FLI, A. Schubert

Hoog risico voor het welzijn: Verkorte staarten

De huid op het einde van de staart bevat littekens, staartpunt heeft een abnormale vorm of is dikker dan normaal.



© FLI



©FLI



© FLI



©FLI

Bron van de beoordelingsmethode: EU Platform on Animal Welfare, Subgroup Pigs, 2019



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

Als u vragen of opmerkingen heeft
over deze factsheet kunt u contact
opnemen met EURCAW-Pigs via
info.pigs@eurcaw.eu