




©LSZ Boxberg

Qu'indique la boiterie ?

- La boiterie se caractérise par une démarche anormale et peut être liée à un sol de mauvaise qualité.
- Les mélanges et les interactions agressives sur des sols glissants peuvent entraîner des phénomènes de boiterie. De plus, les porcs qui restent allongés sur des sols durs pendant des périodes de temps prolongés peuvent souffrir de blessures aux pattes à cause de la pression, ce qui risque de les faire boiter.
- Les truies qui boitent peuvent souffrir de la faim  et de la soif car elles ne sont pas en capacité de se déplacer normalement pour accéder à l'eau et à la nourriture.

Exigences légales



Directive du Conseil (CE) **No 2008/120** : Exigences relatives au mélange et au confort de repos :
{Annexe I, Chapitre I, Point 3.} : conditions et exigences d'espace relatives aux aires de couchage.
{Annexe I, Chapitre I, Point 5.} : conditions des sols et prévention des risques de blessures à cause des sols.

Remarque : Les exigences listées paraphrasent le texte littéral de la réglementation et ne sont pas complètes. De plus, il se peut qu'il existe une législation nationale plus stricte en application. Pour obtenir une description plus détaillée des exigences spécifiques, consultez l'analyse « [Logement en groupes et mélange de truies](#) ».



©LSZ Boxberg, S. Baumann

Les tapis en caoutchouc sont une bonne alternative aux litières en paille, ils offrent une aire de couchage confortable aux truies gestantes. La prévalence des lésions des membres et le risque de boiterie peuvent être réduits.

Méthode d'inspection (recommandée)

- Lors de ses inspections quotidiennes, l'éleveur/euse vérifie **si des truies boitent**.
- L'inspecteur/rice officiel/elle vérifie les registres de l'éleveur/euse en comparant la documentation écrite/numérique avec les interventions réalisées par l'éleveur/euse.
- De plus, l'inspecteur/rice vérifie la présence de truies qui boitent dans différents groupes.
- L'inspecteur/rice communique les résultats à l'éleveur/euse et en cas d'incohérence entre les exigences légales et la situation de la ferme, des mesures correctives doivent être prises.



Évaluer chaque porc individuellement. Le cas échéant, forcer les porcs à se lever pour observer leur démarche. L'observation de la démarche doit être réalisée sur un sol non-glissant.

Peu ou pas risque d'atteinte au bien-être : Aucune boiterie ou légère boiterie

Démarche normale (mouvement fluide, pas réguliers, soutien du poids égal sur les quatre pattes),

Ou

Légère boiterie (démarche crispée, pas courts, mouvement augmenté au niveau du segment vertébral).



© FLI, A. Schubbert

Haut risque d'atteinte au bien-être : Boiterie sévère

Soutien du poids minimum au niveau du/des membre(s) affecté(s), alternance rapide entre le soutien du poids et aucun soutien du poids du/des membre(s) affecté(s), aucun soutien du poids de la part du/des membre(s) affecté(s).



© Leeb



Vidéos d'exemple de porcs qui boitent et qui ne boitent pas (KTBL Leitfaden*)

*Schrader, L.; Schubbert, A.; Rauterberg, S.; Czycholl, I.; Leeb, C.; Ziron, M.; Krieter, J.; Schultheiß, U.; Zapf, R. (2020): Tierschutzindikatoren: Leitfaden für die Praxis – Schwein. KTBL (Association pour la Technologie et les Structures dans l'Agriculture), D-64289 Darmstadt, 2e édition.



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

En cas de question ou de suggestion relative à cette fiche, veuillez contacter le Centre info.pigs@eurcaw.eu