




Qu'indiquent des lésions au niveau de la vulve ?

- Il se peut que les truies affamées se mordent pour accéder à la nourriture.
- Dans les enclos d'alimentation individuels, les truies dominantes mordront par derrière les truies qui mangent pour accéder à la nourriture.
- Dans la zone d'attente d'une station d'alimentation électronique pour truies, il se peut que les truies dominantes mordent les truies qui attendent pour accéder à l'entrée. 
- Par conséquent, les lésions de la vulve indiquent que les truies qui mangent et attendent sont mal protégées des autres animaux affamés.

Exigences légales

Directive du Conseil (CE) **No 2008/120** : Exigences associées à la rivalité pour accéder aux ressources : {Article 3, Point 6.} : assurer à chaque individu une quantité suffisante de nourriture, même en présence de concurrentes.

{Annexe I, Chapitre I, Point 6.} : tous les porcs doivent être nourris au moins une fois par jour simultanément, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une alimentation ad libitum ou d'un système d'alimentation automatique.

Remarque : Les exigences listées paraphrasent le texte littéral de la réglementation et ne sont pas complètes. De plus, il se peut qu'il existe une législation nationale plus stricte en application. Pour obtenir une description plus détaillée des exigences spécifiques, consultez l'analyse « [Logement en groupes et mélange de truies](#) ».



Méthode d'inspection (recommandée)

- Lors de ses inspections quotidiennes, l'éleveur/euse vérifie **la présence de lésions de la vulve**.
- L'inspecteur/rice officiel/elle vérifie les registres de l'éleveur/euse en comparant la documentation écrite/numérique avec les interventions réalisées par l'éleveur/euse.
- De plus, l'inspecteur/rice vérifie la présence de lésions de la vulve chez les truies de différents groupes.
- L'inspecteur/rice communique les résultats à l'éleveur/euse et en cas d'incohérence entre les exigences légales et la situation de la ferme, des mesures correctives doivent être prises.



Tous les animaux doivent être évalués debout et de façon individuelle.

En observant depuis derrière, examiner la vulve pour détecter la présence de blessures récentes (présence de sang ou de lésions rouges) et de blessures anciennes (tissu cicatriciel et/ou vulve déformée).

Peu ou pas risque d'atteinte au bien-être :
Aucune blessure à la vulve, ou des lésions mineures (moins de 2 cm), ou tissu cicatriciel visible.



©Boku, T. Leeb

Haut risque d'atteinte au bien-être :
Blessure de plus de 2 cm de largeur visible, mais en cours de guérison (croûte formée), ou une vulve déformée ou toute autre blessure de plus de 2 cm de largeur qui saigne.



©Boku, T. Leeb



©Boku, T. Leeb

Source de la méthode d'évaluation : Protocole Welfare Quality®



Co-funded by
the European Union



WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH



AARHUS
UNIVERSITY

FRIEDRICH-LOEFFLER-INSTITUT



Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit
Federal Research Institute for Animal Health



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

En cas de question ou de suggestion relative à cette fiche, veuillez contacter le Centre info.pigs@eurcaw.eu