

Physiologische Schwäche



Worauf ist bei physiologischen Schwächen zu achten?



- Physiologische Schwächen werden nicht durch Verletzungen oder Krankheiten verursacht.
- Sie lassen sich an verschiedenen Anzeichen wie Abmagerung, Blässe der Haut oder dem Alter der Ferkel und der Produktionsstufe der Sauen erkennen.
- Schweine mit physiologischen Schwächen sind nicht transportfähig.

Gesetzliche Anforderungen

Verordnung (EG) **1/2005**: Anforderungen im Zusammenhang mit physiologischen Schwächen:
 {Anhang I, Kapitel I, Punkt 1.}: Es dürfen nur transportfähige Tiere transportiert werden.
 {Anhang I, Kapitel I, Punkt 2.c}: Anforderungen an den Transport trächtiger Tiere.
 {Anhang I, Kapitel I, Punkt 2.d}: Bedingungen für den Transport von neugeborenen Säugetieren.
 {Anlage I, Kapitel I, Punkt 2.e}: Anforderungen an den Transport von Schweinen, die weniger als drei Wochen alt sind.
 {Anhang I, Kapitel I, Punkt 5}: Verwendung von Beruhigungsmitteln.

Hinweis: Die aufgeführten Anforderungen sind nicht vollständig. Darüber hinaus kann es strengere nationale Rechtsvorschriften geben. Für weiterführende Informationen zu spezifischen Anforderungen, sehen Sie bitte das Review "[Fitness for Transport](#)".

Erhebungsmethode (empfohlen)

- Dauert die geplante Fahrt weniger als 8 Stunden, müssen Tierhalter*innen und Fahrer*innen vor und während der Verladung die Transportfähigkeit beurteilen.
- Dauert die Beförderung länger als 8 Stunden, so muss bei der Verladung ein/eine amtliche(r) Tierarzt/Tierärztin anwesend sein, um die Transportfähigkeit der Schweine zu beurteilen.
- In beiden Fällen werden die Schweine auf Anzeichen von **physiologischen Schwächen** untersucht.
- Die Amtstierärzt*innen informieren die Tierhalter*innen und Fahrer*innen über die Ergebnisse. Bei Verstößen während des Verladens und Transports werden Korrekturmaßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass die Situation in Zukunft den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Tierbezogene Indikatoren

Bislang fehlen evidenzbasierte tierbezogene Indikatoren zur Bewertung physiologischer Schwächen. Einige Merkmale **nicht transportfähiger Tiere** in Bezug auf physiologische Schwächen können visuell erkannt werden, während andere, wie z. B. eine genetisch bedingte Stressanfälligkeit, schwieriger oder unmöglich durch visuelle Inspektion zu überprüfen sind. Andere Beispiele sind das Alter der Ferkel und das Trächtigkeitsstadium der Sauen, die anhand von Betriebsaufzeichnungen beurteilt werden können.

In der Tabelle auf der nächsten Seite finden Sie Anzeichen für physiologische Schwächen.



In der folgenden Tabelle sind Anzeichen für physiologische Schwächen aufgeführt, auf die die Inspektoren bei der Überprüfung der Transportfähigkeit achten sollten.

Indikator und Beschreibung

Erhebung



Anämie und Abmagerung:

Schweine mit blasser Haut und schneller Atemfrequenz (Anämie: niedrige Erythrozytenzahl im Blut, niedriger Hämoglobinwert) oder eine sehr schlechte Körperkondition haben (Abmagerung).

Visuell



Tätigkeitsstadium der Sauen:

Trächtige Sauen, bei denen 90% oder mehr der erwarteten Tätigkeitsdauer verstrichen sind.

Sauen, die in der letzten Woche geferkelt haben.

Betriebs
Aufzeichnungen



Alter der Ferkel:

Neugeborene Säugetiere, bei denen der Nabel noch nicht vollständig abgeheilt ist.

Schweine, die weniger als drei Wochen alt sind, es sei denn, sie werden weniger als 100 km weit transportiert.

Visuell

Betriebs
Aufzeichnungen