

Boeren met weidevogels

Mozaïekbeheer op polderniveau, maatregelen ten gunste van het behoud onze weidevogels

Maatregelen

- 1 Hoog waterpeil:** hoger voedselaanbod door flauwe oever en drassige randzone
- 2 Randenbeheer:** hoger gras zorgt voor dekking en verbinding tussen weidevogel-percelen
- 3 Vogelgestuurd maaien:** liefst nadat nesten uit zijn en kuikens perceel verlaten hebben, gebruik een wildredder
- 4 Extensieve beweiding:** 1-3 koeien per hectare, creëren kuikenland
- 5 Nestbescherming:** Bij beweiding markering over nest en rondom nesten min. 50m² gras laten staan bij maaien
- 6 Open landschap:** geen opgaande begroeiing waar predatoren kunnen zitten
- 7 Kruidrijk en structuurrijk grasland:** voedsel en dekking voor weidevogels en kuikens, slaap- en verzamelplaats
- 8 (Greppel) plasdras zones:** foeragerende weidevogels en bescherming tegen predatoren
- 9 Voorbeweiding:** structuur gras is opener en voor de kuikens beter toegankelijk
- 10 Geen voorjaarsbemesting:** voorkeur voor vaste mest in het voorjaar + stroken onbemest
- 11 Inzet drones:** actualisatie (maai)beheer, controleren van percelen op nesten en kuikens, ook aangrenzende percelen

Primaire weidevogels

- Grutto
- Scholekster
- Tureluur
- Kievit
- Wulp
- Watersnip
- Kemphaan
- Zomertaling
- Slobeend
- Kuifeend
- Veldleeuwerik
- Gele kwikstaart
- Graspieper

Secundaire weidevogels

- Kluut
- Wintertaling
- Krakeend
- Visdief
- Zwarte stern
- Kwartelkoning
- Paapje
- Grauwe gors



visual: www.ro-visuals.nl

Predatoren

- Blauwe reiger
- Ooievaar
- Bruine kiekendief
- Zwarte kraai
- Buizerd
- Vos
- Hermelijn
- Wezel
- Bunzing
- Steenmarter
- Egel
- Huiskat

Voedsel

- Regenworm
- Mug
- Rups
- Vlieg
- Spin
- Loopkever
- Snuitkever
- Emelt

Ontwikkeld samen met

