







# Tabel. Graslandherbiciden en hun mogelijkheden

Product	Voorjaar grasla- aansl	Permanent zonde aansl	Voorjaar - Permanent grasland en gemaaid	Najaar	Werksame stof	Dosis	Aantal toepassingen
Actieve stof Solo							
ALS-remmer							
Harmony Pasture			500 g/kg thifensulfuron-methyl	30 g/ha		1 toep. / 12 maanden	
Primus			50 g/l florasulam	50 ml/ha		1 toep. / 12 maanden	
Hormoonwerking: auxine mimic							
Starane Forte	Maart tot september		333 g/l fluoxypyrr	0,54 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Minstrel	Maart tot september		200 g/l fluoxypyrr	1,8 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Tomahawk	Maart tot augustus		200 g/l fluoxypyrr	1,8 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Tandus	Maart tot september		200 g/l fluoxypyrr	1,8 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Stapler							
U-46-D-500			500 g/l 2,4-D	1,6 - 2,4 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Agroxyl 750			500 g/l 2,4-D	1,6 - 2,4 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
U-46 M750			100 g/l MCPA	1,3-2,7 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Tweeledige combinatie			750 g/l MCPA	1,3 - 2,7 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
2 x hormoon: auxine mimic							
Ciran			360 g/l 2,4-D + 315 g/l A.C. cloropralid	1,75 - 2,25 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Prevail/Thislex			200 g/l triclopyr + 100 g/l cloropralid	1 l/ha		1 toep. / 12 maanden, max. 480 g triclopyr/ ha / 12 maanden	
Genoxone			103,6 g/l triclopyr, 93 g/l 4-D		Plaatselijke behandeling - 125 l/100 l	1 toep. / 12 maanden, maximale dosis van triclopyr per ha: 0,48 kg / 12 maanden	
Silvanet			60 g/l triclopyr + 20 g/l fluoxypyrr		Plaatselijke behandeling - 0,2 - 0,3 l/10 l/100 m <sup>2</sup>	1 toep. / 12 maanden, max. 480 g triclopyr/ ha / 12 maanden	
Doxstar, Pastor			150 g/l fluoxypyrr + 150 g/l triclopyr	1-2 l/ha		2 l/ha / 12 maanden	
Primax, Pixxaro			12,5 g/l halauxifen-methyl + 280 g/l fluoxypyrr	0,3 - 0,5 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Tribel XXL			103,6 g/l triclopyr + 93 g/l 2,4-D	2,25 l/100 l		1 toep. / 12 maanden	
Bofort	In lente voor bloei		100 g/l fluoxypyrr + 30 g/l aminopyralide		Plaatselijke behandeling - 2 l/ha of plaatselijke behandeling: 0 ml/100 m <sup>2</sup>	1 toep. / 36 maanden (aminopyralid)	
Garlon Super, Luoxyl Super	Maart tot augustus		240 g/l triclopyr + 30 g/l aminopyralide		2 l/ha of plaatselijke behandeling: 0 ml/100 m <sup>2</sup>	1 toep. / 36 maanden (aminopyralid)	
Hormoon + ALS-remmer							
Cleave			2,5 g/l florasulam + 100 g/l fluoxypyrr	1-1,5 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Primstar	Maart tot oktober		100 g fluoxypyrr + 2,5 g/l florasulam	1-2 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Kart			1 g/l florasulam + 100 g/l fluoxypyrr	1,2 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Mattera, Zypar, Rentar			5 g/l florasulam + 6,25 g/l halauxifen-methyl	0,75 - 1 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Driedelige combinatie							
3 x hormoon			20 g/l clopyralid + 200 g/l MCPA + 40 g/l fluoxypyrr	4 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Bofix			25 g/l florasulam + 100 g/l fluoxypyrr + 80 g/l clopyralid	1,5 l/ha		1 toep. / 12 maanden	
Trevistar							

Boer & Tuinder

copyright

Boer & Tuinder

Boer & Tuinder

Boer & Tuinder

Boer & Tuinder